

例であった。治療法は全脳照射 58 例、摘出手術 56 例、ノバリスによる定位放射線治療 61 例、ガンマーナイフによる定位放射線手術 44 例、髄注化学療法 11 例であった。それぞれ併用療法も行われており、摘出術後に大きなものにノバリスを行い、残りに対して全脳照射したのも 2 例あった。手術単独では 41 例で放射線を併用したものは 15 例であった。

新しいモダリティの登場により、様々な治療選択が生まれ、その治療戦略の標準化が望まれるところである。

## 12 形質細胞腫に対する放射線治療

末山 博男・霜越 敏和・小日向美華  
花沢 秀行\*・森田 由香\*・佐藤雄一郎\*  
県立中央病院放射線治療科  
同 耳鼻咽喉科\*

最近 5 年間に、比較的な稀な髄外形質細胞腫 4 症例を経験した。原発部位は上咽頭、副鼻腔、頸部リンパ節、胃であり、1 例のみは原発部位でなく、再発転移部位に放射線治療を施行した。治療は放射線単独で行った。一般に、放射線感受性は比較的高いといわれているが、自験例においては、ばらつきを認めた。文献的には線量は 50Gy 程度が推奨されているが、当科では反応によって線量を加減しているため、投与線量に幅を認めた。4 症例はいずれも 50～64Gy を投与して、局所再発を認めていない。しかし、1 例のみは当初から転移部位への照射で、この症例のみは播種を認めている。

## 13 肺癌・縮小手術

保坂 靖子・吉谷 克雄・大和 靖  
小池 輝明  
県立がんセンター新潟病院呼吸器外科

【目的】近年、小型肺癌に対して根治を目的とした縮小手術が行われ、標準手術と同等の治療成績が得られており、肺癌に対する縮小手術が注目されてきている。今回、縮小手術の治療成績につき

検討した。

【対象】当院で 1981-2005 年の 25 年間に縮小手術を施行した 645 例（根治的縮小手術 226 例、消極的縮小手術 357 例、その他 62 例）を対象とした。術式は区域切除 325 例、部分切除 306 例、その他 3 例であった。

【結果】①病理病期は IA 472 例、IB 95 例、IIA 10 例、IIB 20 例、III 期以上が 46 例で、完全切除 582 例、非完全切除 62 例であった。②手術死亡は 1 例 (0.15%) のみであった。③5 年生存率は根治的縮小手術では 89.0%、消極的縮小手術では 52.0% で縮小手術全体では 62.9% であった。

【結語】縮小手術は侵襲が少なく、予想以上に良好な成績が得られることから、今後増加が予想される多発がん症例などにも積極的な適用が考えられる。

## 14 当科における肺癌外来化学療法の現状

長澤 芳哉・前田 恒治・佐藤 牧  
塚田 裕子・横山 晶  
県立がんセンター新潟病院内科

毒性の少ない有効な抗癌剤・支持療法の開発に伴い外来化学療法が可能となった。社会生活を送りつつ有効な治療を安全かつ効率的に外来で行うことは患者の QOL 向上に役立つと考えられる。'04 年 10 月開設の当院外来化学療法室は 15 床で、事前登録されたプロトコルに従い全科で約 500 例/月の化学療法を行っている。当科も PS 0-2 で外来治療を希望する患者に対し単剤・CDDP を含まない併用療法を外来で行っている。'04 年 10 月～'07 年 5 月に外来化学療法を行った肺癌患者は 87 例、98 レジメン。男性/女性：72/26 例、年齢は 36～76 歳（中央値 60 歳）、カルボプラチン+パクリタキセル/カルボプラチン+ゲムシタピン/ゲムシタピン/ドセタキセル/塩酸イリノテカン/その他単剤が各々 46/4/21/16/6/5 例。有害事象・緊急入院等の検討により改善すべき点を明らかにする。