

症例は72歳男性で平成17年12月初めごろより、入浴後に頻回の左上肢の脱力を自覚。MRIにて分水領域に脳梗塞が認められた。脳血管造影検査にて右頸部内頸動脈高度狭窄が認められ、1月18日頸部内頸動脈内膜剥離術(CEA)が施行された。術前の脳血流検査にて、右中大脳動脈領域に血行力学的脳虚血StageⅡ(stein現象あり)と術後高灌流現象が予測された。このため術後全身麻酔下での脳循環評価と血圧管理を計画した。術直後及び翌日のECD-SPECTにて右中大脳動脈領域に高灌流が認められ、厳重に血圧を管理。翌々日のECD-SPECTにてほぼ血流が正常化したため麻酔から離脱した。周術期の合併症はなく、良好な結果が得られた。

10 CEA, CAS術後の高次脳機能の変化

秋岡 直樹・高岩亜希子・桑山 直也
久保 道也・林 央周・山本 博道
遠藤 俊郎
富山大学医学部脳神経外科

【目的】 頸部内頸動脈高度狭窄症の患者に対し、CEA/CAS術前後の高次脳機能の変化について検討した。

【方法】 対象は70%以上狭窄の症候性患者と80%以上狭窄の無症候性患者計13名で、6例にCEA、7例にCASを施行した。高次脳機能評価はMMSEとRBANSを用い、術前と術後1、3週に行った。

【結果】 85%の患者でMMSEが正常にもかかわらず、RBANSで低下を認めた。全患者において術後の即時記憶、注意、総指標にて有意な改善を認めた。CAS群では、遅延記憶と総指標にてCEA群より早期の改善を認めた。

【結論】 頸動脈高度狭窄症の患者では何らかの高次脳機能低下が存在しており、CEA/CASによって改善することが示唆された。RBANSによる高次脳機能評価の妥当性に関して、CEA/CAS前後の脳血流SPECTの変化とあわせて報告する。

11 赤外線画像システムIRIS Vを用いたもやもや病血行再建術中脳表モニタリング：術後経過との相関に関する検討

中川 敦寛・藤村 幹*・清水 宏明**
高山 和喜***・富永 悅二*
仙台市立病院脳神経外科
東北大学大学院医学系研究科
神経外科学分野*
広南病院脳神経外科**
東北大学医工学連携機構ナノ
メディスン分野***

脳表近傍の局所血流と血管描出を目的とした赤外線画像システムIRIS Vを用いてもやもや病血行再建術中の脳表モニタリングを行った。対象は2005年3月～2006年2月まで東北大学脳神経外科で血行再建術を施行したもやもや病8例、9側である。STA-MCA吻合術を完了後、STAを一時血流遮断、解除する過程を連続撮影した。

【結果・結論】 全例で吻合部の開存性が確認可能で、画像所見は以下の3パターンに分けられた。
A. MCAの描出と脳表の色調変化を伴う B. MCAは描出されるが、脳表の色調変化は認めない C. 両者ともに認めない。Aを呈した3側では術後一過性に症候性の局所過灌流を認めた。Bを呈した5側ではSPECT上ののみの局所過灌流を呈した。Cを呈した症例ではSPECT上も局所過灌流は認められなかった。定量などの問題はあるが、本システムを用いて術後の症候性局所過灌流のリスク評価が行える可能性が示唆された。

12 Stroke teamによる非脳卒中診療施設への出張教育—北海道初の急性期脳卒中地域連携パスの導入—

齊藤 正樹・高橋 明・本間 敏美
柴田 和則
砂川市立病院脳神経センター

われわれは地域の脳卒中診療の質を向上させるべくStroke teamによる出張教育活動を行ない急性期脳卒中に対する北海道初の地域連携パスを作成・導入した。出張教育は医師、看護師、理学療法士(PT)、言語聴覚療法士(ST)、ソーシャルワ