

第 5 回新潟 ESWL-Endourology  
研究会

日 時 平成 6 年 7 月 16 日 (土)  
午後 4 時より  
会 場 ホテルイタリア軒  
3 F サンマルコ

I. 一 般 演 題

1) ESWL を行ったケイ酸結石の 1 例

笹川 亨・阿部 禮男 (新潟こばり病院  
泌尿器科)  
若月 俊二 (厚生連村上病院  
泌尿器科)

症例は62歳, 男性. 主訴は右側腹部痛. 平成 5 年 10 月右側腹部痛があり近医にて尿路結石を疑われて村上病院泌尿器科を紹介される. 右尿管結石, 両側腎結石の診断にて保存的に経過観察するも自然排石なく, ESWL 目的にて平成 6 年 1 月当院初診となる. 右尿管結石に対して Siemens 社製 Lithostar にて 19.0 kV, 4,000 発の ESWL を施行し排石. 結石は特徴的な乳白色で, ESWL にてよく砕石されていた. 赤外線分光分析の結果ケイ酸が主成分であった. ケイ酸結石は極めて稀で本症例は本邦 23 例目であった. 一般にケイ酸マグネシウム剤の内服者に多いが本症例ではその既往がなく原因は不明であった. ケイ酸結石であっても ESWL は治療の第一選択であると考えられたが, ケイ酸マグネシウム剤の内服を行っている場合は薬剤の中止と定期観察が必要であると思われる.

2) SPARK 800 による尿路結石の治療経験

照沼 正博・西山 勉 (厚生連長岡中央  
総合病院泌尿器科)

日本赤外線工業社製の SPARK 800 (小口径型及び大口径型)を用いた ESWL の治療成績について検討した. 対象は 1993 年 3 月から 1994 年 6 月までに当科で治療した上部尿路結石患者 141 名 (男性 100 名, 女性 41 名) で, 150 結石 (R1 3 例, R2 41 例, R3 10 例, U1 68 例, U2 17 例, U3 11 例) に対し 161 回の ESWL を行った. 平均衝撃波数は 1,735 発で平均施行回数は 1.07 回であった. 治療は入院の上ほとんどの症例で硬膜外麻酔を使用した. 治療後 1 ヶ月以内の完全排石率は R1 0%, R2

39%, R3 40%, U1 57%, U2 59%, U3 55% であった. 4 mm 以下の残石までを有効例とすると有効率はそれぞれ R1 33%, R2 82%, R3 70%, U1 75%, U3 64% であった. 小口径型では平均治療時間は 38.1 分, 平均衝撃波数は 1,835 発に対し, 大口径型ではそれぞれ 34.9 分, 1,543 発と減少傾向がありその有用性が認められた.

3) 新潟大学附属病院における体外衝撃波結石  
破碎術の現況

車田 茂徳・志村 尚宣  
今井 智之・郷 秀人  
武田 正之 (新潟大学泌尿器科)  
川上 芳明 (新潟市民病院  
泌尿器科)

1993 年 3 月 4 日から 1994 年 7 月 5 日までに 43 症例 (男性 23 例, 女性 20 例), 52 結石に対して東芝社製 ESL-500 A/GP を用いて体外衝撃波結石破碎術を施行した. 対象結石は R2 結石 26, R3 結石 3, U1 結石 11, U2 結石 2, U3 結石 10 で大きさは 4~28 mm (平均 12). 1 結石に対しての治療回数は 1~5 回 (平均 2 回), 総照射数は 1,400~27,600 発 (平均 8,518), 有効率は 59.6% であった. 部位別の治療成績は R2, R3, U1, U2, U3 それぞれ 50, 0, 63.6, 100, 90% であり尿管結石の治療成績に比べて腎結石の治療成績が劣っていた. 特に腎結石の治療成績が他の報告に比べて劣っているが, この理由としては併用療法の早期施行, 患者の病識, 合併疾患の特殊性が関与していると考えられた.

4) ESWL 導入後の PNL の適応について

高橋 英祐・川上 芳明 (新潟市民病院)  
大沢 哲雄・中村 章 (泌尿器科)

腎結石に対する ESWL (MFL-5000) の成績と PNL 療法の成績を比較し, ESWL 導入後の PNL の適応について検討した. 1991 年 11 月から 1993 年 9 月まで 270 回の ESWL および 8 症例 (完全珊瑚状結石 4 例, X 線陰性結石 1 例, PUJ 嵌頓結石 3 例) に PNL を行った. 残石が 10 mm 以下で追加治療を要しないと考えられる場合臨床的満足とした. ESWL 単独療法の臨床的満足率は完全珊瑚状結石の 22% (2/9) に対し, これ以外の大結石 (20 mm 以上) では 61% (14/23) であった. PNL 療法による臨床的満足率は完全珊瑚状結石では 50% (2/4), これ以外の結石では 100% (4/4) であった.

今後, 我々は, 完全珊瑚状結石では最初から PNL を