

文献上8例しか報告されていない。特徴的な画像所見が診断上参考になり、また、栄養血管塞栓術が治療上有効であると考えられた。

A-33) 頸椎の過屈曲損傷を契機に症状の出現した Chiari malformation の1例

矢野 俊介・畑 大
関 俊隆・蓑島 聡 (釧路労災病院)
竹田 誠・井須 豊彦 (脳神経外科)

我々は、頸椎の過屈曲損傷を契機に症状が出現した Chiari malformation の1症例を経験したので若干の文献的考察を加え報告する。

症例は30歳の男性。主訴は、頸椎屈曲位で出現する両下肢のしびれ。平成8年1月3日、後方に転倒し、後頭部を打撲。この時、頸部が強く屈曲した。この時以降、両上肢外側のしびれ、および頸椎屈曲位における両下肢のしびれが出現するようになり、1月24日、当科受診となった。初診時、頸椎 MRI にて小脳扁桃の下垂、および C2/3~T1/2 に syringomyelia を認め、頸椎屈曲時には延髄前方の髄液腔の狭小化が認められた。Chiari malformation type I の診断のもと、2月22日、硬膜外層切除による大孔部減圧術、および環椎椎弓切除術が施行された。術後 MRI 上、大孔部の減圧が充分であることが確認され、神経学的にも頸椎屈曲位における下肢のしびれも消失した。

A-34) 脊髓空洞症を伴った Chiari 奇形術後に再発した1小児例

森 大志・伊藤 康信
渡辺 克夫・塩屋 斉 (秋田大学)
峯浦 一喜・古和田正悦 (脳神経外科)
阿部 英二・島田 陽一 (同 整形外科)

小児の Chiari 奇形 I 型は運動障害、脊椎変形などを初発症状とし、10歳以下の小児期には少ない。最近、大後頭孔減圧術後に再発した Chiari 奇形 I 型の1小児例を経験したので報告する。

症例は6歳女児で、1994年4月に近医で側彎症を指摘され、1995年1月から右下肢脱力を訴え、MRI で Chiari 奇形 I 型と診断されて入院した。神経学的には左温痛覚・右深部知覚の低下と右片麻痺がみられた。MRI で小脳扁桃は C1/2 間まで下垂し、C2-T10 間に syrinx があり、同年4月18日に、大後頭孔減圧術を行った。術

後2ヶ月の MRI で syrinx は著明に縮小し、側彎症も軽快したが、6ヶ月後には右下肢脱力と側彎症が増悪し、syrinx の再増大がみられ、同年12月5日に自家肋骨・腸骨を用いた後、頭骨-頸椎固定術を行った。術後、右下肢脱力は消失し、MRI で syrinx は縮小した。現在、当方外来で経過観察中である。

A-35) 外傷による頸椎骨折後、両側性椎骨動脈閉塞を生じた1症例

矢野 俊介・畑 大
関 俊隆・蓑島 聡 (釧路労災病院)
竹田 誠・井須 豊彦 (脳神経外科)

我々は外傷による頸椎骨折後、両側の椎骨動脈閉塞を生じた1症例を経験したので若干の文献的考察を加えて報告する。

症例は42歳の男性。強直性脊椎炎の既往があり、頸部の可動制限があった。平成7年11月21日午前4時頃、階段から転落し四肢麻痺を呈し、午前7時頃近医に搬送された。頸椎単純写真にて C6/7 の脱臼を認め、当院紹介となった。搬送中に意識状態、呼吸状態が悪化し、午後4時の当院到着時には昏睡状態、呼吸状態も悪化していた。頭部の CT で脳幹、小脳半球の低吸収域および閉塞性水頭症を、頸椎 CT で両側の横突孔におよぶ椎体骨折を、頸部 CT angiogram では両側椎骨動脈の閉塞を認めた。患者は11日後、多臓器不全により死亡した。

本合併症は予想以上に多く、また、生命予後に大きな影響を与えるため、今後再認識をする必要があると思われる。

A-36) 線維性中隔を伴った diastematomyelia の1例

安田 宏・小柳 泉
飛騨 一利・岩崎 喜信 (北海道大学)
阿部 弘 (脳神経外科)

diastematomyelia (割髄症) は骨性あるいは線維性の中隔によって脊髄が離解しているものをいう。今回我々は成人で発症し、線維性中隔の存在した腰部の diastematomyelia を経験したので文献的考察を加え報告する。

症例は45歳。男性。左足背部痛にて発症。左足節以下の脱力も進行し歩行障害を呈してきたため当科入院となった。入院時の神経学的陽性所見として左足関節以下の著明な筋力低下。左バビンスキー反射陽性。左足背部の感