

佐渡島の植物

(羊歯・種子植物)

本間 建一郎

新潟県植物分布調査記録 5

2002

新津植物資料室
(積雪地域植物研究所)

佐渡島の植物

(羊歯・種子植物)

本 間 建 一 郎

新潟県佐渡郡金井町千種乙416

新潟県植物分布調査記録 5

2002

新津植物資料室
(積雪地域植物研究所)

Flora of Vascular Plants at Sado Island

Kenichiro Honma

Research Report of Plant Distribution
in Niigata Prefecture(Japan)

5

2002

Niitsu Herbarium

(Plant Laboratory in Snowy Area, Japan)

佐渡島の植物(羊歯・種子植物)

(2001)

新潟県佐渡郡金井町千種乙416

本間建一郎

はじめに

佐渡の植物については古くより多くの研究者や採集家によって調査研究されてきた。これまでに多くの成果があるがその中に佐渡の植物相をまとめた次の報文がある。

北見秀夫：佐渡の植物，佐渡博物館研究報告第5集(1963)

野田光蔵：越後の植物誌，I～IV(1968～1971)，新潟大学理学部生物学教室，植物分類形態学研究室

中村行雄・長尾長治：佐渡産羊歯類目録(第二版)(1961)(謄写刷)

中村行雄・長尾長治：佐渡産スゲ類目録(第一版)(1961)(謄写刷)

池上義信・石澤進：新潟県植物分布図集(第一～三集)(1980～1982)

(註；第四集以降の分は未記載)

植田正司：佐渡産ラン科植物目録，佐渡博物館研究報告第8集(1981)

秋庭鉾一郎：佐渡植物採集標本(牧野富太郎同定)(1933)，佐渡高等学校生物教室収蔵

筆者はこれらの報文を取りまとめ「佐渡島の植物(羊歯・種子植物)」として報告する。

各植物の産地名は現在の市町村名に書き換え報文の著者名を頭につけた。産地に前記の著者名のないものは筆者の見聞によるものである。植物の種の学名と科・属・種の配列は主として平凡社・日本野生植物(I, II, III, 木本I, II, シダ)に拠った。

この小文をまとめるにあたり次の書物を参考にした。

[参考書]

平凡社：日本野生植物(シダ，I 単子葉植物，II 離弁花類，III 合弁花類，木本I，木本II)

保育社：原色日本植物図鑑(上・草本編I・合弁花類，中・草本編II・離弁花類，下・草本編III・単子葉類，木本編I，木本編II)

奥山春季：採集検索日本植物ハンドブック，八坂書房(1974)

本間建一郎：佐渡の自然植生，新潟の自然 第2集(1972)

羊歯植物

ひかげのかずら科

1 トウゲシバ ※

Lycopodium serratum Thunb.

分布：北，本，四，九，琉

産地：北見；ドンデン。秋庭；妙見山。

2 ホソバトウゲシバ ※

Lycopodium serratum var. *serratum*

分布：本，四，九，琉(温帯)

産地：北見；ドンデン，両津市-原黒・下久知。野田；金北山，乙和池，両津市-河崎。中村・長尾；ドンデン。

3 ヒロハノトウゲシバ ※

Lycopodium serratum

var. *intermedia* (Nakai) Miyabe et Kudo

分布：北，本，四，九，琉

産地：北見；羽茂町-新倉。中村・長尾；羽茂町-新倉。

4 コスギラン

Lycopodium selago Christ

分布：北，本(静岡県，岐阜県以北)高山帯，屋久島の高地。

産地：北見；ドンデン

5 ヒメスギラン ※

Lycopodium chinense Christ

分布：北，本，四，九(屋久島)

産地：北見；ドンデン。野田；ドンデン。中村・長尾；ドンデン。

6 ヒカゲノカズラ ※

Lycopodium clavatum L.

分布：北，本，四，九

産地：北見；ドンデン。野田；ドンデン，金北山，大塚山。

秋庭；妙見山中腹。中村・長尾；佐渡。

7 マンネンスギ ※

Lycopodium obusculum L.

分布：北，本，四，九

産地：北見；ドンデン。野田；金北山，大塚山。中村・長尾；ドンデン，大倉越え。池上・石澤；分布図(3) no.151 両津市-大滝山，相川町-南片辺。

8 アスヒカズラ

Lycopodium complanatum L.

分布：北，本(中部以北，滋賀県，兵庫県，鳥取県)，四

産地：北見；ドンデン

いわひば科

9 ヒモカズラ ※

Selaginella shakotanensis

(Franch. ex Takeda) Miyabe et Kudo

分布：北，本(中部地方以北，広島県，京都府，奈良県)

産地：北見；金北山，相川町-入川・関。野田；アオネバ越え，相川町-入川。中村・長尾；相川町-大倉，岩谷口。

- 10 イワヒバ ※
Selaginella tamariscina (Beauv.) Spring
分布：北, 本, 四, 九, 琉 東アジア, 東南アジア
産地：北見；相川町-矢柄。野田；相川町-矢柄。中村・長尾；相川町-大倉。
- 11 クラマゴケ ※
Selaginella remotifolia Spring
分布：本, 四, (北, 青森県, 九, 琉では珍しい)
産地：北見；両津市-梅津, 相川町-入川。野田；乙和池。中村・長尾；佐渡。
- 12 タチクラマゴケ ※
Selaginella nipponica Fr. et Sav.
分布：本(東北南部以南), 四, 九, 種子島, 琉
産地：北見；ドンデン。野田；金北山。
- 13 エゾノヒメクラマゴケ ※
Selaginella helvetica (L.) Link
分布：北, 本(静岡県, 長野県以北) 亜高山帯
産地：北見；ドンデン, 関越え。中村・長尾；ドンデン, 大倉越え。
- みずなら科
- 14 ミズニラ
Isoetes japonica A. Br.
分布：北, 本, 四, 九, 朝鮮, 中国
産地；野田；羽茂村-村山。
ノート：危急種
- 15 ヒメミズニラ
Isoetes asiatica (Makino) Makino
分布：北, 本(中部以北)
産地：野田；金井町-中興。
- とくさ科
- 16 スギナ ※
Equisetum arvense L.
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；羽茂町-小泊。野田；金井町, 赤泊村-下川茂, 畑野町-多田。中村・長尾；佐渡。
- 17 イヌスギナ ※
Equisetum palustre L.
分布：北, 本(長野県, 関東地方以北)
産地：野田；佐和田町-河原田, 相川町-石花。
- 18 イヌドクサ ※
Equisetum ramosissimum Desf.
分布：本, 四, 九, 琉, 北半球
産地：北見；真野町-西三川, 両津市-梅津。野田；真野町-西三川, 両津市-梅津。中村・長尾；両津市-梅津, 羽茂町-築浜。秋庭；佐和田町-河原田海岸。
- 19 トクサ ※
Equisetum hyemale L.
分布：北, 本(中部地方以北), 北半球
- 産地：北見；羽茂町-亀ノ脇。
- はなやすり科
- 20 ヒロハハナヤスリ ※
Ophioglossum vulgatum L.
分布：北, 本, 四, 九, 北半球
産地：北見；ドンデン, 両津市-和木・馬首・米山。野田；金北山, 相川町-片辺。中村・長尾；羽茂町-犬落。秋庭；金北山。
- 21 コヒロハハナヤスリ (フジハナヤスリ) ※
Ophioglossum petio-latum Hook.
分布：本(中部地方以南), 四, 九, 琉
産地：秋庭；金北山
- 22 オオハナワラビ ※
Botrychium japonicum (Prantl) Underw.
分布：本(東北中部), 四, 九(屋久島)
産地：北見；ドンデン。野田；経塚山, 相川町-石花。中村・長尾；羽茂町-犬落。
- 23 フユノハナワラビ ※
Botrychium ternatum (Thunb.) Sw.
分布：北, 本, 四, 九, 東アジア
産地：北見；羽茂町-村山。野田；金北山, 経塚山, 相川町-大倉。
- 24 ヤマハナワラビ
Botrychium multifidum (Gmel.) Rupr.
分布：北, 本(中部地方以北), 北半球, 温帯
産地：北見；大佐渡-中岳。
- 25 エゾフユノハナワラビ ※
Botrychium multifidum
var. *robustum* (Rupr. ex Milde) C. Chr.
分布：北, 本(中部地方以北)
産地：北見；金北山, 羽茂町-絞張。野田；畑野町-松ヶ崎, 金井町。中村・長尾；金北山, 羽茂町-絞張。
- 26 ナガホノナツノハナワラビ ※
Botrychium strictum Underw.
分布：北, 本, 四, 九, 朝鮮, 中国
産地：北見；相川町-入川。野田；アオネバ越え。中村・長尾；佐渡。
- ぜんまい科
- 27 ゼンマイ ※
Osmunda japonica Thunb.
分布：北, 本, 四, 九, 琉
産地：北見；羽茂町-小泊, 島内各地。野田；金北山, 金井町, 真野町, 相川町-戸中。中村・長尾；佐渡。
- 28 ヤマドリゼンマイ ※
Osmunda cinnamomea L.
分布：北, 本, 四, 九(屋久島)
産地：北見；ドンデン, 大佐渡山脈600m以上, 小佐渡50m以上。野田；経塚山。中村・長尾；乙和池。

きじのおしだ科

29 キジノオシダ ※

Plagiogyria japonica Nakai

分布：本（東北南部以南），四，九

産地：北見；小木町-小比叡。野田；両津市-水津。中村・長尾；小木町-小比叡。池上・石沢；分布図(3) no. 154-両津市-水津，真野町-西三川，小木町-小比叡。

30 オオキジノオ ※

Plagiogyria euphlebia (Kunze) Mett.

分布：本（関東，新潟県），四，九

産地：北見；赤泊村-下川茂。野田；両津市-水津。中村・長尾；小木町-小比叡。池上・石沢；分布図(3) no. 153-穂ダム，小木町-小比叡。

31 ヤマソテツ ※

Plagiogyria matsumureana Makino

分布：北，本，四，九（屋久島），南千島

産地：北見；ドンデン。野田；金北山，相川町-片辺，石花越。中村・長尾；金北山，相川町-関。秋庭；大佐渡-二ノ岳。

うらじろ科

32 ウラジロ ※

Gleichenia japonica Spr.

分布：本（山形県，新潟県以南），四，九，琉

産地：北見；畑野町-加茂林，羽茂町-冬居。野田；畑野町-加茂林。中村・長尾；羽茂町-冬居，畑野町-加茂林。池上・石沢；分布図(2) no. 51-畑野町-加茂神社，羽茂町-羽茂本郷。

こけしのぶ科

33 コウヤコケシノブ ※

Hymenophyllum barbatum (v. d. B.) Baker

分布：本（青森県），四，九，琉

産地：野田；相川町-北狄。

34 コケシノブ ※

Hymenophyllum wrightii van den Bosch

分布：北，本，四，九

産地：北見；相川町-関。中村・長尾；相川町-関。

35 ウチワゴケ ※

Crepidomanes minutum (Bl.) K. Iwats.

分布：北，本（東北は珍，関東西部以西），四，九，琉，小笠原

産地：北見；相川町-入川。野田；相川，両津市-梅津。中村・長尾；相川町-入川。

36 ハイホラゴケ

Crepidomanes birmanicum (Bedd.) K. Iwats.

分布：北（珍），本，四，九，琉，小笠原

産地：北見；羽茂町-滝平。中村・長尾；羽茂町-滝平。

37 ヒメハイホラゴケ ※

Crepidomanes amabile (Nakai) K. Iwats.

分布：北，本（日本海側），九

産地：北見；赤泊村-庭場。中村・長尾；赤泊村-庭場。

38 アオホラゴケ ※

Crepidomanes latealatum (v. d. B.) Copel.

分布：本（東北，関東，北陸は稀），四

産地：北見；金井町-千種。中村・長尾；羽茂町-滝平。

こぼのいしかぐま科

39 コバノイシカグマ ※

Dennstaedtia scabra (Wall. ex Hook.) Moore

分布：本（東北中部以南），四，九，温帯

産地：北見；畑野町-後山。中村・長尾；小木町-小比叡。池上・石沢；分布図(3) no. 152-小木町-小比叡，羽茂町-羽茂本郷。

40 イヌシダ ※

Dennstaedtia hirsute (Sw.) Mett. ex Miq.

分布：北，本，四，九

産地：北見；相川町-入川。野田；両津市-梅津，相川町-大塚山。中村・長尾；佐渡。秋庭；相川町-入川上流。

41 フモトシダ ※

Microlepia marginata (Panzer.) C. Chr.

分布：本（東北南部以南），四，九，琉

産地：北見；小木町-小比叡，畑野町-後山。中村・長尾；小木町-小比叡，赤泊村-下川茂。池上・石沢；分布図(2) no. 52-真野町-竹田ダム，羽茂町-大橋，小木町-小比叡。

42 イシカグマ

Microlepia strigosa (Thunb.) Presl

分布：本（千葉県南部，伊豆半島，伊豆諸島），四，九，琉，小笠原

産地：野田；経塚山。

43 イワヒメワラビ ※

Hypolepis punctata (Thunb.) Mett. ex Kuhn

分布：本，四，九，琉 暖-熱帯

産地：北見；相川町-大倉。野田；両津市-水津・馬首・大倉越。中村・長尾；羽茂町-大崎。

44 ワラビ ※

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn

var. *latiusculum* (Desv.) Underw. ex Hell.

分布：北，本，四，九，琉，北アメリカ-ヨーロッパ

産地：北見；羽茂町-小泊。野田；畑野町-松ヶ崎，真野，佐和田町-二宮。中村・長尾；佐渡。秋庭；佐和田町-真光寺山。

しのぶ科

45 シノブ ※

Davallia mariesii Moore ex Baker

分布：北，本，四，九，琉

産地：北見；相川町-戸地。野田；羽茂町。中村・長尾；羽茂町-妹背山，両津市-外海府大ザレ川。

ほうらいしだ科

46 イワガネゼンマイ ※

Coniogramme intermedia Hieron.

分布：北、本、四、九、小笠原

産地：北見；相川町－鉾山，赤泊村－下川茂，両津市－水津。野田；真野，両津市－馬首。中村・長尾；羽茂町－大崎。

47 イワガネソウ ※

Coniogramme japonica (Thunb.) Diels

分布：北、本、四、九、琉

産地：北見；羽茂町－小泊，両津市－水津・野浦・羽黒・和木。野田；両津市－水津・加茂，畑野町－畑野・松ヶ崎，赤泊。中村・長尾；佐渡。秋庭；相川町－小川。

48 タチシノブ ※

Onychium japonicum (Thunb.) Kunze

分布：本（福島県，関東地方以西），四、九、琉、小笠原

産地：北見；羽茂町－小泊。野田；両津市－水津。中村・長尾；羽茂町－取立，真野町－国分寺。

49 クジャクシダ ※

Adiantum pedatum L.

分布：北、本、（四、九）

産地：北見；相川町－入川，島内各地。野田；金北山，真野町－西三川，金井町，佐和田町－川原田，両津市－梅津。中村・長尾；佐渡。秋庭；乙和池下。

50 カラクサシダ ※

Pleurosoriopsis makinoi (Maxim. ex Makino) Fomin

分布：北、本、四、九

産地：北見；赤泊村－下川茂。野田；両津市－梅津。中村・長尾；赤泊村－下川茂。

いのもとそう科

51 オオバノイノモトソウ ※

Pteris cretica L.

分布：本（東北中部以西），四、九

産地：北見；相川町－石名。中村・長尾；羽茂。

52 イノモトソウ ※

Pteris multifida Poir.

分布：本（東南北部以南），四、九、琉

産地：北見；羽茂－小泊。

53 オオバノハチジョウシダ ※

Pteris excelsa Gaud.

分布：本（東南北部），四、九、暖帯

産地：北見；赤泊村－下川茂。中村・長尾；小木町－小比叡。

54 オオバノアマクサシダ

Pteris excelsa var. *simplicior* (Tagawa) Shieh

分布：本（関東地方南部），四、九、暖帯

産地：北見；両津市－水津。

ちやせんしだ科

55 コタニワタリ ※

Asplenium scolopendrium L.

分布：北、本、四、九、日本海側 温帯

産地：北見；相川町－入川，畑野町－経塚山，羽茂町－小泊，小木町－深浦。野田；相川町－相川・高千，真野町－西三川。中村・長尾；羽茂町－羽茂，相川鉾山。

56 トラノオシダ ※

Asplenium incisum Thunb.

分布：（北），本、四、九、（琉）

産地：北見；羽茂町－小泊，畑野町－後山，両津市－梅津。野田；金北山，相川町－小川，佐和田町－河原田。中村・長尾；佐渡。

57 チャセンシダ

Asplenium trichomanes L.

分布：北（南部），本（青森県，新潟県西部，神奈川県以西），四、九

産地：北見；相川鉾山。中村・長尾；相川鉾山。

ししがしら科

58 シシガシラ ※

Blechnum niponicum (Kunze) Makino

分布：北、本、四、九（屋久島）

産地：北見；金北山，両津市－梅津，各地林間。野田；金北山，小木。中村・長尾；佐渡。秋庭；佐和田町－真光寺山。

59 オサシダ ※

Blechnum amabile Makino

分布：本、四（高知県），九

産地：北見；相川町－鉾山・戸地。野田；金北山，相川。中村・長尾；相川町－鉾山・戸地。

60 ミヤマシシガシラ ※

Blechnum castaneum Makino

分布：東北－関東北部，信越－北陸，広島県以北の山陰，亜高山帯

産地：金北山

ノート：孢子葉は栄養葉の二倍の長さ，葉柄の中軸の裏面は暗紫褐色，細点がありざらつく

おしだ科

61 オニヤブソテツ ※

Cyrtomium falcatum (L. fil.) Presl

分布：北、本、四、九、琉 海岸地帯

産地：北見；相川町－石花 海岸地帯。野田；赤泊村－大杉，小木町－宿根木，真野町－西三川，相川，両津市－弾崎。中村・長尾；佐渡。秋庭；相川町－小川。

62 ヤブソテツ ※

Cyrtomium fortunei J. Sm.

分布：本、四、九

産地：北見；羽茂-小泊。野田；真野町-西三川，佐和田町-河原田。中村・長尾；羽茂。

63 ヤマヤブソテツ ※

Cyrtomium fortunei var. *clivicola* (Makino) Tagawa

分布：(北)，本，四，九

産地：北見；相川，佐和田町-山田。野田；金井町。中村・長尾；羽茂町-大崎・滝平。秋庭；金井町-平清水。

64 ヒロハヤブソテツ ※

Cyrtomium macrophyllum (Makino) Tagawa

分布：本(新潟県，千葉県以西)，四，九

産地：北見；畑野町-猿八，羽茂町-内野，両津市-大川。野田；両津市-岩首。中村・長尾；小木町-小比叡。池上・石澤；分布図(3) no. 374-新穂村-清水寺越え，両津市-虫崎(古川)。

ノート：分布の北限

65 ジュウモンジシダ ※

Polystichum tripterum (Kunze) Presl

分布：北，本，四，九

産地：北見；相川町-入川，金井町-平山，羽茂町-小泊。野田；金北山，相川町-石花，真野町-西三川。中村・長尾；金北山，相川町-戸地，羽茂町-飯岡。秋庭；相川町-小川。池上・石澤；分布図(2) no. 58 両津市-山居・真更川・見立・大倉越え・金剛山・白瀬・梅津・ドンデン・久知川，相川町-関・寒戸・石花・大倉・矢柄，金井町-新保川，佐和田町-乙和池，畑野町-小倉峠・松ヶ崎・経塚山，真野町-西三川，羽茂町-羽茂本郷，赤泊村-杉の浦・庭場，小木町-深浦。

66 ヒメカナワラビ(キヨズミシダ) ※

Polystichum tsus-simense (Hook.) J. Sm.

分布：本(福島県南端，関東地方以西)，四，九

産地：北見；羽茂町-取立。中村・長尾；羽茂町-取立。

67 カラクサイノデ(シノブイノデ)

Polystichum microchlamys (Christ) Matsum.

分布：北，本(中部，鳥取県) 温帯

産地：北見；両津市-梅津。

68 イノデモドキ ※

Polystichum tagawanum Kurata

分布：本(山形県，関東地方以西)，四，九

産地：池上・石澤；分布図(3) p. 375-新穂村。

69 イノデ ※

Polystichum polyblepharum (Poem. ex Kunze) Presl

分布：本(東北中部以西)，四，九 温帯

産地：北見；小木町-深浦。野田；畑野町-松ヶ崎。中村・長尾；羽茂町。両津市-水津。秋庭；佐和田町-夷相寺。池上・石澤；分布図；分布図(1) no. 2-両津市-鷺崎，相川，新穂ダム，真野町-国分寺，畑野町-長谷・小倉峠・河内，赤泊村-杉の浦，小木町-深浦・強清水。

70 アイアスカイノデ ※

Polystichum longifrons Kurata

分布：本(岩手県以南)，四，九 暖帯

産地：北見；羽茂町-大崎，新穂村-塚原，相川，中村・長尾；羽茂町-大崎，新穂村-塚原，相川。池上・石澤；分布図(1) no. 3-両津市-玉崎，畑野町-島見・小倉峠・河内，畑野町-松ヶ崎・多田。

71 アスカイノデ

Polystichum fiburilloso-paleaceum (Kodama) Tagawa

分布：本(宮城県-紀伊半島)，四(高知県)，九(大分県)

産地：北見；畑野町

72 サカゲイノデ ※

Polystichum retroso-paleaceum (Kodama) Tagawa

分布：北，本，四， 温帯

産地：北見；金北山，乙和池，両津市-梅津。野田；金北山。中村・長尾；佐渡。秋庭；乙和池。池上・石澤；分布図(2) no. 57-両津市-真更川・山居池・久知川・大野川・見立・鷺崎・大倉越え・金剛山・白瀬・ドンデン・梅津・入桑，相川町-大塚山・戸地・矢柄・大倉越え，金北山，金井町-新保川，佐和田町-乙和池，畑野町-経塚山・松ヶ崎，赤泊村-庭場，小木町-小比叡。

73 ツヤナシイノデ

Polystichum ovato-paleaceum (Kodama) Kurata

分布：本(東北南部以西)，四，九 暖帯

産地：北見；佐和田町-乙和池，野田；相川。小木町-蓮華峯。秋庭；佐和田町-真光寺。

74 ナメライノデ

Polystichum × okanum Kurata

分布：本(関東地方以西)，四，九 暖帯

産地：北見；小木町-小比叡。中村・長尾；小木町-小比叡。

75 ホソバナライシダ(ナライシダ) ※

Arachniodes borealis Serizawa

分布：北，本，九(北部) 温帯

産地：北見；相川町-大倉。野田；金北山，金井，相川，新穂。中村・長尾；小木町-小比叡。秋庭；金山金沢口。

76 リョウメンシダ ※

Arachniodes standishii (Moore) Ohwi

分布：北，本，四，九 温帯

産地：北見；ドンデン，金井町-平山，両津市-梅津・和木・馬首・下久知，羽茂町-小泊・村山。野田；相川町-入川。中村・長尾；佐渡。池上・石澤；分布図(2) no. 56-両津市-片の尾・和木・ドンデン・久知川・梅津・白瀬，相川町-大倉越え・岩谷口，小木町-強清水，畑野町-松ヶ崎・多田，真野町-金山，金井町-泉・新保川・平山，羽茂町-下村山。

77 シノブカグマ ※

Arachniodes mutica (Fr. et Sav.) Ohwi

- 分布：北、本、四、九（屋久島） 温帯
産地：北見；金北山。野田；金北山。中村・長尾；金北山。
- 78 ハカタシダ
Arachniodes simplicior (Makino) Ohwi
分布：本（新潟県，福島県南部以西），四、九
産地：北見；羽茂町－木戸。中村・長尾；羽茂町－木戸。
ノート：羽軸沿いに白い筋あり博多織になぞらえる
- 79 オニカナワラビ ※
Arachniodes simplicior var. *major* (Tagawa) Ohwi
分布：本（新潟県，関東地方以西），四、九
産地：池上・石澤；分布図（3）p. 347－両津市－水津。
ノート：分布の北限
- 80 イワヘゴ ※
Dryopteris atrata (Wall. ex Kunze) Ching
分布：本（山形県，新潟県で珍。関東地方南部以西），四、九
産地：北見；佐和田町－青野峠。池上・石澤；分布図（3）p. 374。
- 81 オオクジャクシダ ※
Dryopteris dickinsii (Fr. et Sav.) C. Chr.
分布：北、本、四、九
産地：北見；赤泊村－下川茂。中村・長尾；赤泊村－下川茂。
- 82 ミヤマクマワラビ
Dryopteris polylepis (Fr. et Sav.) C. Chr.
分布：本、四、九 温帯
産地：北見；ドンデン
- 83 ミヤマベニシダ ※
Dryopteris monticola (Makino) C. Chr.
分布：北、本（中国地方北東部以東），四、九
産地：北見；金北山。野田；金北山，真野。中村・長尾；相川，乙和池。
- 84 オシダ（メンマ） ※
Dryopteris crassirhizoma Nakai
分布：北、本、四 温帯
産地：北見；金北山。野田；金北山，大塚山，相川町－入川・石花，小木町－宿根木。中村・長尾；金北山。秋庭；佐和田町－真光寺山。
- 85 オクマワラビ ※
Dryopteris uniformis (Makino) Makino
分布：北（奥尻島），本、四、九
産地：北見；羽茂町－小泊。野田；佐和田町－二宮。中村・長尾；両津市－梅津，佐和田町－真光寺。
- 86 クマワラビ ※
Dryopteris lacera (Thunb.) O. Ktze.
分布：北（奥尻島），本、四、九
産地：北見；羽茂町－小泊。野田；金井町，相川町，真野町，小木町－深浦。中村・長尾；佐渡。秋庭；相川町－小川。
- 87 ミヤマイタチシダ ※
Dryopteris sabsei (Fr. et Sav.) C. Chr.
分布：北、本、四、九
産地：北見；金北山。野田；金北山，大塚山。中村・長尾；経塚山，羽茂町－村山，両津市－和木。秋庭；金北山－金井登山口。
- 88 ナンタイシダ
Dryopteris maximowiczii (Bak.) O. Ktze.
分布：本（東北地方南部～近畿地方） 温帯
産地：北見；羽茂町－小泊。
- 89 シラネワラビ ※
Dryopteris expansa (Pr.) Fr.
分布：北、本、四、九 温帯
産地：北見；金北山。中村・長尾；金北山。
- 90 ナンカイイタチシダ
Dryopteris varia (L.) O. Ktze.
分布：本（千葉県南部以西），四、九，琉
産地：北見；羽茂町－小泊。野田；両津市－水津，相川町－達者。
- 91 ヤマイタチシダ ※
Dryopteris bissetiana (Bak.) C. Chr.
分布：北、本、四、九
産地：中村・長尾；佐渡。秋庭；相川町－小川。
- 92 ベニシダ ※
Dryopteris erythrosora (Baton) O. Ktze
分布：本、四、九，（トカラ列島）
産地：北見；相川町－山ノ神，両津市－梅津。野田；相川，佐和田町－二宮，両津市－河崎。中村・長尾；佐渡。秋庭；佐和田町－実相寺。池上・石澤；分布図（2）no. 54－両津市－大川・片の尾・久知河内・ドンデン・梅津，相川町－鉾山・下相川・二見・金井町－新保・泉，佐和田町－市野沢。新穂村－上新穂・大野・根本寺・清水寺・青木，畑野町－加茂神社・寺田・松ヶ崎。真野町－国分寺・竹田。赤泊村－杉の浦・小石。羽茂町－大橋。小木町－堂の釜・小比叡。
- 93 トウゴクシダ ※
Dryopteris nipponiensis Koidz.
分布：本（青森県三沢市，宮城県，山形県以南），四、九
産地：北見；真野町－合澤。秋庭；乙和池道。池上・石澤；分布図（2）no. 55－新穂村－根本寺，羽茂町－大橋。
- 94 オオベニシダ（ヒロハベニシダ） ※
Dryopteris hondoensis Koidz.
分布：本（東北中部以南），四、九
産地：北見；新穂。中村・長尾；羽茂町－新倉山。秋庭；乙和池。
- ひめした科
- 95 ミゾシダ ※
Stegogramma pozoi (Lagasca) K. Iwats.

- subsp. *mollissima* (Fischer ex Kunze) K. Iwats.
 分布：北, 本, 四, 九, (琉)
 産地：北見；金北山。野田；両津市-河崎・水津・馬首・
 鷺崎。相川町-金泉・戸中・大塚山, 真野, 新穂。
 中村・長尾；佐渡。秋庭；佐和田町-乙和池道。
- 96 ミヤマワラビ
Thelypteris phegopteris (L.) Slosson ex Rydb.
 分布：北, 本, 四, 九 温帯
 産地：北見；金北山。中村・長尾；金北山。
- 97 ゲジゲジシダ ※
Thelypteris decursive-pinnata (van Hall) Ching
 分布：北, 本, 四, 九, 琉
 産地：北見；相川町-石名, 両津市-梅津・北小浦・両
 尾・下久知。野田；両津市-河崎・大倉越え。中
 村・長尾；羽茂町-大石。
- 98 ミゾシダモドキ
Thelypteris omeiensis (Bak.) Ching
 分布：本(千葉以西), 四, 九 暖帯
 産地：野田；畑野町-松ヶ崎。
- 99 ヤワラシダ ※
Thelypteris laxa (Fr. et Sav.) Ching
 分布：本(東北中部以西), 四, 九 暖帯
 産地：北見；小木町-小比叡。野田；両津市-大川。中
 村・長尾；小木町-小比叡。
- 100 ヒメワラビ ※
Thelypteris torresiana (Gaud.) Alston
 var. *calvata* (Bak.) K. Iwats.
 分布：本(東北中部以西), 四, 九 暖帯
 産地：北見；畑野町。中村・長尾；羽茂町-大崎。
- 101 ヒメシダ ※
Thelypteris palustris (Salisb.) Schott
 分布：北, 本, 四, 九 世界の温帯
 産地：北見；金北山, 両津市-梅津・野浦, 相川町-入
 川。野田；相川, 金井。中村・長尾；佐渡。秋庭；
 佐和田町-乙和池道。
- 102 オオバショリマ ※
Thelypteris quelpaertensis (Christ) Ching
 分布：北, 本, 四, 九(屋久島) 温帯
 産地：北見；金北山。野田；金北山。中村・長尾；相川
 町-戸地, 金北山。
- 103 ハリガネワラビ ※
Thelypteris japonica (Bak.) Ching
 分布：本, 四, 九
 産地：北見；金北山。野田；金北山, 両津市-水津, 赤
 泊, 新穂。中村・長尾；羽茂町-木戸・天沢。秋
 庭；佐和田町-真光寺山。
- 104 イワハリガネワラビ (コウライヤワラシダ)
Thelypteris japonica var. *glabrata* Ching
 分布：朝鮮
 産地：北見；金北山, 相川町-戸地。中村・長尾；金北
 山, 相川町-戸地。

- 105 ニッコウシダ
Thelypteris nipponica (Fr. et Sav.) Ching
 分布：北, 本(中部地方以北) 北方系
 産地：秋庭；妙見山腹
- 106 ハシゴシダ ※
Thelypteris glanduligera (Kunze) Ching
 分布：本(福島県南端, 佐渡, 関東地方以西), 四, 九, 奄
 美諸島
 産地：北見；羽茂町-天沢。中村・長尾；羽茂町-天沢。
- 107 ホシダ
Thelypteris acuminata (Houtt.) Morton
 分布：本(福島県, 新潟県, 関東地方以西), 四, 九, 琉
 産地：北見；羽茂町-小泊。中村・長尾；羽茂町-大泊。
- いわでんだ科
- 108 クサソテツ ※
Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro
 分布：北, 本, (四), 九
 産地：北見；両津市-梅津。中村・長尾；佐渡。秋庭；佐
 和田町-真光寺道二の川。
- 109 イヌガンソク ※
Onoclea orientalis (Hook.) Hook.
 分布：北, 本, 四, 九
 産地：北見；相川鉾山, 両津市-梅津・野浦。野田；佐
 和田町-二宮, 相川町-戸中・石花, 赤泊, 経塚
 山。中村・長尾；佐渡。秋庭；佐和田町-乙和池。
 池上・石澤；分布図(1) no. 1-大倉越え, 大野川,
 金井町-平清水, 金北山, 佐和田町-乙和池, 新
 穂村-清水寺・湧上, 畑野町-島見・猿八・丸山・
 多田, 小木町-深浦, 両津市-片の尾・久知川・赤
 玉越え・ドンデン・山居。
- 110 コウヤワラビ ※
Onoclea sensibilis L. var. *interrupta* Maxim.
 分布：北, 本, 九
 産地：北見；両津市-梅津。野田；両津市-水津・岩首・
 梅津。中村・長尾；佐渡。
- 111 イワデンダ ※
Woodsia polystichoides Eaton
 分布：北, 本, 四, 九
 産地：北見；両津市-赤玉, 相川町-大倉・矢柄。野田；
 金北山, 相川町-入川。中村・長尾；相川鉾山, 両
 津市-内海府。秋庭；相川町-入川上流。
- 112 ウスヒメワラビ ※
Acystopteris japonica (Luer) Nakai
 分布：本(東北南部) 四, 九, 屋久島
 産地：北見；小木町-小比叡。中村・長尾；小木町-小
 比叡。池上・石澤；分布図(3) no. 155-小木町-
 小比叡。
- 113 ヘビノネゴザ ※
Athyrium yokoscense (Fr. et Sav.) Christ
 分布：北, 本, 四, 九

- 産地：北見；相川町-大倉。野田；金北山，相川町-相川・入川。中村・長尾；佐渡。
ノート：鉾産物（カドミウム）の指標植物
- 114 ヒロハヘビノネゴザ
Athyrium yokoscense var. *dilatatum* Tagawa
産地：北見；ドンデン。中村・長尾；ドンデン。
- 115 イワイヌワラビ
Athyrium nikkoense Makino
分布：北，本（中部地方以北）北方系
産地：北見；相川鉾山。中村・長尾；相川鉾山。
- 116 ミヤマヘビノネゴザ
Athyrium rupestre Kodama
分布：北，本（中部地方以北）北方系
産地：北見；相川町-入川・大倉。
- 117 サトメシダ ※
Athyrium deltoidofrons Makino
分布：北，本，四，九 温-暖帯
産地：北見；相川町-入川。野田；相川町-石花。中村・長尾；佐渡。秋庭；妙見山中腹。
- 118 ヤマイヌワラビ ※
Athyrium vidalii (Fr. et Sav.) Nakai
分布：北，本，四，九，屋久島
産地：北見；相川町-矢柄。野田；金北山，真野，相川，小木，両津市-岩首・水津。中村・長尾；羽茂町-村山・大崎。
- 119 エゾイヌワラビ
Athyrium vidalii
var. *yamadae* (Miyabe et Kudo) Miyabe et Tatew.
産地：北見；羽茂町-掘割。中村・長尾；羽茂町-掘割。
ノート：小羽片は深裂，鋭頭，包膜は歯牙縁
- 120 カラクサイヌワラビ ※
Athyrium clivicola Tagawa
分布：北，本，四，九，屋久島
産地：北見；羽茂町-新倉山。中村・長尾；羽茂町-新倉山。
- 121 ヒロハイヌワラビ ※
Athyrium wardii (Hook.) Makino
分布：本（東北地方西南部以南）四，九
産地：北見；真野，両津市-水津。中村・長尾；真野，両津市-水津。
ノート：オオヒロハノイヌワラビ var. *majus* Makino
野田；佐和田町-乙和池。
- 122 イヌワラビ ※
Athyrium niponicum (Mett.) Hance
分布：(北)，本，四，九
産地：北見；小木町-深浦。野田；相川，小木，真野，畑野。中村・長尾；佐渡。
- 123 オオサトメシダ ※
Athyrium × *multifidum* Rosenst.
分布：本，四，九
産地：北見；羽茂町-犬落。中村・長尾；羽茂町-犬落。
- ノート：サトメシダとヤマイヌワラビの雑種
- 124 ハコネシケチシダ ※
Cornopteris christenseniana (Koidz.) Tagawa
分布：本，四，九
産地：北見；両津市-山毛櫓ヶ平山。野田；相川町-関。中村・長尾；相川町-関。
- 125 シケチシダ ※
Cornopteris decurrenti-alata (Hook.) Nakai
分布：本，四，九
産地：北見；畑野町-大久保。中村・長尾；小木町-小比叡，相川町-関。池上・石澤；分布図(3) no. 156-両津市-大川・願・野城・水津，相川町-矢柄川・大倉越え，畑野町-経塚山，小木町-小比叡。
- 126 オオヒメワラビモドキ ※
Deparia unifurcata (Bak.) M. Kato
分布：本（北陸地方，東海地方以西），四
産地：北見；羽茂町-犬落。中村・長尾；羽茂町-犬落。
- 127 オオヒメワラビ ※
Deparia okuboana (Makino) M. Kato
分布：本，四，九
産地：北見；真野町-合澤。野田；アオネバ越え，両津市-久知川上流。中村・長尾；相川町-戸地。
- 128 ミヤマシケシダ (ハクモウイノデ) ※
Deparia pycnosora (Christ) M. Kato
分布：本，四，九
産地：北見；相川町-大倉，両津市-馬首。野田；金北山，相川町-石花越え。中村・長尾；相川町-関。
ノート：ミヤマシケシダ var. *pycnosora* 葉柄が細い，葉裏に腺毛がない，ハクモウイノデ var. *albosquamata* 葉柄が太い，葉裏に腺毛あり。
- 129 ホソバシケシダ ※
Deparia conilii (Fr. et Sav.) Makino
分布：北，本，四，九
産地：中村・長尾；相川町-関。
- 130 シケシダ ※
Deparia japonica (Thunb.) M. Kato
分布：本，四，九
産地：北見；羽茂町-小泊。野田；金井，真野，佐和田町-二宮。中村・長尾；佐渡。
- 131 シロヤマシダ
Diplazium hachijoense Nakai
分布：本（関東南部，北陸以西）四，九
産地：野田；佐渡。
- 132 オニヒカゲワラビ ※
Diplazium nipponicum Tagawa
分布：本，四，九
産地：北見；両津市-山毛櫓ヶ平山。中村・長尾；羽茂町-大崎，赤泊村-下川茂，両津市-椿。
- 133 キヨタキシダ ※
Diplazium squamigerum (Mett.) Matsum.

- 分布：(北), 本, 四, 九
産地：北見；ドンデン。中村・長尾；羽茂町-大崎。
- 134 ヌリワラビ ※
Diplazium mesosorum (Makino) Koidz.
分布：本, 四, 九
産地：中村・長尾；羽茂町-政の滝。
- うらほし科
- 135 ビロードシダ ※
Pyrrosia linearifolia (Hook.) Ching
分布：北, 本, 四, 九, 琉
産地：北見；相川町-入川・石花, 羽茂町-飯岡。野田；
相川町-入川。中村・長尾；相川町-岩谷口。
- 136 イワオモダカ ※
Pyrrosia hastate (Thunb. ex Houtt.) Ching
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；相川町-石花, 新穂村-上新穂, 両津市-
馬首。野田；赤泊村-上川茂。中村・長尾；相川
町-関, 赤泊村-上川茂。
- 137 ホテイシダ ※
Lepisorus annuifrons (Makino) Ching
分布：北, 本, 四, 九 温-暖帯
産地：北見；相川町-入川・石花, 羽茂町-飯岡。
中村・長尾；相川町-岩谷口, 両津市-梅津。
- 138 ノキシノブ ※
Lepisorus thunbergianus (Kaulf.) Ching
分布：(北), 本, 四, 九, 琉
産地：北見；相川町-石花。野田；両津市-岩首, 赤泊
村-大杉, 佐和田町-乙和池, 大塚山。中村・長
尾；佐渡。
- 139 マメツタ ※
Lemmaphyllum microphyllum Presl
分布：本 (東北南部以南), 四, 九, 琉
産地：北見；真野, 羽茂町-飯岡, 相川町-石花。野田；
小佐渡。中村・長尾；羽茂町-飯岡・大石。
- 140 クリハラン ※
Neocheiropteris ensata (Thunb.) Ching
分布：本(関東地方以西), 四, 九, 琉
産地：北見；赤泊村-杉の浦。野田；赤泊村-杉の浦。
中村・長尾；赤泊村-杉の浦。
- 141 ミツデウラボシ ※
Crypsinus hastatus (Thunb.) Copel.
分布：北(西南部), 本, 四, 九, 琉 暖帯
産地：北見；相川町-南片辺・船山。野田；アオネバ越
え, 相川町-入川。中村・長尾；赤泊村-下川茂。
- 142 オシャグジデング ※
Polypodium fauriei Christ
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；相川町-入川・関越え, 畑野町-大久保, 羽
茂町-飯岡。野田；両津市-河崎, 畑野。中村・長
尾；羽茂町-滝平, 両津市-梅津・黒姫越え。

さんしょうも科

- 143 サンショウモ ※
Salvinia natans (L.) All.
分布：本, 四(瀬戸内側), 九(西部)
産地：北見；羽茂町-小泊。中村・長尾；佐渡。
- 144 オオアカウキクサ ※
Azolla japonica Fr. et Sav.
分布：本, 四, 九
産地：北見；金井町-中興(千種)。
ノート：養魚業者の移入した水草に着いて入ったといわ
れる。

種子植物

裸子植物

いちょう科

- 1 イチョウ ※
Ginkgo biloba L.
分布：中国原産, 室町時代より植栽
産地：北見；羽茂町-村山, 島内各地。

まつ科

- 2 カラマツ
Larix kaempferi (Lamb.) Carr.
分布：本(宮城県, 新潟県以南-中部山岳地)
産地：羽茂町-小泊。
- 3 ヒマラヤスギ (ヒマラヤシーダー)
Cedrus deodara (Roxb.) G. Don ex Loudon
分布：西ヒマラヤ, アフガニスタン東部, 明治12年頃移
入
産地：学校, 公園などに植栽。
- 4 クロマツ ※
Pinus thunbergii Parlatores
分布：本, 四, 九, 琉
産地：北見；相川町-千本。野田；相川。
- 5 アカマツ ※
Pinus densiflora Sieb. et Zucc.
分布：北, 本, 四, 九, 屋久島
産地：北見；相川町-北狄。
- 6 アイグロマツ
Pinus densi-thunbergii Uyeki
産地：佐和田町-八幡海岸
ノート：クロマツとアカマツの中間型
- 7 ダイオウマツ
Pinus palustris Mill.
分布：北アメリカ
ノート：金井町-新保八幡宮境内植栽, 樹齢約100年
- 8 チョウセンゴヨウ
Pinus koraiensis Sieb. et Zucc.
分布：本(中部), 四(愛媛県東赤石山)
産地：北見；金井町-吉井本郷。金井町-新保八幡宮境

内植栽

- 9 ゴヨウマツ (ヒメコマツ)
Pinus parviflora Sieb. et Zucc.
 分布: 北(南部), 本, 四, 九
 産地: 北見; 相川町-南片辺・小野見・関。
- 10 キタゴヨウ ※
Pinus parviflora var. *pentaphylla* (Mayr) Henry
 分布: 北, 本(中北部)
 産地: 池上・石澤; 分布図(3) no. 158-両津市-真更川・山居池。相川町-岩谷口・五十浦・小野見。
- 11 モミ ※
Abies firma Sieb. et Zucc.
 分布: 本(秋田県, 岩手県以南), 四, 九
 産地: 北見; 羽茂町-小泊, 金井町-吉井本郷。
 ノート: 各地の社寺の境内に植栽
- 12 トウヒ
Picea jezoensis (Sieb. et Zucc.) Carr.
 var. *hondoensis* (Mayr) Rehder
 分布: 本(亜高山帯)
 産地: 北見; 羽茂町-小泊。
- すぎ科
- 13 スギ ※
Cryptomeria japonica (L. fil.) D. Don.
 分布: 本, 四, 九, 屋久島
 産地: 北見; 相川町-南片辺船山。野田; 金北山, 相川町-戸中・大倉越え。
- 14 アシウスギ ※
Cryptomeria japonica var. *radicans* Nakai
 分布: 日本海側の多雪地帯
 産地: 大佐渡山脈東北山地
- 15 コウヨウザン
Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook.
 分布: 中国原産, 江戸時代に渡来, 植栽
 産地: 北見; 新穂村-濁上, 赤泊村-徳和。金井町-新保。八幡宮境内 植栽 樹齢約100年
- 16 メタセコイヤ (アケボノスギ)
Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng
 分布: 中国揚子江奥地で発見(1945)
 産地: 各学校, 公園に植栽
- 17 ヌマスギ (ラクウショウ)
Taxodium distichum (L.) Rich
 分布: 北米東部, 明治19年(1886) 小石川植物園へ
 産地: 小木町-海潮寺, 金井町-新保八幡宮境内。
- 18 セコイヤ (イチイモドキ)
Sequoia sempervirens Endl.
 分布: 北米西北部
 産地: 金井町-新保八幡宮境内植栽。樹齢約100年

こうやまき科

- 19 コウヤマキ ※
Sciadopitys verticillata (Thunb.) Sieb. et Zucc.
 分布: 本(福島県以南), 四, 九
 産地: 北見; 羽茂町-小泊。島内の各社寺に植栽
- ひのき科
- 20 ミヤマビャクシン ※
Juniperus chinensis L. var. *sargentii* Henry
 分布: 北, 本, 四, 九, 屋久島
 産地: 北見; 相川町-後尾・岩谷口, 両津市-北鶴島。
- 21 ネズミサシ (トショウ, ネズ) ※
Juniperus rigida Sieb. et Zucc.
 分布: 本(岩手県以南), 四, 九
 産地: 北見; 羽茂町-飯岡, 相川町-北狄。野田; 金北山, 佐和田町-二宮, 相川町-大塚山・外海府, 両津市-片野尾風島弁天。秋庭; 佐和田町-真光寺山。
- 22 ハイネズ ※
Juniperus conferta Parlatore
 分布: 北, 本, 九, 種子島
 産地: 北見; 羽茂町-亀ノ脇。野田; 真野町-西三川・真野, 羽茂町-素浜。
- 23 ミヤマネズ
Juniperus communis L.
 var. *nipponica* (Maxim.) Wilson
 分布: 北(アポイ岳), 本(北部高山)
 産地: 北見; 金北山, 相川町-高千・外海府(真保一輔)。野田; 相川町-石花(リシリビャクシン)。
- 24 ヒノキ ※
Chamaecyparis obtusa (Sieb. et Zucc.) Endl.
 分布: 本(福島県以南), 四, 九, 屋久島
 産地: 北見; 相川町-北狄・北片辺。
- 25 サワラ
Chamaecyparis pisifera (Sieb. et Zucc.) Endl.
 分布: 本(岩手県以南), 九
 産地: 北見; 羽茂町-村山。
 ノート: 園芸品ヒムロ, シノブヒバ, ヒヨクヒバ (var. *filifera* Mast) 北見; 羽茂町-村山, 両津市-梅津
- 26 ネズコ (クロベ)
Thuja standishii (Gord.) Carr.
 分布: 本, 四,
 産地: 北見; 相川町-入川白滝, 両津市-馬首。
- 27 コノテガシワ
Thuja orientalis L.
 分布: 中国原産 江戸時代中頃に移入
 産地: 庭園植栽
- 28 アスナロ
Thujopsis dorabrata Sieb. et Zucc.
 分布: 本, 四, 九

産地：北見；相川町－南片辺船山。野田；金北山，両津市－馬首

29 ヒノキアスナロ ※

Thujaopsis dorabrata var. *hondai* Makino

分布：北（渡島），本北部（太平洋側－栃木県）

産地：佐渡の産地に自生するものはこの型

いぬがや科

30 イヌガヤ

Cephalotaxus harringtonia (Knight) K. Koch

分布：本（岩手県以南），四，九，屋久島

産地：北見；佐和田町－乙和池，両津市－真更川。野田；羽茂町，外海府。

31 ハイイヌガヤ ※

Cephalotaxus harringtonia var. *nana* (Nakai) Rehder

分布：北（西南部），本（日本海側），四

産地：北見；両津市－和木。野田；金北山。池上・石澤；分布図（2）no. 60－両津市－顯・山居・和木・梅津・杉池，相川町－大倉・石花・戸地・達者，佐和田町－乙和池，新穂村－瀧上・生椿・新穂ダム，畑野町－経塚山・猿八・小倉峠，真野町－金山・静平・竹田ダム・外山。

いちい科

32 イチイ ※

Taxus cuspidata Sieb. et Zucc.

分布：北，本，四，九

産地：北見；相川町－南片辺船山，金北山以北の尾根，野田；金北山，大塚山，相川町－大倉越え，新穂村－国見山。

33 カヤ ※

Torreya nucifera (L.) Sieb. et Zucc.

分布：本（宮城県以南），四，九，屋久島

産地：北見；佐和田町－乙和池，小佐渡。野田；畑野町，赤泊村－徳和。秋庭；佐和田町－真光寺山。

34 チャボガヤ ※

Torreya nucifera var. *radicans* Nakai

分布：本（日本海側）

産地：池上・石澤；分布図（1）no. 4－相川町－達者，新穂村－新穂ダム・清水寺越え，畑野町－畑野・島見・小倉・猿八，両津市－水津。

35 ツナギガヤ

Torreya nucifera var. *orticulata* Miyoshi

産地：北見；佐和田町－二宮，両津市－片野尾，野田；佐和田町－二宮，両津市－大倉越え。

被子植物

双子葉植物

離弁花類

くるみ科

36 オニグルミ ※

Juglans mandshurica Maxim.

var. *sachalinensis* (Miyabe et Kudo) Kitamura

分布：北，本，四，九

産地：北見；相川町－入川。野田；金北山。

37 ヒメグルミ

Juglans mandshurica

var. *cordiformis* (Makino) Kitamura

産地：野田；相川町－入川（北見健彦）。

38 サワグルミ ※

Pterocarya rhoifolia Sieb. et Zucc.

分布：北，本，四，九

産地：北見；佐和田町－山田，両津市－和木・馬首。野田；金北山，佐和田町－二宮。池上・石澤；分布図（3）no. 159－両津市－黒姫・久知河内，相川町－大倉・後尾・戸地，大塚山，金北山，妙見山，赤泊村－戸山。秋庭；金北山。

やなぎ科

39 ヤマナラシ ※

Populus sieboldii Miq.

分布：北，本，四

産地：北見；佐和田町－石田，両津市－加茂歌代。野田；金井町。秋庭；佐和田町－乙和池道。

40 ウラジロハコヤナギ（ギンドロ）

Populus alba L.

分布：ヨーロッパ原産 植栽

産地：北見；佐和田町－河原田，畑野町。野田；佐和田町－河原田。

41 ドロヤナギ

Populus maximowiczii A. Henry

分布：北，本（中部以北），択捉，樺太

産地：北見；金井町（真保一輔）

42 マルバヤナギ（アカメヤナギ）※

Salix chaenomeloides Kimura

分布：本（宮城県，山形県中部以南），四

産地：北見；羽茂町－飯岡。

43 タチヤナギ ※

Salix subfragilis Andersson

分布：北，本，四，九

産地：北見；羽茂町－小泊。野田；国府川。池上・石澤；分布図（3）no. 161－真野町－西三川。

44 ジャヤナギ（オオシロヤナギ）

Salix eriocarpa Fr. et Sav.

分布：本（関東以南），四，九

産地：北見；佐和田町－河原田，両津市－野浦。

- 45 シロヤナギ
Salix jessoensis Seemen
分布：北, 本(東北地方)
産地：野田；両津市－馬首。
- 46 コゴメヤナギ
Salix serissaefolia Kimura
分布：本(関東, 中部, 近畿)
産地：北見；赤泊村, 両津(真保一輔)。野田；相川町－高千・石花。
- 47 シダレヤナギ
Salix babylonica L.
分布：中国原産 植栽
- 48 ウンリュウヤナギ
Salix matsudana Koidz. var. *tortuosa* Vilm.
分布：中国原産 植栽
- 49 ヤマネコヤナギ(バッコヤナギ) ※
Salix bakko Kimura
分布：北(西南), 本(近畿以東), 四
産地：北見；羽茂町－小泊, 両津市－梅津。野田；金北山, 両津市－梅津。
- 50 オノエヤナギ ※
Salix sachalinensis Fr. Schm.
分布：北, 本, 四
産地：北見；両津市－梅津, 羽茂町－飯岡, 相川町－大倉。野田；馬首。
- 51 キヌヤナギ ※
Salix kinuyanagi Kimura
分布：本(関東以西), 四, 九
産地：北見；両津市－豊岡。野田；両津市－梅津。
- 52 オオキツネヤナギ ※
Salix futura Seemen
分布：本(中部, 関東地方)
産地：野田；金北山, 佐和田町－乙和池。
- 53 キツネヤナギ ※
Salix vupina Andersson
分布：北, 本(東北地方) 北方系
産地：北見；ドンデン, 相川町－入川, 小木町－澤。秋庭；佐和田町－真光寺山。
- 54 イヌコリヤナギ ※
Salix integra Thunb.
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；ドンデン。野田；金北山, 畑野町, 両津市－馬首。
- 55 コリヤナギ ※
Salix koriyanagi Kimura
分布：朝鮮から渡来 植栽
産地：北見；羽茂町－飯岡。
- 56 カワヤナギ ※
Salix gilgiana Seemen
分布：北, 本
産地：野田；国府川
- 57 ネコヤナギ ※
Salix gracilistyla Miq.
分布：北, 本, 四, 九, 朝鮮, 中国東北部
産地：北見；両津市－梅津, 相川町－北狄。野田；金北山, 佐和田町－二宮, 相川。
- かばのき科
- 58 ミヤマハンノキ
Alnus maximowiczii Call.
分布：北, 本(加賀白山以北, 伯耆大山)
産地：北見；両津市－真更川・笠取り峠。
- 59 ヒメヤシャブシ ※
Alnus pendula Matsumura
分布：北, 本
産地：北見；相川町－入川, アオネバ越え。野田；金北山, 大倉越え, 佐和田町－乙和池。秋庭；佐和田町－真光寺山。池上・石澤；分布図(3) no. 163－両津市－黒姫・北小浦・真更川・アオネバ越え, 相川町－戸地・大塚山, ドンデン, 妙見山, 和田町－真光寺・青野, 新穂村－中村・ときセンター。
- 60 ヤシャブシ
Alnus firma Sieb. et Zucc.
分布：本(福島県－紀伊半島の太平洋側)
産地：北見；ドンデン
- 61 ハンノキ ※
Alnus japonica (Thunb.) Steud.
分布：北, 本, 四, 九, 琉
産地：北見；佐和田町－乙和池, 羽茂町－村山。野田；金北山, 金井町, 羽茂町。池上・石澤；分布図(3) no. 162－相川町－中山峠・後尾, 金井町－千種, 佐和田町－河原田・真光寺, 畑野町－河内。
- 62 ケヤマハンノキ
Alnus hirsuta Turcz.
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；相川町－石名(真保一輔)。
- 63 ヤマハンノキ ※
Alnus hirsuta var. *sibirica* (Fischer) C. K. Schn.
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；相川町－小野見・岩谷口。野田；相川町－石花, 両津市－馬首。池上・石澤；分布図(2) no. 62－両津市－真更川・北鶴島・大野川・大倉越え・平松戴山(馬首)。
- 64 ハシバミ
Corylus heterophylla Fischer ex Besser
var. *thunbergii* Bl.
分布：北, 本, 九
産地：北見；ドンデン
- 65 ツノハシバミ ※
Corylus sieboldiana Bl.
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；羽茂町－小泊, 相川町－山の神。野田；金

北山, アオネバ越え。秋庭; 佐和田町-真光寺山。
66 サワシバ ※
Carpinus cordata Bl.

分布: 北, 本, 四 (九)

産地: 北見; 相川町-入川。野田; アオネバ越え。

67 イヌシデ ※

Carpinus tschonoskii Maxim.

分布: ほん (岩手県, 新潟県以南), 四, 九

産地: 北見; 相川町-入川・アオネバ越え。

68 アカシデ ※

Carpinus laxiflora (Sieb. et Zucc.) Bl.

分布: 北, 本, 四, 九

産地: 北見; 畑野町-飯塚山, 相川町-兩片辺・大塚山。

野田; 畑野町-多田~両津市-河崎。

ぶな科

69 ブナ ※

Fagus crenata Blume

分布: 北 (渡島), 本, 四, 九 温帯

産地: 北見; ドンデン, 相川町-北片辺, 両津市-長江,
佐和田町-乙和池。野田; 金北山。秋庭; 佐和田
町-真光寺山。

70 イヌブナ

Fagus japonica Maxim.

分布: 本 (岩手県以南), 四, 九

産地: 北見; 妙見山

ノート: 日本海側の多雪地帯には殆どない

71 ウバメガシ

Quercus phillyraeoides A. Gray

分布: 本 (神奈川県以西の太平洋側), 四

産地: 北見; 金井町-千種。生垣に植栽

72 クヌギ ※

Quercus acutissima Carruthers

分布: 本 (岩手県, 山形県以南), 四, 九

産地: 北見; 羽茂町-小泊・上山田, 小木町-金田新田。

野田; 両津市-加茂。

73 カシワ ※

Quercus dentata Thunb. ex Murray

分布: 北, 本, 四, 九

産地: 北見; 羽茂町-小泊, 大佐渡, 小佐渡の日本海側。
野田; 相川町-戸中, 両津市-真更川。池上・石
澤; 分布図 (2) no. 65-相川町-寒戸・大塚山・達
者・下戸・大浦・高瀬・小川, 羽茂町-羽茂本郷,
小木町-宿根木, 両津市-笠取り峠。

74 アオカシワ

Quercus dentata var. *fallax* Nakai

産地: 北見; 両津市-北鶴島。

75 ミズナラ ※

Quercus crispula Blume

分布: 北, 本, 四, 九 温帯

産地: 北見; 小木町-宿根木。野田; 金北山, 経塚山, 金

井町, 佐和田町-乙和池。秋庭; 相川町-片辺越
え。池上・石澤; 分布図 (3) no. 164- (佐渡全域)。

76 ミヤマナラ ※

Quercus crispula var. *horikawae* H. Ohba

分布: 本 (中北部) 雪崩斜面, 亜高山帯

産地: 大佐渡山脈海拔1000m以上の脊稜部

77 モンゴリナラ

Quercus mongolica Fischer ex Ledeb.

分布: 北, 本 (東北地方) にかけて分布と思われていたモ
ンゴル, 中国東北, ウスリー, アムール

産地: 北見; 佐和田町-乙和池, 相川町-山ノ神。野田;
小木町-深浦。金北山, 佐和田町-乙和池。

ノート: カシワモドキ (ミズナラ×カシワの雑種) の誤認
と思われる。

78 コナラ ※

Quercus serrata Thunb. et Murray

分布: 北, 本, 四, 九 温~暖帯

産地: 北見; ドンデン, 佐和田町-乙和池, 小木町-深
浦。野田; 小木町-深浦, 畑野町-松ヶ崎, 相川
町, 金北山。秋庭; 佐和田町-真光寺。池上・石
澤; 分布図 (2) no. 66-両津市-杉池・岩首・姫
崎, 相川町-二つ岩・下相川・青野峠。妙見山, 畑
野町-松ヶ崎, 羽茂本郷。

79 テリハコナラ

Quercus serrata

var. *donarium* (Nakai) Kitamura et Horikawa

分布: 本, 四, 九

産地: 北見; 羽茂町-小泊, 小佐渡南部。

80 ナラカシワ (カシワナラ) ※

Quercus aliena Blume

分布: 本 (秋田県, 岩手県以南) 四, 九

産地: 野田; 小木町-深浦, 相川町。秋庭-真光寺山。

81 オオバコナラ

Quercus major Nakai

分布: 本, 四, 九

産地: 野田; 小木町-深浦。

ノート: ナラカシワ×コナラの雑種

82 アカガシ ※

Quercus acuta Thunb. ex Murray

分布: 本 (宮城県, 新潟県以南), 四, 九

産地: 北見; 羽茂町-小泊・村山・天澤, 真野町-田の
澤。野田; 真野町-西三川。池上・石澤; 分布図
(1) no. 7-金井町-千種, 真野町-金山・西三川。

83 アラカシ

Quercus glauca Thunb. et Murray

分布: 本 (宮城県, 石川県以南), 四, 九

産地: 野田; 畑野町-松ヶ崎, 小木町-蓮華峯。

84 ウラジロガシ ※

Quercus salicina Blume

分布: 本 (宮城県, 新潟県以南), 四, 九

産地: 北見; 真野町-田切須, 羽茂町-小泊・村山, 両

津市-和木・米籠・太川・野浦・片野尾。野田；小木町，畑野町-松ヶ崎。池上・石澤；分布図(1) no. 8-両津市-赤玉，畑野町-松ヶ崎・河内・丸山，真野町-大須・西三川・竹田，赤泊村-赤泊・莚場・竹の鼻・杉の浦，羽茂町-羽茂本郷・滝平。

85 クリ ※

Castanea crenata Sieb. et Zucc.

分布：北，本，四，九 温-暖帯

産地：北見；相川町-北狄。野田；佐和田町-二宮，大塚山。秋庭；佐和田町-真光寺山。

86 スダジイ ※

Castanopsis sieboldii (Makino)

Hatsusima ex Yamazaki et Mashiba

分布：本(福島県，新潟県以南)，四，九

産地：北見；羽茂町-小泊・村山，真野町-田切須，相川町-椎木澤，両津市-和木・椎泊。野田；赤泊村-徳和。

87 ツブラジイ

Castanopsis cuspidata (Thunb. ex Murray) Schottky

分布：本(関東地方以南)，四，九，屋久島

産地：野田；小木町，金井町-新保，佐和田町-二宮。

88 マテバジイ

Lithocarpus edulis (Makino) Nakai

分布：本，四，九，琉

産地：金井町新保運動公園 植栽

にれ科

89 ムクノキ

Aphananthe aspera (Thunb.) Planch.

分布：本(関東地方以南)，四，九，琉

産地：北見；相川町-石花(真保一輔)。

90 エゾエノキ ※

Celtis jessoensis Koidz.

分布：北，本，四，九

産地：北見；相川町-北狄・入川。野田；相川町-戸中

91 エノキ ※

Celtis sinensis Pers. var. *japonica* (Planch.) Nakai

分布：本，四，九，温-暖帯

産地：北見；相川町-入川。野田；金井町-中興，新穂村，相川町-石花，金北山。

92 ケヤキ ※

Zelkova serrata (Thunb.) Makino

分布：本，四，九

産地：北見；相川町-入川。野田；相川町-戸中。

93 メゲヤキ

Zelkova serrata forma *stipulacea* (Makino) K. Ito

産地：北見；相川町-入川。野田；金井町。

ノート：葉の表裏に密毛，材は赤色で血樫と呼ぶ

94 ハルニレ ※

Ulmus davidiana Planch.

var. *japonica* (Rehder) Nakai

分布：北，本，四，九

産地：北見；相川町-大倉・矢柄。

ノート：*コブニレ forma *suberosa* (Turcz.) Nakai

相川町-入川・石名(真保一輔)

95 オヒョウ(アッシ) ※

Ulmus latiniata (Trautv.) Mayr

分布：北，本，四，九 温帯

産地：北見；相川町-戸地・矢柄，両津市-鷺崎。

96 アキニレ

Ulmus parvifolia Jacquin

分布：本(中部地方以西)，四，九，琉

産地：北見；佐和田町-河原田，両津市-梅津。金井町-新保運動公園 植栽。

くわ科

97 ヤマグワ ※

Morus australis Poir.

分布：北，本，四，九

産地：北見；両津市-羽吉。野田；両津市-加茂。

98 カジノキ

Broussonetia papyrifera (L.) Vent.

分布：中国中南部，インドシナ，マレーシア

産地：北見；小木町-宿根木。植栽

99 コウゾ

Broussonetia kajinoki × *B. papyrifera*

産地：北見；相川町-入川，両津市-鷺崎・水津，佐和田町-山田。秋庭；佐和田町-山田。

100 イタビカズラ ※

Ficus nipponica Franch. et Savat.

分布：本(福島県，新潟県以西)，四，九

産地：北見；両津市-水津・大川，小木町-宿根木，相川町-入川。野田；小木町，赤泊村，両津市-岩首・鷺崎。秋葉；相川町-小川。

101 イチジク ※

Ficus carica L.

分布：西アジア原産，宝永年間に渡来

産地：古くから各家で植栽

102 クワクサ ※

Fatoua villosa (Thunb.) Nakai

分布：本，四，九，琉

産地：北見；羽茂町-小泊。

103 カナムグラ ※

Humulus japonicus Sieb. et Zucc.

分布：北，本，四，九，奄美大島

産地：北見；羽茂町-小泊。野田；相川町，両津市-鷺崎，外海府，内海府。

104 カラハナソウ ※

Humulus lupulus L.

var. *cordifolius* (Miq.) Maxim.

分布：北，本(中部以北)

産地：北見；羽茂町-小泊，相川町-関，両津市-鷺崎・

白瀬・下久知。野田；畑野町－畑野・松ヶ崎。

いらくさ科

105 イラクサ

Urtica thunbergiana Sieb. et Zucc.

分布：本，四，九

産地：北見；ドンデン

106 エゾイラクサ

Urtica platyphylla Wedd.

分布：北，本（中部以北），千島，樺太，シベリア東部

産地：北見；ドンデン

107 ムカゴイラクサ ※

Laportea bulbifera (Sieb. et Zucc.) Wedd.

分布：北，本，四，九

産地：北見；羽茂町－小泊・飯岡，相川町－北片辺・関，両津市－水津。野田；金北山，相川町－石花，赤泊村。池上・石澤；分布図(3)no. 166－両津市－羽吉・久知川・野城・杉池，相川町－五十浦・達者・後尾・大倉，小木町－深浦。

108 ミヤマイラクサ ※

Laportea macrostachya (Maxim.) Ohwi

分布：北，本，九

産地：北見；相川町－石花（真保一輔）。野田；両津市－岩首，畑野町－松ヶ崎，相川町－石花。

109 ヤマミズ ※

Pilea japonica (Maxim.) Hand. -Mazz.

分布：本（宮城県以南），四，九

産地：北見；ドンデン

110 アオミズ ※

Pilea mongolica Wedd.

分布：北，本，四，九

産地：北見；ドンデン。野田；畑野町－松ヶ崎，両津市－鷺崎。

111 ミズ ※

Pilea hamaoi Makino

分布：北，本，四，九

産地：北見；両津市－鷺崎。野田；両津市－内海府・馬首，畑野町－松ヶ崎，相川町－金北山登山小川口。

112 ウワバミソウ ※

Elatostema umbellatum Blume var. *majus* Maxim.

分布：北，本，四，九

産地：北見；羽茂町－小泊，相川町－入川，両津市－大川・梅津。野田；佐和田町－二宮，相川町－入川，羽茂町，真野町，金北山。秋庭；佐和田町－真光寺二の川。

113 カラムシ ※

Boehmeria nipononivea Koidz.

分布：本，四，九，琉

産地：北見；羽茂町－小泊。野田；真野町。

ノート：栽培品の野生化

114 アカソ ※

Boehmeria tricuspis (Hance) Makino

分布：北，本，四，九

産地：北見；羽茂町－小泊，相川町－関。野田；金北山。秋庭；佐和田町－真光寺山。

115 コアカソ

Boehmeria spicata (Thunb.) Thunb.

分布：本，四，九

産地：野田；真野町

116 ナガバヤブマオ ※

Boehmeria sieboldiana Blume

分布：本（山形県，宮城県以南），四，九

産地：北見；相川町－山の神・南片辺。野田；赤泊村，相川町，両津市－水津。

117 メヤブマオ ※

Boehmeria platanifolia Franch. et Savat.

分布：北，本，四，九

産地：北見；羽茂町－村山。野田；両津市－岩首。

118 ヤブマオ ※

Boehmeria longispica Steud.

分布：北，本，四，九

産地：北見；相川町－山の神。野田；両津市－岩首，赤泊村，相川町。

119 オニヤブマオ

Boehmeria holosericea Blume

分布：本，四，九

産地：北見；羽茂町－小泊，相川町－入川，両津市－梅津。

びゃくだん科

120 ツクバネ

Buckleya lanceolata (Sieb. et Zucc.) Miq.

分布：本（関東以西），四，九 暖帯

産地：北見；金井町－大和田。野田；金井町。

121 カナビキソウ ※

Thesium chinense Turcz.

分布：北（南部），本，四，九，琉

産地：北見；羽茂町－大草・小泊，畑野町－後山，両津市－梅津。野田；金北山，真野町－西三川。秋庭；佐和田町－真光寺山。

やどりぎ科

122 ヤドリギ ※

Viscum album L. subsp. *coloratum* Komarov

分布：北，本，四，九

産地：北見；相川町－矢柄，両津市－馬首・和木・椿・両尾。

たで科

123 ヒメスイバ ※

Rumex acetosella L.

分布：北，本，四，九

産地：北見；羽茂町－村山・小泊，相川町－山の神・姫

- 津, 畑野町。野田; 金井町-中興。
 ノート: 帰化植物; ユーラシア原産
- 124 スイバ ※
Rumex acetosa L.
 分布: 北, 本, 四, 九
 産地: 北見; 羽茂町-小泊。野田; 金北山, 金井町, 新穂村, 相川町-石花。秋庭; 佐和田町-真光寺山。
- 125 ノダイオウ ※
Rumex longifolius DC.
 分布: 北, 本(中部以北, 和歌山県)
 産地: 北見; 羽茂町-小泊, 相川町-山の神, 両津市-春日町・大川。野田; 佐渡。
- 126 アレチギシギシ ※
Rumex conglomeratus Murr.
 分布: 本(関東地方)
 産地: 北見; 佐和田町-河原田海岸, 野田; 佐和田町-河原田。
 ノート: 帰化植物; ユーラシア原産
- 127 ギシギシ ※
Rumex japonicus Houtt.
 分布: 北, 本, 四, 九
 産地: 北見; 佐和田町。野田; 国府川, 金井町, 真野町, 佐和田町-二宮。
- 128 マダイオウ ※
Rumex madaio Makino
 分布: 本, 四, 九 日本特産
 産地: 北見; 畑野町(真保-輔)。野田; 畑野町。
- 129 エゾノギシギシ(ヒロハギシギシ) ※
Rumex obtusifolius L.
 分布: 北, 本, 四, 九
 産地: 島内各地
 ノート: 帰化植物; ヨーロッパ原産
- 130 ミチヤナギ(ニワヤナギ) ※
Polygonum aviculare L.
 分布: 北, 本, 四, 九, 琉
 産地: 北見; 小木町-白木, 相川町-達者, 金井町-中興。野田; 佐和田町-河原田。
- 131 アキノミチヤナギ(ハマミチヤナギ) ※
Polygonum polyneuron Franch. et Savat.
 分布: 北, 本, 四, 九
 産地: 北見; 羽茂町-亀ノ脇, 小木町-井坪・木流。野田; 赤泊村, 小木町-蓮華峯。
- 132 ミズヒキ ※
Andenoron filiforme (Thunb.) Roberty et Vautier
 分布: 北, 本, 四, 九, 琉
 産地: 北見; 羽茂町-亀ノ脇。野田; 金北山, 両津市-内海府。
- 133 ママコノシリヌグイ(トゲソバ) ※
Persicaria senticosa (Franch. et Savat.) H. Gross
 分布: 北, 本, 四, 九, 琉
 産地: 北見; 相川町-鹿野浦。野田; 金井町, 相川町-片辺・入川, 両津市-内海府・弾崎。池上・石澤; 分布図(2)no. 68-両津市-願・大野亀, 相川町-達者・橋, 小木町-城山。
- 134 ミゾソバ ※
Persicaria thunbergii (Sieb. et Zucc.) H. Gross
 分布: 北, 本, 四, 九
 産地: 北見; 羽茂町-小泊, 両津市-白山。野田; 両津市-河崎・内海府, 金井町, 真野町, 畑野町, 佐和田町-乙和池。
 ノート: *ヒカゲミゾソバ var. *coreana* Nakai 乙和池浮島*ヤマミゾソバ var. *oreophilum* Makino ドンデン
- 135 アキノウナギツカミ ※
Persicaria sieboldi (Meisn.) Ohki
 分布: 北, 本, 四, 九
 産地: 北見; 真野町-田切須, 羽茂町-小泊, 両津市-梅津・秋津。
- 136 ウナギツカミ
Persicaria aestiva Ohki
 分布: 北, 本, 四, 九
 産地: 北見; 両津市-下久知。野田; 経塚山, 畑野町-松ヶ崎, 佐和田町-二宮, 相川町-相川・入川・小田, 両津市-河崎・内海府。
- 137 ヤノネグサ ※
Persicaria nipponensis (Makino) H. Gross
 分布: 北, 本, 四, 九
 産地: 野田; 金井町-中興
- 138 タニソバ ※
Persicaria nepalensis (Meisn.) H. Gross
 分布: 北, 本, 四, 九
 産地: 北見; ドンデン, 佐和田町-乙和池。野田; 相川町-金北山登山小川口・大倉越え。
- 139 オオケタデ ※
Persicaria pilosa (Roxb.) Kitagawa
 分布: 中国, 朝鮮, インド, ヒマラヤ, チベット
 オオベニタデ *Persicaria orientalis* (L.) Assenov.
 分布: 東南アジア原産 栽培
- 140 サクラタデ ※
Persicaria conspicua (Nakai) Nakai
 分布: 本, 四, 九, 琉
 産地: 北見; 羽茂町-小泊, 相川町-入川, 両津市-梅津。
- 141 シロバナサクラタデ ※
Persicaria japonica (Meisn.) H. Gross
 分布: 北, 本, 四, 九, 琉
 産地: 北見; 相川町-入川, 両津市-鷺崎。野田; 赤泊村, 佐和田町-山田, 相川町-入川, 両津市-加茂・外海府。池上・石澤; 分布図(3)no. 168 両津市-長江, 相川-山の神・後尾, 畑野町-松ヶ崎。

- 142 ネバリタデ ※
Persicaria viscofera (Makino) H. Gross
 分布：北, 本, 四, 九
 産地：北見；金井町（真保一輔）。野田；金井町, 小木町
 - 蓮華峯。
- 143 オオネバリタデ ※
Persicaria makinoi (Nakai) Nakai
 分布：北, 本, 四, 九
 産地：北見；羽茂町-小泊。
- 144 ハナタデ ※
Persicaria yokusaiana (Makino) Nakai
 分布：北, 本, 四, 九, 琉
 産地：北見；ドンデン, 羽茂町-小泊。野田；金井町, 相
 川町-金北山小川口, 畑野町-経塚山・松ヶ崎, 両
 津市-内海府。
- 145 イヌタデ ※
Persicaria longiseta (De Bruyn) Kitagawa
 分布：北, 本, 四, 九, 琉
 産地：北見；羽茂町-小泊。秋庭；相川町-二見橋海岸。
 池上・石澤；分布図(3) no. 169-両津市-願・水
 津, 相川町-後尾・橋・相川町広間, その他佐渡
 全域。
- 146 ヌカボタデ
Persicaria taquetii (Lev.) Koidz.
 分布：本, 四, 九
 産地：野田；畑野町-松ヶ崎。
- 147 ヤナギタデ (マタデ) ※
Persicaria hydropiper (L.) Spach
 分布：北, 本, 四, 九, 琉
 産地：北見；真野町-西三川。野田；金井町。
- 148 カワタデ
Persicaria hydropiper forma *aquatica* Nemoto
 産地：北見；ドンデン。
- 149 ボントクタデ ※
Persicaria pubescens (Brume) Hara
 分布：本, 四, 九, 琉 南方系
 産地：北見；両津市-白山。
- 150 サナエタデ
Persicaria scabra (Moench) Mold.
 分布：北, 本, 四, 九
 産地：野田；金井町
- 151 オオイヌタデ ※
Persicaria lapathifolia (L.) S. F. Gray
 分布：北, 本, 四, 九
 産地：北見；真野町-西三川, 両津市-梅津。野田；経
 塚山, 相川町-入川。
- 152 イタドリ ※
Reynoutria japonica Houtt.
 分布：北, 本, 四, 九, 奄美諸島
 産地：北見；佐和田町。野田；小木町-蓮華峯。秋庭；
 佐和田町-乙和池道。

- 153 ケイタドリ ※
Reynoutria japonica var. *uzensis* Honda
 分布：本（東北地方, 日本海側）
 産地：北見；金北山, 羽茂町-小泊。池上・石澤；分布
 図(2) no. 69-相川町-橋・南沢, 佐和田町-河
 原田, 新穂村-上新穂, 畑野町-経塚山・小倉, 小
 木町-深浦。
- 154 オオイタドリ ※
Reynoutria sachalinensis (Fr. Schm.) Nakai
 分布：北, 本(中部以北)
 産地：北見；相川町-戸中・鹿野浦, 両津市-北鶴島・梅
 津, 羽茂町-小泊。小木町-宿根木。野田；金北
 山, 秋庭；佐和田町-真光寺山。池上・石澤；分
 布図(2) no. 70-両津市-梅津・北小浦・願, 相川
 町-小川・達者・相川・岩谷口, 妙見山。
- 155 ツルドクダミ ※
Pleuropterus multiflorus (Thunb.) Turcz.
 分布：中国原産 江戸時代に渡来 帰化植物
 漢名-首鳥
 産地：北見；相川町-北狄・小川・大倉, 赤泊村-外山。
 野田；相川町-春日崎。
- 156 ソバカズラ
Fallopia convolvulus (L.) A. Love
 分布：北, 本, 四, 九 帰化植物 ヨーロッパ原産
 産地：北見；相川町-入川・石花。野田；相川町-入川。
- 157 オオツルイタドリ ※
Fallopia dentato-alata (Fr. Schm.) Holub
 分布：北, 本,
 産地：野田；畑野町-松ヶ崎, 両津市-河崎, 相川町-
 石花。
- やまごほう科
- 158 ヤマゴボウ ※
Phytolacca esculenta Van Houtte
 分布：北, 本, 四, 九 中国原産の植物ではないかと言
 われる
 産地：北見；相川町-蔵倉・北狄・入川・石花, 両津市
 -大川・片野尾。野田；相川町-石花。
- 159 マルミノヤマゴボウ
Phytolacca japonica Makino
 分布：本(関東以西) 四, 九
 産地：北見；相川町-石名, 佐和田町(真保一輔)。野
 田；佐和田町-二宮。秋庭；相川町-入川上流。
- 160 ヨウシュヤマゴボウ ※
Phytolacca americana L.
 分布：北アメリカ原産 帰化植物
 産地：北見；相川町-蔵倉。
- ざくろそう科
- 161 ザクロソウ
Mollugo pentaphylla L.

- 分布：本，四，九，琉
産地：北見；金井町－中興。野田；両津市－加茂。
- 162 クルマバザクロソウ
Mollugo verticillata L.
分布：熱帯アメリカ原産 帰化植物，江戸時代末期に渡来
産地：野田；相川町－二見。
- つるな科
- 163 ツルナ ※
Tetragonia tetragonoides (Pall.) O. Kuntze
分布：北，本，四，九，琉
産地：北見；小木町－江積，相川町－高瀬。
- すべりひゆ科
- 164 スベリヒユ ※
Portulaca oleracea L.
分布：北，本，四，九，琉
産地：北見；羽茂町－小泊，相川町－山の神。野田；佐和田町－二宮。
- なでしこ科
- 165 ハマハコベ ※
Honkenya peptoides (L.) Ehrh. var. *major* Hook.
分布：北，本(日本海側)
産地：北見；相川町－戸地・北河内・北田野浦，両津市－藻浦。
- 166 ノミノツヅリ ※
Arenaria serpyllifolia L.
分布：北，本，四，九，琉
産地：北見；佐和田町－八幡，真野町－西三川，小木町－宿根木。野田；真野町－西三川。
- 167 サワハコベ ※
Stellaria diversiflora Maxim.
分布：本，四，九
産地：北見；両津市－羽黒。
オオサワハコベ from *robusta* Mizushima を含む。
- 168 ツルハコベ
Stellaria diversiflora var. *diandra* Maxim.
産地：羽茂町－小泊(真保一輔)。
- 169 ミヤマハコベ ※
Stellaria sessiliflora Yabe
分布：北，本，四，九
産地：北見；ドンデン
- 170 ハコベ(コハコベ) ※
Stellaria media (L.) Villars
分布：北，本，四，九，琉
産地：北見；佐和田町－河原田
- 171 ミドリハコベ ※
Stellaria neglecta Weihe
産地：北見；両津市－梅津。
- 172 ヤマハコベ
Stellaria uchiyamana Makino
分布：本(近畿以西)，四，九 暖帯
産地：北見；両津市－羽黒。
- 173 ノミノフスマ ※
Stellaria alsine Grimm var. *undulata* (Thunb.) Ohwi
分布：北，本，四，九，琉
産地：北見；羽茂町－小泊。野田；金井町，新穂。
- 174 ウシハコベ ※
Myosoton aquaticum (L.) Moench
分布：北，本，四，九，琉
産地：北見；両津市－願・梅津。野田；相川町－入川・片辺，赤泊村－下川茂。秋庭；相川町－入川上流。
- 175 オランダミミナグサ ※
Cerastium glomeratum Thuill.
分布：本，四，九，琉，小笠原 帰化植物 ヨーロッパ原産
産地：北見；両津市－梅津，野田；佐渡。
- 176 ミミナグサ ※
Cerastium holosteoides Fries
var. *hallaisanense* (Nakai) Mizushima
分布：北，本，四，九，琉
産地：北見；両津市－願。野田；真野町－西三川，新穂，相川町－入川，両津市－梅津。秋庭；相川町－入川上流。
- 177 ツメクサ ※
Sagina japonica (Sw.) Ohwi
分布：北，本，四，九，琉
産地：北見；相川町－入川。野田；金北山，真野町，相川町。秋庭；相川町－橘海岸。
- 178 ハマツメクサ ※
Sagina maxima A. Gray
分布：北(西南部)，本，四，九，琉，小笠原
産地：北見；相川町－達者。野田；相川町－戸中，両津市－弾崎。
- 179 カワラナデシコ ※
Dianthus superbus L.
var. *longicalycinus* (Maxim.) Williams
分布：本，四，九
産地：北見；羽茂町－小泊。野田；相川町－相川・達者，佐和田町－河原田，金井町。秋庭；相川町－片辺。
- 180 シロバナカワラナデシコ
Dianthus superbus
var. *longicalycinus* forma *albiflorus* Honda
産地：北見；羽茂町－小泊。
- 181 ナンバンハコベ(ツルセンノウ) ※
Cucubalus baccifer L. var. *japonicus* Miq.
分布：北，本，四，九
産地：北見；相川町－大ザレ・高瀬，小木町－木流，両津市－水津。野田；赤泊村，畑野町－松ヶ崎，両

津市-水津。
182 ムシトリナデシコ ※
Silene armeria L.
分布：北, 本, 四, 九 帰化植物 ヨーロッパ原産
産地：北見；相川町-達者。秋庭；佐和田町-河原田海岸。

183 マンテマ ※
Silene gallica L.
var. *quinquevulnera* (L.) Rohrb.
分布：本, 四, 九 帰化植物 ヨーロッパ原産
産地：北見；羽茂町-小泊, 相川町-姫津・戸中, 佐和田町-窪田, 畑野町。秋庭；佐和田町-河原田海岸。

184 シロバナマンテマ
Silene gallica L.
産地：北見；新穂村-大野。

185 フシグロ ※
Silene firma Sieb. et Zucc.
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；ドンデン, 羽茂町-酒川。野田；赤泊村, 畑野町, 佐和田町-二宮。

186 ケフシグロ
Silene firma
forma *pubescens* (Makino) Ohwi et Ohashi
産地：北見；相川町-矢柄。

あかざ科

187 マルバアカザ
Chenopodium acuminatum Willd.
分布：本, 四, 九, 琉
産地：北見；相川町-入川。

188 シロザ ※
Chenopodium album L.
分布：北, 本, 四, 九, 琉
産地：北見；羽茂町-小泊, 相川町-岩谷口

189 アカザ
Chenopodium centrорubrum (Makino) Nakai
分布：北, 本, 四, 九, 琉
産地：野田；佐和田町-河原田。

190 アリタソウ
Ambrina ambrosioides (L.) Spach
分布：本, 四, 九 帰化植物 メキシコ原産
産地：金井町-新保川堤防。

191 ハマアカザ ※
Atriplex subcordata Kitag.
分布：北, 本
産地：北見；相川町-入川, 小木町-田野浦。野田；小木町-蓮華峯, 畑野町-松ヶ崎, 真野町, 相川町-入川。秋庭；佐和田町-河原田。

192 ホソバハマアカザ
Atriplex gmelinii C. A. Meyer

分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；相川町-入川。

193 オカヒジキ ※
Salsola komarovii Iljin
分布：北, 本, 四, 九, 琉
産地：北見；相川町-入川・千本, 羽茂町-素浜, 小木町-江積, 真野町-新町。野田；佐和田町-河原田, 両津市-弾崎。秋庭；佐和田町-河原田。

ひゆ科

194 アオビユ (ホナガイヌビユ) ※
Amaranthus viridis L.
分布：亜熱帯~熱帯, 帰化植物, 熱帯アメリカ原産
産地：北見；羽茂町-小泊, 両津市-大川・片野尾・夷。

195 イヌビユ ※
Amaranthus lividus L.
var. *ascendens* (Loes.) Thell.
分布：ヨーロッパ, アジア各地, 帰化植物, 地中海沿岸地方原産
産地：北見；羽茂町-小泊。野田；佐和田町-河原田。

196 ヤナギイノコズチ
Achyrunthes longifolia (Makino) Makino
分布：本 (関東地方以西), 四, 九 暖帯
産地：野田；佐和田町-二宮, 両津市-河崎。

197 イノコズチ (ヒカゲイノコズチ) ※
Achyrunthes bidentata Brume var. *japonica* Miq.
分布：本, 四, 九
産地：北見；ドンデン

198 ヒナタイノコズチ ※
Achyrunthes bidentata
var. *tomentosa* (Honda) Hara
分布：本, 四, 九
産地：北見；羽茂町-飯岡。

もくれん科

199 ホオノキ ※
Magnolia obovata Thunb.
分布：北, 本, 四, 九 温~暖帯上部
産地：北見；相川町-入川・北狄, 羽茂町-小泊。野田；金北山, 両津市-馬首。秋庭；佐和田町-乙和池下。

200 モクレン (シモクレン)
Magnolia quinquepeta (Buchoz.) Dandy
分布：中国湖北省
産地：北見；羽茂町-小泊。植栽

201 コブシ
Magnolia praecocissima Koidz.
分布：北, 本, 四, 九 温~暖帯上部
産地：北見；ドンデン, 羽茂町-小泊, 両津市-野浦, 金井町-平山。

202 キタコブシ ※

*Magnolia praecocissima*var. *borealis* (Sargent.) Koidz.

分布：北, 本(中北部), 日本海側

産地：北見；両津市－梅津。野田；両津市－梅津。池上・石澤；分布図(1) no. 12－両津市－吉井, 金井町－平山・大和田山口, 畑野町－経塚山, 小木町－強清水。

203 タムシバ ※

Magnolia salicifolia (Sieb. et Zucc.) Maxim.

分布：本, 四, 九 温～暖帯上部

産地：北見；ドンデン。野田；金北山, 佐和田町－乙和池, 相川町－石花。秋庭；妙見山腹。池上・石澤；分布図(2) no. 71－大塚山, 妙見山, 佐和田町－乙和池, 新穂村－清水寺越え, 畑野町－小倉峠, 松ヶ崎。

まつぶさ科

204 サネカズラ (ビナンカズラ) ※

Kadsura japonica (Thunb.) Dunal

分布：本(関東地方以西), 四, 九, 琉

産地：北見；相川町－寒戸・石花, 羽茂町－小泊, 小木町－井坪, 両津市－水津。

205 マツブサ ※

Schisandra nigra Maxim.

分布：北, 本, 四, 九 温～暖帯

産地：北見；両津市－水津。野田；金北山, 真野町－西三川, 畑野町－飯出山。秋庭；相川町－片辺越え。池上・石澤；分布図(3) no. 171－両津市－藻浦・野城・久知河内・杉池, 相川町－寒戸, 金井町－千種, 新穂村－清水寺, 畑野町－経塚山, 小木町－小比叡。

しきみ科

206 シキミ ※

Illicium anisatum L.

分布：本(宮城県以南), 四, 九, 琉 暖帯

産地：北見；羽茂町－村山, 両津市－鷲崎・願。野田；畑野町－多田～両津市－河崎。

くすのき科

207 クスノキ ※

Cinnamomum camphora (L.) Presl

分布：本, 四, 九 暖帯

産地：北見；羽茂町－小泊, 佐和田町－窪田。

ノート：各地の神社で植栽

208 ヤブニッケイ

Cinnamomum japonicum Sieb. ex Nakai

分布：本(関東, 北陸以西), 四, 九, 琉

産地：金井町－新保八幡宮。植栽

209 タブノキ (イヌグス) ※

Machilus thunbergii Sieb. et Zucc.

分布：本, 四, 九, 琉

産地：北見；羽茂町－酒川・小泊, 両津市－鷲崎・北小泊, 相川町－山の神。野田；佐和田町－河原田。池上・石澤；分布図(3) no. 172－両津市－豊岡・鷲崎, 相川町－相川・二見・後尾, 佐和田町－真光寺, 真野町－竹田・国分寺・大須, 羽茂町－村山, 小木町－強清水・犬神平・金田新田。

210 クロモジ

Lindera umbellata Thunb.

分布：本(関東, 中部地方以西) 暖帯

産地：北見；羽茂町－小泊, 佐和田町－二宮, 両津市－匏。

211 オオバクロモジ ※

*Lindera umbellata*var. *membranacea* (Maxim.) Momiyama

分布：北(渡島), 本(東北, 日本海側)

産地：北見；羽茂町－村山, 佐和田町－乙和池, ドンデン。野田；畑野町。秋庭；妙見山山腹。

212 ゲッケイジュ

Laurus nobilis L.

分布：地中海沿岸地方原産, 明治年間に移入, 植栽

産地：羽茂町－村山。

213 シロダモ ※

Neolitsea sericea (Bl.) Koidz.

分布：本, 四, 九, 琉 暖帯

産地：北見；相川町－椎木澤, 両津市－和木, 羽茂町－小泊・村山。野田；赤泊村－大杉・徳和, 小木町, 佐和田町－二宮。

かつら科

214 カツラ ※

Cercidiphyllum japonicum Sieb. et Zucc.

分布：北, 本, 四, 九 温帯

産地：北見；両津市－梅津・白瀬, 相川町－南片辺・船山・入川・千本。野田；相川町－入川・大倉越え。

きんぼうげ科

215 リュウキンカ

Caltha palustris L. var. *nipponica* Hara

分布：本, 九

産地：北見；両津市－加茂歌代。

216 エンコウソウ

Caltha palustris var. *enkoso* Hara

分布：北, 本

産地：北見；羽茂町－小泊, 両津市－加茂歌代。野田；赤泊村－下川茂。

217 サラシナショウマ ※

Cimicifuga simplex Wormsk.

分布：北, 本, 四, 九 温～亜寒帯

- 産地：北見；金北山，両津市－羽黒・大川・水津。野田；
金北山，金井町，相川町－大倉越え。
- 218 ルイヨウショウマ
Actaea asiatica Hara
分布：北，本，四，九 温～亜寒帯
産地：北見；ドンデン。野田；金北山
- 219 サドブシ
Aconitum yezoense Nakai var. *majimai* Nakai
分布：佐渡
産地：北見；金北山，両津市－鷺崎・下久知。
- 220 オクトリカブト
Aconitum japonicum Thunb.
分布：北(西南部)，本(中部以北)
産地：野田；佐渡
- 221 ヤマトリカブト ※
Aconitum japonicum var. *montanum* Nakai
分布：本(中部地方～東北地方)
産地：北見；金北山，ドンデン。野田；金北山，両津市
－馬首・大倉越え・天狗塚山・鷺崎・河崎，赤泊
村，佐和田町－二宮。
- 222 シュウメイギク(キブネギク)
Anemone hupehensis Lemoine
var. *japonica* (Thunb.) Bowles et Stearn
分布：本，四，九(帰化植物，中国原産 植栽)
産地：北見；金井町－千種，両津市－椿，小木町－宿根
木。
- 223 ニリンソウ ※
Anemona flaccida Fr. Schm.
分布：北，本，四，九
産地：北見；羽茂町－小泊。野田；赤泊村－下川茂，相
川町－入川，金北山。秋庭；相川町－片辺越え。
- 224 イチリンソウ
Anemone nikoensis Maxim.
分布：本，四，九
産地：北見；羽茂町－小泊。
- 225 キクザキイチゲ ※
Anemone pseudo-altaica Hara
分布：北，本(近畿地方以北) 温帯
産地：北見；相川町－入川・関。野田；金北山，両津市
－梅津。秋庭；佐和田町－真光寺山。
- 226 アズマイチゲ ※
Anemone raddeana Regel
分布：北，本，四，九 温帯
産地：野田；アオネバ越え。池上・石澤；分布図(3) no.
173－両津市－玉崎・藻浦・アオネバ越え，相川町
－大倉・岩谷口・寒戸・入川，畑野町－経塚山。
- 227 ヒメイチゲ ※
Anemone debilis Fisch.
分布：北，本(近畿地方以北) 温帯北部
産地：北見；金北山，相川町－矢柄・長坂の上。野田；金
北山。秋庭；妙見山腹。
- 228 ミスミソウ ※
Hepatica nobilis Schreber var. *japonica* Nakai
分布：本(中部地方以北)，九(北部)
産地：北見；相川町－大ザレ，両津市－馬首，畑野町－
猿八。野田；金北山，経塚山。秋庭；佐和田町－
真光寺山。
- 229 スハマソウ ※
Hepatica nobilis
var. *japonica* forma *variegata* (Makino) Kitam.
分布：本，四
産地：相川町－大ザレ，両津市－馬首，畑野町－猿八。
野田；経塚山。
- 230 オキナグサ ※
Pulsatilla cernua (Thunb.) Sprenger
分布：本，四，九 温～暖帯
産地：北見；畑野町－女神山。野田；佐渡。
- 231 ハンショウヅル
Clematis japonica Thunb.
分布：本，九 温帯
産地：北見；羽茂町－素浜。
- 232 アズマハンショウヅル
Clematis japonica var. *brevipedicellata* Makino
産地：野田；金北山，中岳，大塚山，佐和田町－二宮，畑
野町－多田。
- 233 トリガタハンショウヅル ※
Clematis tosaensis Makino
分布：本，四 温～暖帯
産地：北見；相川町－南片辺船山，両津市－馬首・北五
十里。秋庭；片辺越え。
- 234 シロバナハンショウヅル
Clematis williamsii A. Gray
分布：本(関東地方南部～近畿地方南部)
産地：北見；両津市－馬首，金井町－新保。
- 235 クサボタン ※
Clematis stans Sieb. et Zucc.
分布：北，本，四，九 温帯
産地：北見；小木町－澤，両津市－梅津。野田；金北山，
佐和田町－二宮。秋庭；妙見山刀根。
- 236 タチクサボタン
Clematis urticifolia Nakai
分布：佐渡
産地：北見；ドンデン。野田；佐渡。
- 237 カザグルマ
Clematis patens Morr. et Decne.
分布：本，四，九(北部)
産地：北見；赤泊村－下川茂(真保一輔)。野田；赤泊村
－下川茂。
- 238 ボタンヅル ※
Clematis apiifolia DC.
分布：本，四，九 温～暖帯
産地：北見；羽茂町－小泊。野田；金井町，蛇。秋庭；相

- 川町-北狄。
- 239 センニンソウ ※
Clematis terniflora DC.
分布：北(南部), 本, 四, 九, 琉, 小笠原
産地：北見；羽茂町-小泊。秋庭；相川町-片辺。
- 240 フクジュソウ ※
Adonis amurensis Regel et Radde
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；相川町-入川。野田；両津市-梅津, 相川町-高千・達者。
- 241 タガラシ ※
Ranunculus sceleratus L.
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；相川町-石花・北田野浦, 佐和田町-窪田, 羽茂町-羽茂町本郷。野田；赤泊村-大杉, 金井町-中興。
- 242 ウマノアシガタ (キンボウゲ) ※
Ranunculus japonicus Thunb.
分布：北(西南部), 本, 四, 九, 琉 温帯
産地：北見；羽茂町-小泊。野田；金北山, 佐和田町-二宮, 両津市-梅津。秋庭；佐和田町-真光寺山 (ミヤマウマノアシガタ)。
- 243 ミヤマキンボウゲ ※
Ranunculus acris L. var. *nipponicus* Hara
分布：北, 本(中北部) 高山帯
産地：北見；妙見山 (真保一輔)。秋庭；佐和田町-真光寺。
- 244 キツネノボタン ※
Ranunculus silerifolius Lev.
分布：北, 本, 四, 九, 琉
産地：北見；金井町-中興。野田；金井町。
- 245 ヤマキツネノボタン
Ranunculus ternatus Thunb.
var. *quelpaertensis* (Lev.) Ohwi
産地：北見；相川町-入川 (真保一輔)。
- 246 ケキツネノボタン ※
Ranunculus cantoniensis DC.
分布：本, 四, 九, 琉 暖~亜熱帯
産地：北見；両津市-梅津。
- 247 ヒメウス ※
Semiaquilegia adoxoides (DC.) Makino
分布：本(関東地方以西), 四, 九 暖帯, 佐渡；分布の北限
産地：北見；相川町-大倉・矢柄, 両津市-藻浦, 羽茂町-小泊。野田；真野町-西三川。池上・石澤；分布図 (3) no. 174-両津市-藻浦・大平山・見立, 相川町-達者, 真野町-金山・小川内川, 小木町。
- 248 ミヤマオダマキ
Aquilegia flabellata Sieb. et Zucc.
var. *pumila* Kudo
分布：北, 本(中北部) 高山
- 産地：北見；ドンデン, 相川町-石花。
ノート：*オダマキ var. *flabellata* 北見；相川町, 植栽
- 249 ヤマオダマキ ※
Aquilegia buergeriana Sieb. et Zucc.
分布：北, 本, 四, 九 低山
産地：金北山, ドンデン。秋庭；金北山金井口。
- 250 オオヤマオダマキ
Aquilegia buergeriana
var. *oxysepala* (Trautv. et Mey.) Kitam.
分布：北, 本, 四, 九 低山
産地：野田；金北山, 相川町-戸中, 両津市-梅津。
- 251 アキカラマツ ※
Thalictrum minus L.
var. *hypoleucum* (Sieb. et Zucc.) Miq.
分布：北, 本, 四, 九, 奄美諸島
産地：北見；羽茂町-亀脇。野田；相川町-戸中・大倉越え, 両津市-内海府・水津, 畑野町-多田・松ヶ崎, 赤泊村, 金井町。秋庭；西部真光寺山。
- 252 シキンカラマツ
Thalictrum rochebrunianum Franch. et Savat.
分布：本(長野県, 群馬県, 福島県)
産地：北見；相川町-山の神。野田；赤泊村, 相川町。
- 253 カラマツソウ ※
Thalictrum aquilegifolium L. var. *intermedium* Naki
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；両津市-願。野田；両津市-願。
- 254 マンセンカラマツ
Thalictrum aquilegifolium
var. *sibiricum* Regel et Titing
分布：本, 四, 九, 千島, 樺太, 中国東北部, シベリア
産地：両津市-願 大野亀草原。
- 255 ミヤマカラマツ ※
Thalictrum filamentosum Maxim.
var. *tenerum* (H. Boiss) Ohwi
分布：北, 本, 四, 九 山地帯上部~亜高山帯
産地：北見；ドンデン。野田；金北山, 相川町-石花。秋庭；金北山金井口。
- 256 オウレン (キクバオウレン) ※
Coptis japonica (Thunb.) Makino
分布：北(西南部), 本(日本海側) 温帯
産地：北見；相川町-屋敷平, 山の神, 羽茂町-小泊・飯岡, 両津市-梅津・真木・野浦。野田；金北山, 佐和田町-乙和池。秋庭；佐和田町-乙和池。
- めぎ科
- 257 ヒロハヘビノボラス ※
Berberis amurensis Rupr.
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；乙和池, 海岸地帯。野田；金北山, 佐和田町-二宮, 両津市-弾崎。秋庭；佐和田町-真光

寺山。

258 ナンテン

Nandina domestica Thunb.

分布：西南日本 暖帯

産地：植栽

259 サンカヨウ ※

Diphylleia grayi Fr. Schm.

分布：北, 本 温~亜寒帯

山地：北見；ドンデン, 金北山。野田；金北山, アオネバ越え。

260 ルイヨウボタン ※

Caulophyllum robustum Maxim.

分布：北, 本, 四, 九

産地：北見；ドンデン。野田；経塚山, 国見山, 金北山, アオネバ越え, 相川町-入川, 佐和田町-二宮。秋庭；相川町-片辺越え。

261 キバナイカリソウ

Epimedium koreanum Nakai

分布：北(渡島), 本(日本海側) 温帯

産地：野田；赤泊村-下川茂, 経塚山, 真野町。

262 トキワイカリソウ (オオイカリソウ) ※

Epimedium sempervirens Nakai

分布：本(中部以西) 日本海側 温帯~暖帯

産地：北見；羽茂町-小泊・村山・飯岡, 金井町-吉井本郷・安養寺。

あけび科

263 ムベ ※

Stauntonia hexaphylla (Thunb.) Decaisne

分布：本(関東地方以西), 四, 九, 琉

産地：北見；羽茂町-小泊, 新穂村-正明寺。野田；真野町-西三川, 羽茂町-小泊, 小木町-小比叡。

264 アケビ ※

Akebia quinata (Thunb.) Decaisne

分布：本, 四, 九 温~暖帯

産地：北見；羽茂町-小泊, 両津市-梅津。野田；両津市-加茂, 小木町-蓮華峯。秋庭；佐和田町-乙和池下。

265 ミツバアケビ ※

Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz.

分布：北, 本, 四, 九 温~暖帯

産地：北見；羽茂町-小泊, 両津市-梅津。野田；赤泊村, 畑野町-飯出山。秋庭；佐和田町-乙和池下。

ノート：*マルバミツバアケビ var. *clematifolia* Nakai 野田；金北山, 妙見山

266 ゴヨウアケビ ※

Akebia × pentaphylla Makino

分布：本, 四, 九

産地：島内各地

つづらふじ科

267 コウモリカズラ ※

Menispermum dauricum DC.

分布：北, 本, 四, 九

産地：北見；金井町(真保一輔)。野田；金井町。

268 アオツツラフジ (カミエビ) ※

Cocculus trilobus (Thunb.) DC.

分布：本, 四, 九, 琉

産地：北見；羽茂町-村山, 両津市-梅津。野田；小木町, 金井町, 相川町-入川。

すいれん科

269 ジュンサイ

Brasenia schreberi J. F. Gmel.

分布：北, 本, 四, 九, 琉

産地：北見；羽茂町-村山, 畑野町-猿八。野田；金井町-中興。

270 コウホネ

Huphar japonicum DC.

分布：北(西南部), 本, 四, 九

産地：北見；相川町-入川, 両津市-加茂歌代・吾瀧, 羽茂町-小泊。野田；新穂。

271 ヒツジグサ ※

Nymphaea tetragona Georgi

分布：北, 本, 四, 九

産地：北見；金井町-西方。

はす科

272 ハス ※

Nelumbo nucifera Gaertn.

分布：日本各地で栽培, 中国から渡来したと言われる。

まつも科

273 マツモ (キンギョモ) ※

Ceratophyllum demersum L.

分布：北, 本, 四, 九, 琉

産地：野田；加茂湖

どくだみ科

274 ハンゲショウ (カタシログサ) ※

Saururus chinensis (Lour.) Baill.

分布：本, 四, 九, 琉

産地：北見；相川町-入川, 両津市-梅津・鷺崎, 羽茂町。野田；金井町, 両津市-梅津・鷺崎, 相川町-入川。池上・石澤；分布図(2) no. 75-両津市-大野亀・薬浦, 相川町-矢柄。

275 ドクダミ ※

Houttuynia cordata Thunb.

分布：本, 四, 九, 琉

産地：北見；羽茂町-小泊。野田；両津市-加茂。秋庭；妙見山頂。池上・石澤；分布図(3) no. 175-全域。

せんりょう科

276 センリョウ

Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai

分布：本(関東地方南部, 東海地方, 紀伊半島以南), 四, 九, 琉

産地：北見；新穂村-瓜生屋。

277 フタリシズカ ※

Chloranthus serratus (Thunb.) Roem. et Schult.

分布：北, 本, 四, 九

産地：北見；相川町-入川, 野田；金北山, 妙見山, 相川町-片辺, 池上・石澤；分布図(2) no. 76-両津市-久知川・杉池・山居池, 新穂村-清水寺, 小木町-深浦。

278 ヒトリシズカ ※

Chloranthus japonicus Sieb.

分布：北, 本, 四, 九

産地：北見；ドンデン, 野田；金北山, 大塚山, 佐和田町-二宮, 真野町, 畑野町-多田, 両津市-両尾, 秋庭；佐和田町-真光寺山, 池上・石澤；分布図(1) no. 13-両津市-岩首・杉池・山居池, 相川町-北片辺・大塚山, 佐和田町-乙和池, 小木町-強清水, 真野町-経塚山・真野・竹田ダム, 新穂村-新穂ダム・生椿, 赤泊村-庭場。

うまのすずくさ科

279 ウマノスズクサ ※

Aristolochia debilis Sieb. et Zucc.

分布：本(関東以西), 四, 九

産地：北見；小木町-澤, 羽茂町-素浜。

280 マルバウマノスズクサ

Aristolochia contorta Bunge

分布：長野県, 山形県~島根県の日本海側

産地：北見；羽茂町-村山・小泊, 赤泊村-外山, 新穂村-田野澤, 両津市-梅津。

281 ウスバサイシン(サイシン) ※

Asiasarum sieboldii (Miq.) F. Maek.

分布：本, 四, 九(北部)

産地：北見；ドンデン, 両津市-大川・野浦, 羽茂町-小泊・飯岡, 野田；経塚山, 両津市-梅津, 相川町-高千, 秋庭；佐和田町-真光寺山。

282 コシノカンアオイ ※

Heterotropa megacalyx (F. Maek.) F. Maek.

分布：本(長野県北部, 山形県~福井県の日本海側)

産地：北見；相川町-北狄, 羽茂町-小泊・村山・飯岡, 両津市-梅津, 野田；経塚山, 赤泊村-下川茂, 金井町。

283 ミチノクサイシン

Heterotropa fauriei (Franch.) F. Maek.

分布：本(東北地方, 新潟県, 長野県)

産地：北見；両津市-長江・加茂歌代, 新穂村-田野沢, 植栽

ほとん科

284 ヤマシャクヤク ※

Paeonia japonica (Makino) Miyabe et Takeda

分布：本(関東中部地方以西), 四, 九

産地：北見；相川町-北狄・北片辺・入川, 両津市-梅津・野浦, 野田；経塚山, 金北山, 相川町-高千, 秋庭；相川町-片辺越え。

しらねあおい科

285 シラネアオイ ※

Glaucidium palmatum Sieb. et Zucc.

分布：北, 本(東北地方, 中部地方の日本海側)

産地：北見；ドンデン, 野田；金北山, 秋庭；佐和田町-真光寺山(白花品)。

またたび科

286 サルナシ ※

Actinidia arguta (Sieb. et Zucc) Planch. ex Maxim.

分布：北, 本, 四, 九

産地：北見；相川町-北狄

287 マタタビ ※

Actinidia polygama (Sieb. et Zucc.)

Planch. ex Maxim.

分布：北, 本, 四, 九

産地：北見；相川町-山の神・関, 羽茂町-飯岡, 野田；畑野町-多田, 両津市-梅津・大倉越え, 秋庭；佐和田町-乙和池道。

つばき科

288 ヤブツバキ ※

Camellia japonica L.

分布：本(青森県以南), 四, 九, 琉

産地：北見；相川町-関, 羽茂町-小泊, 野田；真野町-西三川。

289 ユキツバキ(オクツバキ, サルイワツバキ) ※

Camellia japonica var. *decumbens* Sugimoto

分布：東北~北陸地方の日本海側, 多雪地帯 海拔300~1200m

産地：北見；両津市-米山, 野田；佐渡。

ノート：ユキバタツバキ(ヤブツバキ×ユキツバキ) ※

290 サザンカ

Camellia sasanqua Thunb.

分布：本(山口県), 四(南部, 南西部)

産地：羽茂町-小泊。

291 チャノキ ※

Camellia sinensis (L.) O. Kuntze

分布：中国南西部, 台湾, ビルマ北部, ラオス 帰化植物
産地：北見；羽茂町-村山, 両津市瀨端でお茶の生産がある。

292 モッコク

Ternstroemia symnanthera (Wright et Arn.) Beddome

分布：本(関東地方以西の太平洋側), 四, 九
産地：北見；羽茂町-村山。植栽

293 サカキ ※

Cleyera japonica Thunb.

分布：本(茨城県, 石川県以西), 四, 九

産地：北見；金井町-中興, 羽茂町-小泊, 新穂村-大野。

ノート：各地の神社に植栽

294 ヒサカキ ※

Eurya japonica Thunb.

分布：本(岩手県, 秋田県以南), 四, 九

産地：北見；羽茂町-小泊, 両津市-長江。野田；金北山, 畑野町-多田, 両津市-蛸。秋庭；佐和田町-真光寺山。池上・石澤；分布図(1) no. 14-両津市-鷺崎・笠取峠・山居池・和木・北松ヶ崎・吉住・蛸・久知河内・水津, 相川町-大倉・入川・大塚山・戸地・相川, 金井町-新保・上野口, 佐和田町-真光寺, 新穂村-新穂ダム・瀧上・生椿道, 佐和田町-沢根元村, 真野町-竹田・静平・金山・梨の木・経塚山・大須, 畑野町-小倉峠, 赤泊村-外山・東光寺・赤泊, 小木町-強清水。

おとぎりそう科

295 ミズオトギリ ※

Triadenum japonicum Makino

分布：北, 本, 四, 九

産地：北見；佐和田町-乙和池, 羽茂町-村山。野田；佐和田町-乙和池。

296 トモエソウ ※

Hypericum ascyron L.

分布：北, 本, 四, 九

産地：北見；相川町-入川, 畑野町-栗之江。野田；金北山, 大塚山, 金井町, 佐和田町-二宮・澤根。

297 オトギリソウ ※

Hypericum erectum Thunb.

分布：北, 本, 四, 九, 琉

産地：北見；両津市-梅津。野田；金北山, 金井町, 赤泊村, 両津市-両津・梅津。秋庭；妙見山。

298 ミヤコオトギリ

Hypericum kinashianum Koidz.

分布：本(関東以西), 四, 九

産地：北見；羽茂町-飯岡。

299 イワオトギリ

Hypericum kinashianum var. *hondoense* Y. Kimura

分布：本(中北部の高山, 岩木山から日本海側の山地, 日光付近)

産地：北見；ドンデン

300 サワオトギリ ※

Hypericum pseudopetiolatum R. Keller

分布：北(西南部), 本, 四

産地：秋庭；妙見山山腹

301 アゼオトギリ

Hypericum oliganthum Franch. et Savat.

分布：本(関東以西), 四, 九

産地：北見；ドンデン。野田；金北山

302 ヒメオトギリ

Sarothra japonica (Thunb.) Y. Kimura

分布：本(千葉県, 東海地方以西), 四, 九

産地：北見；羽茂町-小泊。

303 コケオトギリ ※

Sarothra laxa (Blume) Y. Kimura

分布：北(西南部), 本, 四, 九, 琉

産地：北見；ドンデン。野田；金北山, 金井町, 佐和田町-河原田。秋庭；妙見山刀根禿山。

もうせんごけ科

304 モウセンゴケ ※

Drosera rotundifolia L.

分布：北, 本, 四, 九

産地：北見；ドンデン, 妙見山, 相川町-戸中・船山, 羽茂町-小泊, 両津市-長江。野田；両津市-椿, 佐和田町-乙和池浮島, 大塚山。秋庭；妙見山腹。

けし科

305 クサノオウ ※

Chelidonium majus L. var. *asiaticum* (Hara) Ohwi.

分布：北, 本, 四, 九

産地：北見；相川町-関, 羽茂町-小泊・龜脇, 両津市-梅津・大川・野浦。野田；金北山, 真野。池上・石澤；分布図(2) no. 78-両津市-豊岡, 金井町-中興, 新穂村-清水寺越え, 赤泊村-杉の浦。

306 タケニグサ(チャンパギク) ※

Macleaya cordata (Willd.) R. Br.

分布：本, 四, 九

産地：北見；相川町-石花・入川・矢柄, 両津市-梅津, 羽茂町-上山田。秋庭；相川町-石花。

307 エゾエンゴサク ※

Corydalis ambigua Cham. et Schltd.

分布：北, 本(北部)

産地：北見；相川町-入川, 羽茂町-小泊, 小木町-深浦, 両津市-梅津・真木。秋庭；妙見山麓。

308 ヤマエンゴサク

Corydalis lineariloba Sieb. et Zucc.

分布：本, 四, 九

産地：北見；金北山(真保一輔)。野田；金北山, 相川。

309 ムラサキケマン ※

Corydalis incisa (Thunb.) Pers.

分布：北, 本, 四, 九, 琉

産地：北見；羽茂町-小泊。野田；金北山, 佐和田町-二宮, 羽茂。秋庭；佐和田町-真光寺山。池上・石澤；分布図(3) no. 176-佐渡全域。

- 310 ミヤマキケマン ※
Corydalis pallida (Thunb.) Pers. var. *tenuis* Yatabe
 分布：本(近畿以東)
 産地：北見；相川町-入川，羽茂町-小泊。野田；金北山。秋庭；相川町-入川上流。
- 311 キケマン
Corydalis heterocarpa Sieb. et Zucc.
 var. *japonica* (Ranch. et Savat.) Ohwi
 分布：本(関東以西)，四，九，琉 暖帯
 産地：北見；羽茂町-亀脇
- 312 オサバグサ ※
Pteridophyllum racemosum Sieb. et Zucc.
 分布：本(中北部) 亜高山帯の針葉樹林内に稀
 産地：北見；相川町-南片辺・戸地，畑野町-経塚山。野田；金北山，大塚山，相川町-入川・片辺。秋庭；大塚山。
- あぶらな科
- 313 イヌナズナ
Draba nemorosa L.
 分布：北，本，四，九
 産地：北見；羽茂町-小泊・亀脇。
- 314 ナズナ ※
Capsella bursa-pastoris Medicus
 分布：北，本，四，九，琉
 産地：北見；ドンデン。野田；金北山。
- 315 マメグンバイナズナ ※
Lepidium virginicum L.
 分布：北，本，四，九，琉 帰化植物，北アメリカ原産
 産地：路傍の草地など
- 316 ヒメグンバイナズナ
Lepidium apetalum Willd.
 分布：ヨーロッパ~アジア原産，帰化植物
 産地：北見；羽茂町-羽茂本郷，両津市-夷。
- 317 グンバイナズナ
Thlaspi arvense L.
 分布：北，本，四，九，帰化植物，ヨーロッパ原産
 産地：路傍の草地など，稀
- 318 ハマダイコン ※
Raphanus sativa L. var. *raphanistroides* Makino
 分布：北，本，四，九，琉
 産地：北見；海岸一帯。野田；相川町-入川。秋庭；佐和田町-河原田海岸。
- 319 ジャニンジン ※
Cardamine impatiens L.
 分布：北，本，四，九
 産地：北見；新穂村-国見山，金井町-平山，ドンデン。野田；真野町-西三川，新穂村-国見山。池上・石澤；分布図(3) no. 177-両津市-水津，相川町-寒戸，金井町-新保川上流，真野町-西三川，赤泊村-徳和浜。
- 320 ホソバジャニンジン
Cardamine impatiens var. *tenuissima* Honda
 産地：北見；金井町-平山。
- 321 タネツケバナ ※
Cardamine flexuosa With.
 分布：北，本，四，九，琉
 産地：北見；ドンデン
- 322 タチタネツケバナ ※
Cardamine fallax Nakai
 分布：北，本，四，九
 産地：北見；羽茂町-小泊。
- 323 オオバタネツケバナ ※
Cardamine regeliana Miq.
 分布：北，本，四，九
 産地：北見；相川町-岩谷口，羽茂町-小泊。秋庭；佐和田町-真光寺山。
- 324 オオケタネツケバナ ※
Cardamine dentipetala Matsum.
 分布：本(北部，近畿以北の日本海側)
 産地：北見；相川町-岩谷口，羽茂町-小泊。
- 325 コンロンソウ ※
Cardamine leucantha (Tausch) O. E. Schulz
 分布：北，本，四，九，樺太，アムール，ウスリー
 産地：北見；ドンデン。野田；真野，相川町-入川。秋庭；佐和田町-乙和池下。
- 326 ワサビ ※
Wasabia japonica (Miq.) Matsum.
 分布：北，本，四，九
 産地：北見；羽茂町-村山。
- 327 ユリワサビ ※
Wasabia tenuis (Miq.) Matsum.
 分布：北，本，四，九
 産地：北見；両津市-白瀬・馬首，相川町-北河内・入川，羽茂町-小泊・飯岡。野田；真野町-西三川，相川町-入川。
- 328 オランダガラシ ※
Nasturtium officinale R. Br.
 分布：北，本，四，九，琉，帰化植物，ユーラシア原産
 産地：真野町-西三川。逸出
- 329 ヤマガラシ ※
Barbarea orthoceras Ledeb.
 分布：北，本(中部以北)
 産地：北見；相川町-大倉・矢柄，両津市-真木。野田；金北山。
- 330 ミヤマハタザオ ※
Arabis lyrata L. var. *kamtschatica* Fisch.
 分布：北，本，四(剣山)，朝鮮
 産地：北見；ドンデン。野田；金北山，アオネバ越え。秋庭；相川町-入川。
- 331 ヤマハタザオ ※
Arabis hirsuta (L.) Scopoli

分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；羽茂町-亀脇。野田；真野町-西三川, 赤泊。

332 ハマハタザオ ※
Arabis stelleri DC.

var. *japonica* (A. Gray) Fr. Schm.

分布：北, 本, 四, 九

産地：北見；羽茂町-亀脇, 相川町-千本。野田；佐和田町-河原田, 両津市-内海府。秋庭；相川町-入川海岸。

333 イワハタザオ ※

Arabis serrata Franch. et Savat.

var. *japonica* Ohwi

分布：本(中北部)

産地：北見；ドンデン, 金北山, 妙見山。野田；金北山。秋庭；佐和田町-真光寺山。

334 ケナシイワハタザオ

Arabis serrata Franch. et Sorat.

var. *japonica* Ohwi forma *glabrescens* Ohwi

産地：佐渡が原標本の産地 (奥山:1974)

335 イワテハタザオ

Arabis serrata Franch. et Sorat.

var. *japonica* Ohwi forma *fauriei* Ohwi

分布：本(岩手山)

産地：北見；ドンデン, 金北山, 妙見山, 大倉越え。

336 イヌガラシ ※

Rorippa indica (L.) Hiern

分布：北, 本, 四, 九, 琉

産地：北見；羽茂町-小泊。野田；佐和田町-河原田。

337 キレバイヌガラシ

Rorippa sylvestris Besser

分布：北, 本(北部), ユーラシア原産, 帰化植物,

産地：金井町-佐渡女子高校々庭, 種苗と一緒に移入したものである

338 スカシタゴボウ ※

Rorippa islandica (Oeder) Borlas

分布：北, 本, 四, 九, 琉

産地：野田；畑野町-松ヶ崎。

すずかけのき科

339 スズカケノキ

Platanus orientalis L.

分布：バルカン半島, ヒマラヤ, 帰化植物, 明治初期に渡来 植栽

産地：北見；金井町-中興, 佐和田町-河原田。

340 モミジバスズカケノキ

Platanus × acerifolia (Aiton) Willd.

分布：世界で街路樹として用いる, 帰化植物 明治末期に移入

まんさく科

341 ヒュウガミズキ

Corylopsis pauciflora Sieb. et Zucc.

分布：石川県, 福井県, 京都府, 兵庫県の日本海側

産地：庭に植栽, (九州には野生していない)

342 トサミズキ

Corylopsis spicata Sieb. et Zucc.

分布：高知県の岩地

産地：北見；羽茂町-飯岡。

343 マンサク

Hamamelis japonica Sieb. et Zucc.

分布：本(関東地方西部以西), 四, 九

産地：北見；金北山, 畑野町-男神山。野田；金北山, 畑野町-多田。

344 マルバマンサク ※

Hamamelis japonica var. *obtusata* Matsum.

分布：北(西南部), 本(日本海側)

産地：北見；両津市-真更川, 相川町-石名。野田；金北山。秋庭；佐和田町-真光寺山。

ノート：*ニシキマンサク, ベニバナマンサク

北見；金井町-千種

べんけいそう科

345 キリンソウ ※

Sedum aizoon L. var. *floribundum* Nakai

分布：北, 本, 四, 九

産地：北見；羽茂町-小泊, 両津市-梅津。野田；相川町-入川。秋庭；佐和田町-真光寺山。

346 ヒメレンゲ (コマンネンソウ)

Sedum subtile Miq.

分布：本(関東以西), 四, 九

産地：北見；ドンデン

347 コモチマンネングサ ※

Sedum bulbiferum Makino

分布：本(東北地方南部以西), 四, 九, 琉

産地：路傍, 水田畦畔など

348 メノマンネングサ ※

Sedum uniflorum Hook. et Arnott

subsp. *japonicum* (Sieb. et Zucc.) H. Ohba

分布：本, 四, 九

産地：北見；相川町-入川。

349 ミヤママンネングサ ※

Sedum uniflorum Hook. et Arnott

subsp. *japonicum*

var. *senanense* (Makino) H. Ohba

分布：本(亜高山, 高山)

産地：北見；金北山(真保一輔)。野田；金北山。

350 タイトゴメ

Sedum uniflorum Hook. et Arnott

subsp. *oryzifolium* (Makino) H. Ohba

分布：本(関東以西), 四, 九, 奄美大島

- 産地：北見；相川町－入川。野田；相川町－相川，戸中，入川。アオネバ越え，両津市－弾崎。
- 351 ツメレンゲ
Orostachys japonicus (Maxim.) Berger
分布：本(関東以西)，四，九
産地：北見；小木町
- ゆきのした科
- 352 イワガラミ ※
Schizophragma hydrangeoides Sieb. et Zucc.
分布：北，本，四，九
産地：北見；両津市－梅津，羽茂町－飯岡・小泊。野田；両津市 梅津，大塚山。秋庭；佐和田町－真光寺山。池上・石澤；分布図(2) no. 83－真野町－西三川，赤泊村，畑野町－丸山。
- 353 ツルアジサイ (ゴトウヅル) ※
Hydrangea petiolaris Sieb. et Zucc.
分布：北，本，四，九
産地：北見；両津市－長江，新穂村－大野，佐和田町－乙和池。野田；金井町，佐和田町－乙和池，相川町－石花。秋庭；相川町－入川上流。池上・石澤；分布図(1) no. 15－両津市－杉池，相川町－寒戸・関・達者，赤泊村－河内，佐和田町－乙和池，小木町－強清水。
- 354 ノリウツギ ※
Hydranea paniculata Sieb. et Zucc.
分布：北，本，四，九，屋久島
産地：北見；佐和田町－乙和池・中山峠。野田；赤泊村，金北山，佐和田町－二宮。秋庭；佐和田町－山田。
- 355 ガクアジサイ
Hydrangea macrophylla (Thunb. ex Murray) Ser.
forma *normalis* (Wilson) Hara
分布：本(関東地方，房総，三浦半島) 日本固有，太平洋側
産地：北見；ドンデン
- 356 ヤマアジサイ
Hydrangea serrata (Thunb. ex Murray) Ser.
分布：ほん(福島県以南の太平洋側)，四，九
産地：北見；相川町－入川。野田；金北山，妙見山，相川町－入川・大倉越え。秋庭；金北山。
- 357 アマチャ
Hydrangea serrata var. *thunbergii* (Sieb.) H. Ohba
分布：本(中部地方，関東地方)
産地：北見；相川町－北狄・入川。
- 358 エゾアジサイ ※
Hydrangea serrata var. *megacarpa* (Ohwi) H. Ohba
分布：北，本(青森県～京都府の日本海側)
産地：北見；ドンデン。野田；金北山。
- 359 ウツギ ※
Deutzia crenata Sieb. et Zucc.
分布：北(南部)，本，四，九
- 産地：北見；両津市－梅津，羽茂町－小泊。野田；金北山，両津市－大川・入桑・梅津。秋庭；佐和田町－真光寺山。
- 360 ウメバチソウ ※
Parnassia palustris L. var. *multiseta* Ledeb.
分布：北，本，四，九
産地：北見；ドンデン，金北山，妙見山，畑野町－大地山。野田；金北山，ドンデン。池上・石澤；分布図(3) no. 182－ドンデン，金北山，大塚山，妙見山，相川町－入川。
- 361 シラヒゲソウ
Parnassia foliosa Hook. fil. et Thoms.
var. *nummularia* (Maxim.) T. Ito
分布：本，四，九
産地：北見；畑野町－経塚山。野田；畑野町－経塚山。
- 362 オオシラヒゲソウ ※
Parnassia foliosa var. *japonica* (Nakai) Ohwi
分布：本(秋田県～兵庫県の日本海側)
産地：池上・石澤；分布図(3) no. 181－畑野町－経塚山
- 363 タコノアシ ※
Penthorum chinense Pursh
分布：本，四，九，奄美大島
産地：野田；畑野町－松ヶ崎
- 364 ネコノメソウ ※
Chrysosplenium grayanum Maxim.
分布：北，本
産地：北見；金北山。野田；金北山。池上・石澤；分布図(3) no. 178－両津市－杉池・ドンデン・羽吉・野城，相川町－石花・大倉・大塚山，佐和田町－乙和池・山田，畑野町－長谷寺・経塚山，真野町－妙宣寺。
- 365 チシマネコノメソウ ※
Chrysosplenium kamschaticum Fisch. ex Seringe
分布：北，本(近畿地方以北の日本海側)
産地：北見；金北山。野田；金北山。秋庭；佐和田町－真光寺二の川。池上・石澤；分布図(2) no. 81－佐渡全域。
- 366 ホクリクネコノメソウ
Chrysosplenium fauriei Franch.
分布：本(新潟県一島根県の日本海側)
産地：野田；両津市－梅津。
- 367 マルバネコノメソウ
Chrysosplenium ramosum Maxim.
分布：北，本(近畿以北)
産地：北見；ドンデン
- 368 ツルネコノメソウ
Chrysosplenium flagelliferum Fr. Schm.
分布：北，本(近畿以北)，四(剣山)
産地：北見；羽茂町－小泊。
- 369 ヤマネコノメソウ ※
Chrysosplenium japonicum (Maxim.) Makino

分布：北（西南部），本，四，九
産地：北見；羽茂町－小泊。野田；真野町－新町。池上・石澤；分布図（2）no. 80－佐渡全域。

370 ズダヤクシュ ※

Tiarella polyphylla D. Don.

分布：北，本（近畿以東），四

産地：北見；ドンデン。野田；金北山，大塚山，佐和田町－乙和池，両津市－梅津。秋庭；佐和田町－真光寺山。

371 コチャルメルソウ ※

Mitella pauciflora Rosend.

分布：本，四，九

産地：北見；相川町－矢柄。野田；相川町。池上・石澤；分布図（3）no. 180－佐渡全域 山地谷沿いの陰湿地。

372 チャルメルソウ

Mitella furusei Ohwi var. *subramosa* Wakabayashi

分布：本（福井県，長野県，三重県以西）

産地：北見；羽茂町－小泊。

373 ヤグルマソウ ※

Rodgersia podophylla A. Gray

分布：北（西南部），本

産地：北見；ドンデン，相川町－入川，金井町－中興。野田；アオネバ越え。秋庭；妙見山下。池上・石澤；分布図（2）no. 82－佐渡全域。

374 トリアシショウマ ※

Astilbe thunbergii (Sieb. et Zucc.) Miq.

var. *congesta* H. Boiss.

分布：北，本（中北部）

産地：北見；相川町－北狄，両津市－梅津・鷺崎，羽茂町－小泊・大崎。野田；金北山。秋庭；妙見山腹。

375 ユキノシタ ※

Saxifraga stolonifera Meerb.

分布：本，四，九

産地：北見；両津市－梅津，相川町－入川，羽茂町－小泊。

376 ダイモンジソウ ※

Saxifraga fortunei Hook. fil.

var. *incisolobata* (Engl. et Irmisch.) Nakai

分布：北，本，四，九

産地：北見；両津市－梅津，相川町－入川，羽茂町－小泊。野田；金北山，両津市－椿，相川町－小田・戸中，畑野町－松ヶ崎。

とべら科

377 トベラ ※

Pittosporum tobira (Thunb. ex Murray) Aiton

分布：本（太平洋側～岩手県以南，日本海側－石川県以南）

山地；小木町－犬神平。野田；小木町－深浦。

ばら科

378 ホザキシモツケ

Spiraea salicifolia L.

分布：北，本（中部）

産地：公園等に植栽。

379 シモツケ

Spiraea japonica L. fil.

分布：本，四，九

産地：各地で植栽。

380 ユキヤナギ

Spiraea thunbergii Sieb. ex Blume

分布：本（関東以西），四，九

産地：各地で植栽。

381 イワシモツケ ※

Spiraea nipponica Maxim.

分布：本（近畿以東）

産地：北見；相川町－船山。野田；金北山。秋庭；二の岳。

382 マルバイワシモツケ

Spiraea nipponica forma *rotundiloba* Makino

産地：北見；相川町－入川。野田；相川町－入川。

383 コデマリ

Spiraea cantoniensis Lour.

分布：中国（中南部），帰化植物 植栽

産地：北見；羽茂町－小泊。

384 ヤマブキショウマ ※

Aruncus dioicus (Walt.) Fern.

var. *tenuifolius* (Nakai) Hara

分布：北，本，四，九

産地：北見；ドンデン。野田；金北山，経塚山。秋庭；佐和田町－乙和池下。池上・石澤；分布図（2）no. 85－相川町－北狄。

385 イヌザクラ ※

Prunus buergeriana Miq.

分布：本，四（南限；鹿児島島紫尾山）

産地：北見；両津市－梅津。野田；相川町－石花。

386 ウワミズザクラ ※

Prunus grayana Maxim.

分布：北（石狩平野），本，四，九

産地：北見；金北山両津市－梅津。秋庭；相川町－片辺越え・大塚山。池上・石澤；分布図（3）no. 185－佐渡全域。

387 シウリザクラ（シオリザクラ）※

Prunus ssiori Fr. Schm.

分布：北，本（中北部）温帯北部～亜寒帯

産地：北見；相川町－矢柄。

388 エゾノウワミズザクラ

Prunus padus L.

分布：北 温帯北部～亜寒帯

産地：北見；羽茂町－小泊。

- 389 ユスラウメ
Prunus tomentosa Thunb. ex Murray
分布：中国北部，帰化植物 江戸時代初期に渡来，植栽
産地：北見；両津市-岩首。
- 390 ニワウメ
Prunus japonica Thunb. ex Murray
分布：中国北部，帰化植物
産地：各地植栽
- 391 タカネザクラ (ミネザクラ) ※
Prunus nipponica Matsum.
分布：北，本(中部以北) 温帯～亜寒帯
産地：北見；金北山。野田；金北山。秋庭；二の岳，妙見山大芝場。
- 392 オオヤマザクラ ※
Prunus sargentii Rehder
分布：北，本，四，
産地：北見；羽茂町-小泊。
- 393 カスミザクラ ※
Prunus verecunda (Koidz.) Koehne
分布：北，本，四，九
産地：北見；金北山
- 394 ヤマザクラ ※
Prunus jamasakura Sieb. ex Koidz.
分布：本 (太平洋側-宮城県，日本海側-新潟県以南)
産地：北見；両津市-梅津，羽茂町-村山。野田；金北山，相川町。
- 395 ウスゲヤマザクラ
Prunus jamasakura forma *pubescens* (Makino) Ohwi
分布：本 (宮城県，新潟県以西)，四，九
産地：北見；金北山，相川町-矢柄。秋庭；佐和田町-二宮妙照寺。
- 396 ヤマブキ ※
Kerria japonica (L.) DC.
分布：北，本，四，九
産地：北見；羽茂町-飯岡。
- 397 ヤエヤマブキ
Kerria japonica forma *plena* C. K. Schn.
分布：北，本，四，九
産地：北見；羽茂町-飯岡。
- 398 ノイバラ ※
Rosa multiflora Thunb.
分布：北(西南部)，本，四，九
産地：北見；小木町-澤。野田；金北山，国府川，新穂村。秋庭；妙見山大芝場。
- 399 ヤブイバラ (ニオイイバラ)
Rosa onoei Makino
分布：本 (中央構造線以南の山地)
産地：北見；ドンデン
- 400 テリハノイバラ ※
Rosa wichuraiana Crepin
分布：本，四，九，琉
産地：北見；金北山。野田；金北山，妙見山，両津市-弾崎。秋庭；妙見山。
- 401 ハマナシ(ハマナス) ※
Rosa rugosa Thunb.
分布：北，本(太平洋側-茨城県，日本海側-島根県以北)
産地：北見；相川町-千本。野田；両津市-梅津・願，相川町-入川・達者。秋庭；佐和田町-河原田海岸。
- 402 トゲハマナス
Rosa rugosa var. *sadoense* Kitami
産地：北見；両津市-浜梅津・藻浦・浄蓮坊。
- 403 コハマナス ※
Rosa × iwara Sieb.
分布：北，本(北部)
産地：野田；相川町-達者 (北見健彦)
ノート：ハマナス ×ノイバラの雑種，大佐渡山脈尾根の芝地におおく見られる。
- 404 フユイチゴ ※
Rubus buergeri Miq.
分布：本(房総半島，新潟県以西)，四，九
産地：秋庭；相川町-片辺越え，大塚山下。
- 405 コバノフユイチゴ (マルバノフユイチゴ) ※
Rubus pectinellus Maxim.
分布：本，四，九
産地：北見；ドンデン，相川町-南片辺船山，新穂村-根本寺。野田；金北山，大塚山，相川町-高千。
- 406 ミヤマニガイチゴ
Rubus koehneanus Focke
分布：本(東北地方-近畿地方)
産地：北見；両津市-梅津。
- 407 クマイチゴ ※
Rubus crataegifolius Bunge
分布：北，本，四，九
産地：北見；真野町-静平。野田；アオネバ越え。秋庭；金北山金井町口。
- 408 モミジイチゴ ※
Rubus palmatus Thunb. var. *coptophyllus* A. Gray
分布：本，四，九
産地：北見；羽茂町-小泊。秋庭；佐和田町-真光寺山。
- 409 ナガバモミジイチゴ
Rubus palmatus var. *palmatus*
分布：本(中部地方以西)，四，九
産地：北見；両津市-梅津。野田；金北山，大地山。
- 410 カジイチゴ ※
Rubus trifidus Thunb.
分布：本 (関東地方以西の太平洋側)
産地：北見；両津市-梅津。
- 411 ミヤマウラジロイチゴ
Rubus yabei Lev. et Vant.
分布：本(関東，中部，近畿) 亜高山
産地：北見；ドンデン

- 412 ナワシロイチゴ ※
Rubus parvifolius L.
 分布：北，本，四，九，琉
 産地：北見；両津市—梅津。野田；国府川，新穂村。秋庭；金北山金井町口。
- 413 アオナワシロイチゴ
Rubus parvifolius var. *concolor* Makino et Nemoto
 産地：野田；国府川
- 414 ウラジロイチゴ (エビガライチゴ) ※
Rubus phoenicolasius Maxim.
 分布：北，本，四，九
 産地：北見；ドンデン。野田；金北山，佐和田町—二宮。秋庭；佐和田町—真光寺二ノ川。池上・石澤；分布図 (1) no. 18—両津市—豊岡・内海府・願，相川町—達者・入川・北片辺・北狄，真野町，新穂村—清水寺越，畑野町—小倉，小木町—深浦，佐和田町—乙和池。
- 415 オニシモツケ ※
Filipendula kamtschatica (Pall.) Maxim.
 分布：北，本 (中北部)
 産地：北見；ドンデン，相川町—船山。野田；金北山，相川町—入川，両津市—加茂・アオネバ越え。秋庭；佐和田町—乙和池下。池上・石澤；分布図 (3) no. 184—両津市—黒姫・ドンデン，相川町—戸地・南片辺・北片辺・大塚山・矢柄川。
- 416 ナツユキソウ
Filipendula purpurea Maxim.
 var. *auriculata* Ohwi forma *albiflora* Okuyama
 産地：北見；両津市—梅津。野田；両津市—加茂。
 ノート：コシジシモツケソウ (日本海要素) の白花品
- 417 キョウガノコ
Filipendula purpurea Maxim. var. *purpurea*
 産地：各地で栽培。
- 418 シモツケソウ
Filipendula multijuga Maxim.
 分布：本 (関東以西)，四，九 太平洋側
 産地：北見；金北山，大塚山 (真保一輔)。
- 419 シロバナヘビイチゴ ※
Fragaria nipponica Makino
 分布：本 (宮城県—中部地方)，屋久島
 産地：大佐渡山脈尾根の草地。
- 420 ヤブヘビイチゴ ※
Duchesnea india (Andr.) Focke
 分布：本 (関東以西)，四，九，琉
 産地：北見；佐和田町；山田，金井町—平。野田；羽茂町，小木町—蓮華峯，相川町，新穂村，大塚山。秋庭；佐和田町—真光寺山。
- 421 ヘビイチゴ ※
Duchesnea chrysantha (Zoll. et Mor.) Miq.
 分布：北，本，四，九，琉
 産地：北見；羽茂町—小泊。
- 422 エゾツルキンバイ ※
Potentilla egedei Wormsk.
 var. *grandis* (Torr. et Gray) Hara
 分布：北，本 (北部)
 産地：北見；相川町—橋。
- 423 ヒメヘビイチゴ ※
Potentilla centigrana Maxim.
 分布：北，本，四，九
 産地：北見；ドンデン。野田；金北山，金井町，新穂村，両津市—加茂。
- 424 イワキンバイ ※
Potentilla dickinsii Franch. et Savat.
 分布：北，本，四，九
 産地：北見；相川町—入川 (真保一輔)。野田；アオネバ越え。
- 425 ミヤマキンバイ
Potentilla matsumurae Th. Wolf
 分布：北，本 (中北部)
 産地：北見；ドンデン
- 426 ミツバツチグリ ※
Potentilla freyniana Bornm.
 分布：本，四，九
 産地：北見；相川町—入川，両津市—梅津，佐和田町—山田。野田；金北山，両津市—梅津，新穂村—国見山，畑野町—松ヶ崎。秋庭；佐和田町—真光寺山。
- 427 キジムシロ ※
Potentilla fragarioides L. var. *major* Maxim.
 分布：北，本，四，九
 産地：北見；羽茂町—小泊，両津市—梅津。野田；相川町—入川。
- 428 エチゴキジムシロ ※
Potentilla togasii Ohwi
 分布：本 (新潟県以北の日本海側)
 産地：秋庭；妙見山頂
- 429 ツルキジムシロ
Potentilla stolonifera Lehm.
 分布：北，本，九
 産地：野田；金北山。池上・石澤；分布図 (3) P. 375—金北山 (越後新記録)。
- 430 ツルキンバイ
Potentilla yokusaiana Makino
 分布：本 (関東以西)，四，九
 産地：北見；金北山，妙見山。野田；金北山。
- 431 カワラサイコ ※
Potentilla chinensis Ser.
 分布：本，四，九
 産地：北見；相川町—入川。野田；相川町—石花。秋庭；相川町—戸地。
- 432 ヒロハノカワラサイコ
Potentilla nipponica Th. Wolf

- 分布：北，本（中北部）
産地：北見；金北山，相川町－入川。
- 433 ダイコンソウ ※
Geum japonicum Thunb.
分布：北（南部），本，四，九
産地：北見；両津市－梅津。野田；両津市－鮑・加茂，赤泊村，畑野町－飯出山，佐和田町－河原田。秋庭；佐和田町－乙和池下。
- 434 オオダイコンソウ ※
Geum aleppicum Jaeg.
分布：北，本（中北部）
産地：北見；ドンデン，小木町－城山。野田；小木町，相川町－石花。
- 435 ヒメキンミズヒキ ※
Agrimonia nipponica Koidz.
分布：北（西南部），本，四，九，屋久島
産地：池上・石澤；分布図(1) no.17－佐和田町－乙和池，両津市－山居池。
- 436 キンミズヒキ ※
Agrimonia pilosa Ledeb.
var. *japonica* (Miq.) Nakai
分布：北，本，四，九
産地：北見；羽茂町－素浜。野田；真野町，両津市－鮑，金井町，相川町－石花。池上・石澤；分布図(2) no.84－両津市－願・赤玉・杉池，相川町－達者，佐和田町－河原田，畑野町－島見。
- 437 ナナカマド ※
Sorbus commixta Hedl.
分布：北，本，四，九
産地：北見；両津市－梅津，小木町－元小木町，羽茂町－小泊。野田；金北山，大倉越え。秋庭；妙見山刀根。
- 438 サビバナナカマド
Sorbus commixta
var. *rufo-ferruginea* C. K. Schn.
分布：本（関東，東海地方），四（亜高山）
産地：野田；相川町－北狄。
- 439 ツシマナナカマド
Sorbus commixta var. *wilfordii* (Koehne) Sugimoto
分布：本（北陸地方），長崎県（対馬）
産地：北見；両津市－横山，相川町－矢柄。
- 440 アズキナシ（ハカリノメ） ※
Sorbus alnifolia (Sieb. et Zucc.) C. Koch
分布：北，本，四，九
産地：北見；相川町－入川（真保一輔）。野田；畑野町－飯出山。
- 441 ビワ ※
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.
分布：本（西部），四，九 中国原産，帰化植物
産地：北見；羽茂町－小泊，両津市－豊岡（自然林といわれる）。
- 442 シャリンバイ（マルバシャリンバイ） ※
Rhaphiolepis indica (L.) Lindl. ex Ker
var. *umbellata* (Thunb. ex Murray) Ohashi
分布：本（宮城県，山形県以西），四，九
産地：北見；相川町－小川～北狄，両津市－鷺崎。野田；相川町－小川・姫津・秋庭；相川町－小川。
- 443 カマツカ ※
Pourthiaea villosa (Thunb.) Decne.
var. *laevis* (Thunb.) Stapf.
分布：北，本，四，九
産地：北見；ドンデン，羽茂町－小泊。秋庭；佐和田町－真光寺山。
- 444 ワタゲカマツカ（オオカマツカ）
Pourthiaea villosa var. *villosa* Decne.
産地：北見；佐和田町－二宮（真保一輔）。
- 445 ケカマツカ
Pourthiaea villosa
var. *zollingeri* (Decne.) Nakai
産地：北見；両津市－梅津，相川町－矢柄。
- 446 ズミ（コリンゴ） ※
Malus toringo (Sieb.) Sieb. ex Vriese
分布：北，本，四，九
産地：北見；金北山（真保一輔）。秋庭；二ノ岳，妙見山大芝場。
- 447 ミチノクナシ（イワテナシ） ※
Pyrus ussuriensis Maxim.
分布：本，九（北部）
産地：各地農家の庭先などに植栽があったが現在は殆ど伐採された。
- まめ科
- 448 ネムノキ ※
Albizia julibrissin Durazz.
分布：本，四，九，琉
産地：北見；相川町－入川，両津市－梅津。野田；佐渡。
- 449 ハナズオウ
Cercis chinensis Bunge
分布：中国原産 帰化植物
産地：各地植栽
- 450 サイカチ ※
Gleditsia japonica Miq.
分布：本，四，九
産地：植栽
- 451 ジャケツイバラ ※
Caesalpinia decapetala (Roth) Alst.
var. *japonica* (Sieb. et Zucc.) Ohashi
分布：本（宮城県，山形県以南），四，九
産地：北見；相川町－吹上・鹿野浦・入川，羽茂町－小泊，小木町－宿根木。野田；真野町－西三川。秋庭；相川町－北狄。

- 452 カワラケツメイ ※
Cassia mimosoides L.
 subsp. *nomame* (Sieb.) Ohashi
 分布: 本, 四, 九
 産地: 北見; 金井町-中興, 両津市-梅津。野田; 金井町, 両津市-水津。
- 453 クララ ※
Sophora flavescens Ait.
 分布: 本, 四, 九
 産地: 北見; 相川町-入川, 両津市-梅津。野田; 相川町-石花。秋庭; 佐和田町-乙和池道。
- 454 イヌエンジュ ※
Maackia amurensis Rupr. et Maxim.
 subsp. *buergeri* (Maxim.) Kitamura
 分布: 北, 本 (中部地方以北)
 産地: 北見; 小木町 (真保-輔)。野田; 小木町。
- 455 ハリエンジュ (ニセアカシア) ※
Robinia pseudoacacia L.
 分布: 北アメリカ原産 帰化植物 明治中頃に渡来。
 産地: 北見; 相川町-山の神, 羽茂町-小泊。植栽
- 456 フジ (ノダフジ) ※
Wisteria floribunda (Willd.) DC.
 分布: 本, 四, 九
 産地: 北見; 羽茂町-小泊。
- 457 シロバナフジ ※
Wisteria floribunda forma *alba* Rehd. et Wils.
 分布: 本, 四, 九
 産地: 北見; 羽茂町-村山・小泊。
- 458 ヤマフジ
Wisteria brachybotrys Sieb. et Zucc.
 分布: 本 (近畿以西), 四, 九
 産地: 野田; 金北山
- 459 センダイハギ ※
Thermopsis lupinoides (L.) Link
 分布: 北, 本 (中部以北)
 産地: 北見; 相川町-高瀬・北狄・戸地, 両津市-藻浦・馬首。野田; 相川町-外海府・入川・大塚山・春日崎。秋庭; 相川町-橘。
- 460 コマツナギ ※
Indigofera pseudo-tinctoria Matsum.
 分布: 本, 四, 九
 産地: 北見; 両津市-藻浦, 相川町-入川・北田野浦。野田; 相川町-石花。
- 461 ニワフジ (イワフジ)
Indigofera decora Lindl.
 分布: 本 (中部, 近畿地方), 四, 九
 産地: 北見; 畑野町-栗野江・畑野, 金井町-安養寺。野田; 新穂村, 金井町, 吉井。
- 462 ゲンゲ (レンゲソウ) ※
Astragalus sinicus L.
 分布: 中国原産, 帰化植物
 産地: 北見; 金井町-中興。
- 463 ミヤコグサ ※
Lotus corniculatus L. var. *japonicus* Regel
 分布: 北, 本, 四, 九
 産地: 北見; 相川町-入川。野田; 両津市-両尾・北鶴島。秋庭; 妙見山頂。
- 464 ニシキミヤコグサ ※
Lotus corniculatus
 var. *japonicus* forma *versicolor* Makino
 産地: 北見; 相川町-入川。野田; 金北山, 相川町-入川。
- 465 セイヨウミヤコグサ ※
Lotus corniculatus var. *corniculatus*
 分布: 帰化植物
 産地: 路傍
- 466 シナガワハギ
Melilotus officinalis (L.) Pallas
 分布: 北, 本, 四, 九, 琉 帰化植物といわれる。
 産地: 北見; 相川町-入川, 羽茂町-亀脇。
- 467 シロバナシナガワハギ ※
Melilotus alba Medic.
 分布: 北, 本, 四, 九, 琉 帰化植物 中央アジア原産
 産地: 路傍
- 468 ウマゴヤシ ※
Medicago polymorpha L.
 分布: 北, 本, 四, 九, 琉 帰化植物 ヨーロッパ原産 明治時代に渡来
 産地: 北見; 金井町-中興, 佐和田町-八幡。野田; 小木町, 赤泊村, 金井町。
- 469 ムラサキツメクサ (アカツメクサ) ※
Trifolium pratense L.
 分布: 北, 本, 四, 九, 琉 帰化植物 ヨーロッパ原産
 産地: 北見; 羽茂町-小泊。野田; 金北山, 相川町。秋庭; 妙見山白子刀根。
- 470 シロツメクサ (クローバー) ※
Trifolium repens L.
 分布: 北, 本, 四, 九, 琉 帰化植物 ヨーロッパ原産 江戸時代に渡来。
 産地: 北見; 羽茂町-小泊。野田; 相川町。
- 471 コメツブツメクサ ※
Trifolium dubium Sibth.
 分布: 北, 本, 四, 九, 琉 帰化植物 ヨーロッパ~西アジア原産
 産地: 路傍, 畦畔などの草地。
- 472 ヤハズエンドウ (カラスノエンドウ) ※
Vicia angustifolia L.
 分布: 北, 本, 四, 九
 産地: 北見; 両津市-梅津。野田; 赤泊村。

- 473 ツルナシカラスノエンドウ
Vicia angustifolia forma *normalis* Makino
産地：北見；両津市-梅津。
- 474 オオヤハズエンドウ (ザートウイッケン)
Vicia sativa L.
分布：ヨーロッパ原産 帰化植物
産地：野田；赤泊村
- 475 カスマグサ ※
Vicia tetrasperma (L.) Schreb.
分布：本，四，九，琉
産地：北見；両津市-梅津，畑野町-栗野江，金井町-尾花崎。野田；真野町-西三川・真野，佐和田町-二宮，相川町-戸中，金北山。
- 476 スズメノエンドウ ※
Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray
分布：本，四，九，琉
産地：北見；両津市-梅津，畑野町-栗野江。野田；佐和田町-二宮，真野町-西三川。
- 477 ビロードクサフジ ※
Vicia villosa Roth
分布：北，本，四，九，琉 帰化植物 ヨーロッパ～西アジア原産
産地：北見；羽茂町-上山田・亀脇。
- 478 クサフジ ※
Vicia cracca L.
分布：北，本，九
産地：野田；小木町-深浦。
ノート：*ケクサフジ var. *canescens* Maxim. 野田；小木町-深浦。
- 479 ナンテンハギ ※
Vicia unijuga A. Br.
分布：北，本，四，九
産地：北見；どんでん。野田；両津市-梅津・椿。秋庭；相川町-後尾。
- 480 エゾノレンリソウ ※
Lathyrus palustris L. subsp. *pilosus* (Cham.) Hult.
分布：北，本，対馬
産地：北見；小木町-澤，相川町-戸地・高下。野田；相川町-入川。
- 481 ハマエンドウ ※
Lathyrus japonicus Willd. subsp. *japonicus*
分布：北，本，四，九，琉
産地：北見；相川町-大浦・北狄・北河内，羽茂町-亀脇。野田；相川町-入川。秋庭；佐和田町-河原田海岸。
- 482 クサネム ※
Aeschynomene indica L.
分布：北，本，四，九，琉
産地：北見；金井町-中興，両津市-梅津。野田；金井町，畑野町-多田。
- 483 フジカンゾウ ※
Desmodium oldhamii Oliver
分布：本，四，九
産地：北見；両津市-羽黒・浦川，相川町-矢柄。野田；両津市-椿。池上・石澤；分布図(3) no.187-両津市-豊岡，相川町-後尾。
- 484 ヌスビトハギ ※
Desmodium podocarpum DC.
subsp. *oxyphyllum* (DC.) Ohashi
分布：北，本，四，九，琉
産地：北見；ドンデン，羽茂町-飯岡，真野町-田切須。野田；赤泊村。秋庭；佐和田町-乙和池下。
- 485 ヤブハギ ※
Desmodium podocarpum subsp. *oxyphyllum*
var. *mandshuricum* Maxim.
分布：北，本，四，九
産地：北見；金北山(真保一輔)。野田；金北山，赤泊，羽茂，両津市-内海府。
- 486 マルバハギ
Lespedeza cyrtobotrya Miq.
分布：本，四，九
産地：北見；羽茂町-小泊。
- 487 ヤマハギ ※
Lespedeza bicolor Turcz.
分布：北，本，四，九
産地：北見；羽茂町-小泊。野田；金北山，金井町，両津市-梅津。池上・石澤；分布図(3) no.158-山地全域。
- 488 ヤハズソウ ※
Lespedeza striata (Thunb.) Hook. et Arn.
分布：北，本，四，九，琉
産地：北見；羽茂町-飯岡・小泊。野田；金北山小川口，両津市-内海府。
- 489 マルバヤハズソウ
Lespedeza stipulacea Maxim.
分布：本，四，九
産地：北見；金井町-三瀬川。
- 490 ネコハギ ※
Lespedeza pilosa (Thunb.) Sieb. et Zucc.
分布：本，四，九
産地：北見；ドンデン，妙見山，両津市-椿，羽茂町-小泊。野田；相川町-小田・粟田・戸中，畑野町-多田，赤泊村，佐和田町-二宮，両津市-梅津。池上・石澤；分布図(2) no.89-両津市-北小浦，相川町-達者，金井町-吉井，佐和田町-河原田。
- 491 メドハギ ※
Lespedeza juncea (L. fil.) Pers.
var. *subsessilis* Miq.
分布：北，本，四，九，琉
産地：北見；羽茂町-小泊。野田；金井町，相川町-小田・相川，小木町-蓮華峯。

- 492 ツルメドハギ
Lespedeza intermixta Makino
産地：北見；金北山
- 493 イヌハギ ※
Lespedeza tomentosa (Thunb.) Sieb. ex Maxim.
分布：本，四，九，琉
産地：北見；真野町，佐和田町－八幡。池上・石澤；分布図(3) no.189－金井町－吉井，佐和田町－河原田・八幡。
- 494 タンキリマメ
Rhynchosia volubilis Lour.
分布：本(千葉県以西)，四，九，琉
産地：北見；ドンデン
- 495 ホドイモ ※
Apios fortunei Maxim.
分布：北，本，四，九
産地：北見；金北山，羽茂町－飯岡，赤泊村－下川茂。秋庭；相川町－片辺越え。
- 496 クズ ※
Pueraria lobata (Willd.) Ohwi
分布：北，本，四，九，奄美大島
産地：北見；羽茂町－小泊，両津市－梅津。野田；真野町，佐和田町－二宮，両津市－弾崎。
- 497 ノササゲ ※
Dumasia truncata Sieb. et Zucc.
分布：本，四，九
産地：北見；小木町－江積，羽茂町－亀脇，相川町－入川。野田；二ノ岳，両津市－梅津，畑野町－多田・松ヶ崎，相川町。
- 498 ヤブマメ ※
Amphicarpaea bracteata (L.) Fernald
subsp. *edgeworthii* (Benth.) Ohashi
var. *japonica* (Oliver) Ohashi
分布：北，本，四，九
産地：北見；相川町－北狄。野田；相川町－小川・戸中。
- かたばみ科
- 499 カタバミ ※
Oxalis corniculata L.
分布：北，本，四，九，琉
産地：北見；相川町－入川。野田；相川町，佐和田町－河原田・二宮，畑野町－松ヶ崎。
- 500 ウスアカカタバミ
Oxalis corniculata
forma *tropaeoloides* (Schlacht.) R. Knuth
産地：北見；相川町－入川，両津市－梅津。野田；金井町。
- 501 ハナカタバミ ※
Oxalis bowieana Lodd.
分布：南アフリカ原産 帰化植物 江戸末期に移入。
産地：北見；相川町－京町。

- 502 ミヤマカタバミ ※
Oxalis griffithii Edgew. et Hook. fil.
分布：本(東北南部～中部地方)，四
産地：北見；佐和田町－乙和池，ドンデン，羽茂町－村山。秋庭；佐和田町－真光寺山。
- 503 オオヤマカタバミ
Oxalis obtriangulata Maxim.
分布：本(中部)，九
産地：北見；金北山，両津市－梅津・片野尾・真木。野田；金北山，経塚山，畑野町－松ヶ崎，佐和田町－二宮。
- ふうろそう科
- 504 ゲンノショウコ ※
Geranium nepalense Sweet
subsp. *thunbergii* (Sieb. et Zucc.) Hara
分布：北，本，四，九，奄美大島
産地：北見；羽茂町－小泊。野田；金北山，金井町，畑野町，赤泊村。秋庭；佐和田町－乙和池道。
- 505 ミツバフウロ (フシダカフウロ)
Geranium wilfordii Maxim.
分布：北，本，四，九
産地：北見；相川町－片辺(真保一輔)。
- 506 ハマフウロ
Geranium yesoense Franch. et Savat.
var. *pseudo-palustre* Nakai
分布：北，本(東北地方の海岸)
産地：北見；金井町－千種。
- 507 タチフウロ
Geranium krameri Franch. et Savat.
分布：本(東北南部～中部地方)，四，九
産地：北見；羽茂町－備附山東。
- とうだいぐさ科
- 508 アブラギリ
Aleurites cordata (Thunb.) R. Br. ex Steudo.
分布：本(中部地方以西)，四，九
産地：北見；相川町(真保一輔)
- 509 シラキ ※
Sapium japonicum (Sieb. et Zucc.) Pax et K. Hoffm.
分布：本(岩手県，山形県以南)，四，九
産地：北見；両津市－梅津・椿，羽茂町－飯岡。野田；小木町－宿根木，佐和田町－二宮，両津市－鷺崎。秋庭；金北山金井町口。池上・石澤；分布図(1) no. 20－両津市－山居・久知川，相川町－大塚山・達者・揚島・鹿野浦・入川，佐和田町－乙和池，新穂村－清水寺越え，畑野町－島見・経塚山，真野町，小木町－強清水・深浦。
- 510 ナンキンハゼ
Sapium sebiferum (L.) Roxb.

- 分布：中国原産 帰化植物
産地：金井町新保。運動公園に植栽。
- 511 アカメガシワ ※
Mallotus japonicus (Thunb.) Muell. Arg.
分布：本（宮城県，秋田県以南），四，九
産地：北見；相川町—後尾，両津市—城之腰。野田；金北山相川口。秋庭；佐和田町—乙和池下。池上・石澤；分布図（2）no.92—両津市—願，相川町—寒戸，佐和田町—鍛冶町，経塚山，新穂村—新穂・清水平，赤泊村—春日崎。
- 512 トウダイグサ ※
Euphorbia helioscopia L.
分布：本，四，九，琉
産地：北見；小木町。野田；小木町，両津市—水津。
- 513 ハクサントイゲキ（ミヤマウルシ）
Euphorbia togakusensis Hayata
分布：本（北陸地方，長野県北部～東北地方）
産地：北見；金北山（真保一輔）
- 514 ナツトウダイ ※
Euphorbia sieboldiana Morr. et Decne.
分布：北，本，四，九
産地：北見；ドンデン。野田；金北山，経塚山，国見山，金井町—中興，相川町—入川。秋庭；佐和田町—真光寺山。池上・石澤；分布図（3）no.191—佐渡全域。
- 515 ニシキシソウ
Euphorbia humifusa Willd.
var. *pseudochamaesyce*
(Fisch., Meyer et Lallemand.) Murata
分布：本，四，九
産地：北見；羽茂町—小泊。野田；真野町—西三川。
- 516 コニシキシソウ ※
Euphorbia supina Rafin.
分布：北，本，四，九 帰化植物 原産地不明 明治中期に移入
産地：北見；相川町—入川。野田；金井町，相川町，小木町—蓮華峯。
- 517 エノキグサ（アミガサソウ） ※
Acalypha australis L.
分布：北，本，四，九，琉
産地：北見；羽茂町—小泊，両津市—梅津。野田；佐和田町—河原田，赤泊村。
- 518 ヤマアイ ※
Mercurialis leiocarpa Sieb. et Zucc.
分布：本，四，九，琉
産地：北見；相川町—跳坂，小木町—深浦・宿根本。野田；両津市—河崎，新穂村—国見山，真野町—西三川。池上・石澤；分布図（2）no.93—両津市—久知川，相川町—戸地，新穂村—新穂ダム・清水寺越え，畑野町—小倉，赤泊村—真浦，小木町—強清水。
- 519 ヒメミカンソウ ※
Phyllanthus matsumurae Hayata
分布：本，四，九
産地：北見；金井町—中興，両津市—椿。
- ゆずりは科
- 520 ユズリハ
Daphniphyllum macropodum Miq.
分布：本（福島県以西），四，九，琉 暖帯
産地：庭園に植栽，自然繁殖
- 521 エゾユズリハ ※
Daphniphyllum macropodum
var. *humile* (Maxim.) Rosenthal
分布：北，本（中北部の日本海側，多雪地帯）
産地：北見；妙見山，金北山，ドンデン，相川町—関越え。野田；金北山。秋庭；佐和田町—真光寺山。池上・石澤；分布図（2）no.94—山地全域。
- みかん科
- 522 コクサギ ※
Orixa japonica Thunb.
分布：本，四，九
産地：北見；相川町—関，両津市—梅津・長江・片野尾・野浦。野田；相川町—石花・檀特山。池上・石澤；分布図（2）no.95—両津市—願，柿野浦・豊岡，相川町—寒戸・関・達者，新穂村—新穂ダム・清水寺，真野町—真野・西三川。
- 523 カラスサンショウ ※
Zanthoxylum ailanthoides Sieb. et Zucc.
分布：本，四，九，琉
産地：北見；両津市—鷺崎・藻浦。
- 524 イヌザンショウ ※
Zanthoxylum schinifolium Sieb. et Zucc.
分布：本，四，九
産地：北見；相川町—入川，羽茂町—小泊。野田；両津市—弾崎。
- 525 サンショウ ※
Zanthoxylum piperitum (L.) DC.
分布：北，本，四，九
産地：北見；相川町—岩谷口・矢柄・入川，両津市—梅津・下久知。野田；金北山，畑野町—多田～両津市—河崎。秋庭；佐和田町—真光寺山。
- 526 アサクラザンショウ
Zanthoxylum piperitum forma *inermis* Makino
産地：野田；小木町
- 527 キハダ ※
Phellodendron amurense Rupr.
分布：北，本（東北地方，中部地方北部，近畿地方以北）
産地：北見；佐和田町—河原田，相川町—入川。野田；相川町—石花・檀特山。

528 ミヤマシキミ

Skimmia japonica Thunb.

分布：本（関東地方以西），四，九

産地：北見；羽茂町－飯岡。野田；金北山，大塚山，畑野町－多田～両津市－河崎。

529 ウチダシミヤマシキミ

Skimmia japonica forma *rugosa* (Yatabe) Oywi

分布：本（関東地方以西），四，九

産地：北見；両津市－水津（真保一輔）。野田；両津市－水津。

530 ツルミヤマシキミ（ツルシキミ）※

*Skimmia japonica*var. *intermedia* Komatsu forma *repens*

(Nakai) Hara

分布：北，本（東北地方，中部地方以西の日本海側）

産地：北見；相川町－鹿野浦。野田；金北山，畑野町－多田～両津市－河崎。秋庭；妙見山。池上・石澤；分布図(2) no.96－両津市－久知河内・杉池・河崎・水津，新穂村－清水寺越え・生え椿，金井町－新保川，金北山，佐和田町－沢根，畑野町－猿八・経塚山。

531 カラタチ

Poncirus trifoliata (L.) Rafin.

分布：中国原産 帰化植物

産地：各地で生垣に植栽。

にがき科

532 ニガキ ※

Picrasma quassioides (D. Don) Benn.

分布：北，本，四，九

産地：北見；羽茂町－小泊，小木町－元小木，両津市－梅津・水津。野田；両津市－鷺崎。

533 ニワウルシ（シンジュ）

Ailanthus altissima Swingle

分布：中国原産 帰化植物

産地：各地植栽，佐渡方言；テンツク

せんだん科

534 センダン（アウチ）

Melia azedarach L. var. *subtripinnata* Miq.

分布：本，四，九，琉，小笠原 暖帯

産地：北見；羽茂町－天沢。

ひめはぎ科

535 ヒメハギ ※

Polygala japonica Houtt.

分布：北，本，四，九，琉

産地：北見；羽茂町－亀脇，相川町－北狄・入川，両津市－梅津。野田；赤泊村－下川茂，両津市－岩首，金北山。秋庭；妙見山下禿山。

どくろつぎ科

536 ドクウツギ ※

Coriaria japonica A. Gray

分布：北，本（近畿以东）

産地：北見；相川町－入川。野田；相川町，金北山，金井町，両津市－砲。

うるし科

537 ツタウルシ ※

Rhus ambigua Lavall. ex Dipp.

分布：北，本，四，九 温帯

産地：北見；羽茂町－小泊，両津市－梅津。野田；佐和田町－河原田。秋庭；佐和田町－乙和池道。

538 ヌルデ（フシノキ）※

Rhus javanica L.var. *roxburghii* (DC.) Rehder ex Wils.

分布：北，本，四，九，琉

産地：北見；ドンデン。野田；佐和田町－二宮。秋庭；佐和田町－乙和池道。

539 ヤマウルシ ※

Rhus trichocarpa Miq.

分布：北，本，四，九

産地：北見；金北山。野田；金北山。秋庭；佐和田町－真光寺山。

540 ヤマハゼ

Rhus sylvestris Sieb. et Zucc.

分布：本（関東以西），四，九

産地：北見；両津市－梅津。

541 ウルシ

Rhus verniciflua Stokes

分布：中国原産 帰化植物 植栽

産地：北見；畑野町（真保一輔）

かえで科

542 カラコギカエデ ※

Acer ginnala Maxim.

分布：北，本，四，九

産地：北見；金井町

543 オオモミジ（ヒロハモミジ）

Acer amoenum Carr.

分布：北（中部以北），本（太平洋側は青森県，日本海側は福井県以南）

産地：北見；両津市－長江。

544 ヤマモミジ ※

Acer amoenum var. *matsumurae* (Koidz.) Ogata

分布：本（福井県以北の日本海側）

産地：北見；小木町－金田新田。野田；金北山，畑野町－多田・松ヶ崎，赤泊村，アオネバ越え，大塚山，佐和田町－二宮。秋庭；妙見山腹。池上・石澤；分布図(2) no.98－佐渡全域。

- 545 コハウチワカエデ (イタヤメイゲツ) ※
Acer sieboldianum Miq.
 分布: 本, 四, 九 日本固有
 産地: 北見; 両津市-長江, 羽茂町-妹背山。野田;
 金井町-中興。池上・石澤; 分布図 (3) no.193
 - 両津市-久知川・野城, 佐和田町-真光寺,
 畑野町-猿八・経塚山。
- 546 ヒナウチワカエデ
Acer tenuifolium (Koidz.) Koidz.
 分布: 本 (福島県南部以南), 四, 九
 産地: 北見; ドンデン
- 547 ハウチワカエデ (メイゲツカエデ) ※
Acer japonicum Thunb.
 分布: 北, 本 低山帯~亜高山帯下部
 産地: 北見; 相川町-石名, ドンデン。野田; 金北山, 畑
 野町-多田。秋庭; 妙見山腹。
- 548 ウリハダカエデ ※
Acer rufinerve Sieb. et Zucc.
 分布: 本, 四, 九, 屋久島 日本固有
 産地: 北見; 相川町-入川・北狄, 両津市-羽黒・真木・野
 浦。野田; 金北山, 畑野町, 相川町-入川。秋庭;
 妙見山腹。
- 549 ミネカエデ ※
Acer tschonokii Maxim.
 分布: 北, 本 (中部以北)
 産地: 北見; 佐和田町-乙和池。
- 550 オガラバナ (ホザキカエデ)
Acer ukurunduense Trautv. et Meyer
 分布: 北, 本 (中部以北)
 産地: 野田; 畑野町
- 551 イタヤカエデ
Acer mono Maxim.
 var. *marmoratum* (Nichols.) Hara
 forma *dissectum* (Wesmael) Rehder
 分布: 本 (岩手県~兵庫県), 四, 九
 産地: 北見; ドンデン, 羽茂町-小泊。野田; 畑野町-
 多田~両津市-河崎。秋庭; 佐和田町-真光寺
 山。
- 552 エゾイタヤ ※
Acer mono var. *glabrum* (Lev. et Vant.) Hara
 分布: 北, 本 (東北, 北陸地方, 隠岐島)
 産地: 北見; 相川町-石名, 両津市-鷺崎。
- 553 イトマキイタヤ (モトゲイタヤ)
Acer mono var. *trichobasis* Nakai
 分布: 関東地方西部, 中部地方中南部, 伊吹山, 鈴鹿山
 脈, 大峰山系, 高知県鳥形山
 産地: 北見; 羽茂町-村山, 相川町-関。
- 554 アカイタヤ ※
Acer mono var. *mayrii* (Schwerin.) Sugimoto
 分布: 北, 本 (東北地方~島根県の日本海側)
 産地: 佐渡のイタヤはこの型が最も多い。

むくろじ科

- 555 モクゲンジ
Koelreuteria paniculata Laxm.
 分布: 本 (日本海側)
 産地: 小木町-蓮華峯寺。
- 556 ムクロジ
Sapindus mukurossi Gaertn.
 分布: 本 (茨城県, 新潟県以南), 四, 九
 産地: 北見; 相川町-北狄, 羽茂町-小泊。

とちのき科

- 557 トチノキ ※
Aesculus turbinata Blume
 分布: 北 (西南部), 本, 四, 九
 産地: 北見; 相川町-南片辺・入川, 羽茂町-村山, 両津
 市-椿・馬首。野田; 相川町-戸中。

あわぶき科

- 558 アワブキ ※
Meliosma myriantha Sieb. et Zucc.
 分布: 本, 四, 九
 産地: 野田; 金北山相川口。池上・石澤; 分布図 (2) no.
 99-相川町-南沢。

つりふねそう科

- 559 キツリフネ ※
Impatiens noli-tangere L.
 分布: 北, 本, 四, 九
 産地: 北見; 相川町-戸地。
- 560 ツリフネソウ ※
Impatiens textori Miq.
 分布: 北, 本, 四, 九
 産地: 北見; 佐和田町-乙和池, 相川町-石名, 羽茂町
 -小泊。野田; 佐和田町-二宮, 畑野町-松ヶ崎・
 経塚山。

もちのき科

- 561 イヌツゲ
Ilex crenata Thunb.
 分布: 本 (岩手県以南の太平洋洋側, 近畿以西), 四, 九
 産地: 北見; 羽茂町-小泊。野田; 金北山, 畑野町。秋
 庭; 佐和田町-真光寺山。
- 562 ハイイヌツゲ ※
Ilex crenata var. *paludosa* (Nakai) Hara
 分布: 北, 本 (東北地方中部~中国地方の日本海側)
 産地: 秋庭; 佐和田町-真光寺山。池上・石澤; 分布図
 (2) no.100-佐渡全域。
- 563 アカミノイヌツゲ ※
Ilex sugerokii Maxim.
 var. *brevipedunculata* (Maxim.) S. Y. Hu
 分布: 北, 本 (東北地方~中部地方中北部)

産地：北見；金北山，相川町－入川。野田；金北山。秋庭；二ノ岳頂上。

564 ソヨゴ ※

Ilex pedunculosa Miq.

分布：本（関東地方，新潟県以西），四，九

産地：北見；金北山，大佐渡山脈真峰，両津市－真木，金井町－千種，羽茂町－村山。野田；金北山，畑野町－飯出山。秋庭；佐和田町－真光寺山。池上・石澤；分布図（2）no.102－佐渡全域。

565 モチノキ ※

Ilex integra Thunb.

分布：本（東北地方南部以西），四，九，琉

産地：北見；羽茂町－小泊，相川町－山の神，新穂村－上新穂村。野田；両津市－水津・鮑。

566 ヒメモチ ※

Ilex leucoclada (Maxim.) Makino

分布：北（西南部），本（東北，北陸～山陰）

産地：北見；金北山，片辺道（真保一輔）。野田；畑野町－飯出山・多田，金井町－中興。池上・石澤；分布図（2）no.101－金北山，畑野町－小倉峠・経塚山，両津市－鷲崎・久知河内・山居池・柿野浦。

567 タラヨウ

Ilex latifolia Thunb.

分布：本「静岡県以西」，四，九 暖帯

産地：北見；新穂村－井内。植栽

568 ウメモドキ

Ilex serrata Thunb.

分布：本，四，九

産地：北見；畑野町－畑野。

569 イヌウメモドキ

Ilex serrata forma *argutidens* (Miq) Kurata

産地：北見；畑野町。野田；畑野町。

570 ミヤマウメモドキ ※

Ilex nipponica Makino

分布：本（東北地方，中部地方中北部，近畿北部）

産地：野田；畑野町。池上・石澤；分布図（1）no.22－畑野町－加茂神社。

571 アオハダ ※

Ilex macropoda Miq.

分布：北（西南部），本，四，九

産地：北見；金北山。野田；真野町－西三川。

にしきぎ科

572 ニシキギ ※

Euonymus alatus (Thunb.) Sieb.

分布：北，本，四，九

産地：北見；佐和田町－山田。野田；佐和田町－二宮。

573 コマユミ ※

Euonymus alatus forma *striatus* (Thunb.) Makino

分布：北，本，四，九

産地：北見；小木町－宿根本。野田；金北山，国見山。

秋庭；佐和田町－真光寺山，妙見山中腹。

574 オオコマユミ

Euonymus alatus var. *rotundatum*

産地：北見；ドンデン

575 マサキ ※

Euonymus japonicus Thunb.

分布：北（渡島），本，四，九，琉，小笠原

産地：北見；羽茂町－亀脇。野田；真野町－西三川，両津市－水津，相川町－入川。秋庭；佐渡。

576 ツルマサキ ※

Euonymus fortunei (Turcz.) Hand. -Mazz.

分布：北，本，四，九，琉

産地：北見；羽茂町－小泊，両津市－梅津。野田；金井町－中興，両津市－外海府。秋庭；佐和田町－真光寺山。池上・石澤；分布図（3）no.196－佐渡全域。

577 マユミ ※

Euonymus sieboldianus Bl.

分布：北，本，四，九

産地：野田；羽茂町，小木町－深浦，赤泊村，畑野町－多田～両津市－河崎。秋庭；佐和田町－真光寺山。

578 オオバマユミ

Euonymus sieboldianus var. *edoensis* Hara

分布：北，本，四，九

産地：北見；羽茂町－小泊。

579 サワダツ（アオジクマユミ）※

Euonymus melananthus Franch. et Savat.

分布：本，四，九 日本固有

産地：北見；両津市－梅津。野田；金北山，相川町－入川・大塚山。池上・石澤；分布図（3）no.197－佐渡全域。

580 ツリバナ ※

Euonymus oxyphyllus Miq.

分布：北，本，四，九

産地：北見；佐和田町－山田。野田；金北山，赤泊村，新穂村－国見山，畑野町－多田～両津市－鮑・河崎。秋庭；金井町－新保川。

エゾツリバナ var. *magnus* Honda を含む

581 ホソバマユミ

Euonymus oxyphyllus forma *stenophyllus* Hara

分布：北，本，四，九

産地：北見；両津市－浦川。

582 ヒロハツリバナ

Euonymus macropetarus Rupr.

分布：北，本（東北～中部地方，近畿地方南部，鳥取東部）

産地：北見；真野町－西三川，金井町－千種，両津市－見立。

583 イワウメヅル

Celastrus flagellaris Rupr.

分布：本（関東地方以西），四，九

- 産地：北見；両津市－梅津。
- 584 ツルウメモドキ ※
Celastrus orbiculatus Thunb.
分布：北，本，四，九，琉
産地：北見；羽茂町－小泊，両津市－梅津。野田；相川町－入川。秋庭；佐和田町－西部真光寺山。
- 585 オニツルウメモドキ ※
Celastrus orbiculatus
var. *strigillosus* (Nakai) Makino
産地：北見；相川町－大倉。野田；相川町－大倉越え。
- 586 オオツルウメモドキ
Celastrus stephanotifolius (Makino) Makino
分布：本(関東地方以西)，四，九
産地：北見；両津市－願。
- みつばうつぎ科
- 587 ミツバウツギ ※
Staphylea bumalda (Thunb.) DC.
分布：北，本，四，九
産地：北見；羽茂町－小泊，両津市－梅津，相川町－入川。野田；新穂村－国見山，真野町，佐和田町－二宮，相川町－石花・外海府。秋庭；金北山金井口。
- 588 ゴンズイ ※
Euscaphis japonica (Thunb.) Kanitz
分布：本(茨城県，富山県以南)，四，九
産地：野田；小木町－蓮華峯
- つけ科
- 589 ツゲ (アサツゲ) ※
Buxus microphylla Sieb. et Zucc.
var. *japonica* (Muell. Arg. ex Miq.)
Rehder et Wils.
分布：本(関東以西)，四，九，屋久島
産地：北見；相川町－北狄，小木町－深浦。野田；小木町－深浦，相川町－大塚山・石花・外海府。
- 590 コツゲ
Buxus microphylla forma *riparia* Makino
産地：北見；相川町－石花，両津市－笠取峠。
- 591 フッキソウ ※
Pachysandra terminalis Sieb. et Zucc.
分布：北，本，四，九
産地：北見；ドンデン。野田；金北山，佐和田町－二宮。秋庭；妙見山腹。
- くろうめもどき科
- 592 クロツバラ
Rhamnus davurica Pallas var. *nipponica* Makino
分布：本(中北部) 北方大陸系
産地：北見；両津市－藻浦。
- 593 クロウメモドキ
Rhamnus japonica Maxim. var. *decipiens* Maxim.
分布：本，四，九
産地：北見；両津市－梅津。野田；金北山，両津市－梅津・鷺崎，相川町－大塚山。秋庭；妙見山腹。
- 594 エゾノクロウメモドキ ※
Rhamnus japonica var. *japonica*
分布：北，本(日本海側鳥取県まで)
産地：野田；金北山，両津市－梅津・鷺崎，相川町－大塚山。
- 595 イソノキ ※
Rhamnus crenata Sieb. et Zucc.
分布：本，四，九
産地：北見；新穂村。野田；小木町－深浦，新穂村。秋庭；佐和田町－真光寺山。
- 596 ケンボナシ ※
Hovenia dulcis Thunb.
分布：北(奥尻島)，本，四，九
産地：北見；羽茂町－村山，相川町－石花，畑野町－猿八，両津市－鷺崎。野田；相川町－入川・石花。
- 597 ナツメ
Zizyphus jujuba Mill.
分布：中国北部 帰化植物
産地：農村の庭に古くより植栽。
- 598 ミヤマクマヤナギ
Berchemia pauciflora Maxim.
分布：本(関東，甲信地方) 比較的稀
産地：北見；畑野町－飯出山。
- 599 クマヤナギ ※
Berchemia racemosa Sieb. et Zucc.
分布：北，本，四，九
産地：北見；両津市－願，相川町－北狄。野田；金井町，佐和田町－二宮，両津市－匏・大倉越え。秋庭；佐和田町－乙和池道。
- ぶどう科
- 600 シラガブドウ
Vitis amurensis Rupr.
分布：本(岡山県) 東アジア北部
産地：野田；金北山
- 601 サンカクヅル (ギョウジャノミズ) ※
Vitis flexuosa Thunb.
分布：本，四，九，奄美大島
産地：北見；両津市－梅津・大川，佐和田町－澤根。野田；金北山。秋庭；佐和田町－乙和池下。池上・石澤；分布図(2)no.103－両津市－久知川・山居池，相川町－寒戸・大塚山，新穂村－清水寺，小木町－強清水。
- 602 ヤマブドウ ※
Vitis coignetiae Pulliat. ex Planch.
分布：北，本，四

産地：北見；ドンデン、相川町－北狄。野田；金北山、佐和田町－二宮。秋庭；妙見山腹。池上・石澤；分布図(3)no.199－相川町－後尾、佐和田町－乙和池・屋敷平、新穂村－清水寺越え、畑野町－経塚山。

603 チョウセンヤマブドウ

Vitis coignetiae var. *amurensis* Rupr.

産地：北見；佐和田町－山田。

604 エビヅル ※

Vitis thunbergii Sieb. et Zucc.

分布：本、四、九

産地：北見；両津市－梅津。野田；金井町、相川町－入川。秋庭；佐和田町－真光寺山。池上・石澤；分布図(1)no.23－両津市－願・久知川、新穂村－大野、佐和田町－河原田、金井町－中興、相川町－相川・橋・寒戸・大塚山、小木町－深浦。

605 ノブドウ ※

Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv.

分布：北、本、四、九、琉

産地：北見；両津市－梅津。野田；金井町、相川町－入川。秋庭；佐和田町－乙和池道。

606 ツタ (ナツツタ) ※

Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch.

分布：北、本、四、九

産地：北見；相川町－北狄。野田；佐和田町－河原田。

607 ヤブガラシ ※

Cayratia japonica (Thunb.) Gagn.

分布：きた (西南部)、本、四、九、琉、小笠原

産地：北見；相川町－関。野田；相川。

しなのき科

608 シナノキ ※

Tilia japonica (Miq) Simonkai

分布：北、本、九

産地：北見；相川町－入川、羽茂町－小泊。野田；真野町－西三川、金井町、アオネノ越え。秋庭；金北山頂。

609 サドシナノキ

Tilia japonica var. *latialata* Makino

分布：佐渡

産地：北見；羽茂町－小泊、相川町－北狄・達者・石名、両津市－鷺崎。

610 ボダイジュ

Tilia miqueliana Maxim.

分布：中国原産 帰化植物 社寺に植栽

産地：北見；相川町－羽田、新穂村－大野、小木町－宿根木。

611 カラスノゴマ

Corchoropsis tomentosa (Thunb.) Makino

分布：本(関東以西)、四、九

産地：野田；畑野町－松ヶ崎。

あおい科

612 イチビ ※

Abutilon theophrasti Medic.

分布：インド原産 帰化植物

産地：北見；相川町－矢柄、羽茂町－池田。野田；真野町－西三川。

613 ムクゲ

Hibiscus syriacus L.

分布：中国原産 帰化植物

産地：北見；羽茂町－小泊。

614 モミジアオイ

Hibiscus coccineus Walt.

分布：北アメリカ原産 帰化植物

産地：北見；相川町－北狄。

615 ゼニアオイ

Malva sylvestris L. var. *mauritiana* Boiss.

分布：ヨーロッパ原産 帰化植物

産地：北見；相川町－入川。

あおぎり科

616 アオギリ

Firmiana simplex (L.) W. F. Wight

分布：本(伊豆半島、紀伊半島)、四(愛媛県、高知県)、九(大隈半島)、琉

産地：北見；羽茂町－村山。

じんちょうげ科

617 ミツマタ

Edgeworthia chrysantha Lindley

分布：中国、ヒマラヤ原産 帰化植物 慶長年間に渡来

産地：北見；羽茂町－小泊。

618 オニシバリ

Daphne pseudo-mezereum A. Gray

分布：本(関東南部、東海地方東部、近畿北部)、四、九

産地：野田；金北山、二ノ岳。

619 ナニワズ ※

Daphne pseudo-mezereum

subsp. *jezoensis* (Maxim.) Hamaya

分布：北、本(福井県、福島県以北)

産地：北見；ドンデン、羽茂町－小泊。野田；畑野町－経塚山・多田。池上・石澤；分布図(3)no.200－佐渡全域。

620 カラスシキミ ※

Daphne miyabeana Makino

分布：北、本(隠岐島、鳥取大山以东の日本海側)

産地：北見；ドンデン。秋庭；佐和田町－真光寺山。

621 ジンチョウゲ

Daphne odora Thunb.

分布：中国原産 帰化植物 室町時代に渡来

産地：北見；羽茂町－小泊。

ぐみ科

- 622 アキグミ ※
Elaeagnus umbellata Thunb.
 分布：北(渡島), 本, 四, 九, 屋久島
 産地：北見；小木町-宿根木。野田；羽茂町, 金北山, 両津市-外海府。秋庭；妙見山刀根。
- 623 ナツグミ
Elaeagnus multiflora Thunb.
 分布：本(関東地方, 静岡西部)
 産地：北見；ドンデン。野田；金北山。
- 624 マメグミ
Elaeagnus montana Makino
 分布：本(関東南部~鈴鹿・伊吹山地), 四, 九
 産地：北見；相川町-石花。
- 625 オオバグミ ※
Elaeagnus macrophylla Thunb.
 分布：本(関東以西), 四, 九, 琉
 産地：北見；羽茂町-小泊。野田；小木町-宿根木・蓮華峯, 畑野町-松ヶ崎, 両津市-水津。
- 626 ツルグミ ※
Elaeagnus glabra Thunb.
 分布：本(関東以西), 四, 九, 琉
 産地：北見；羽茂町-新倉・村山, 相川町-山の神, 両津市-梅津・大川・野浦。野田；佐和田町-河原田, 畑野町, 小木町-蓮華峯, 両津市-水津。池上・石澤；分布図(3) no. 201-佐渡沿岸全域。
- 627 ウラギンツルグミ
Elaeagnus hypo-aegenteus Mats.
 分布：本(伊豆半島), 四, 九
 産地：北見；両津市-水津。
 ノート：ナワシログミとツルグミの中間型
- 628 アカバグミ (オオバツルグミ)
Elaeagnus maritima Koidz.
 分布：本(関東地方南部)
 産地：北見；相川町-大倉, 畑野町。
 ノート：ツルグミとオオバグミの雑種
- すみれ科
- 629 スミレ ※
Viola mandshurica W. Becker
 分布：北, 本, 四, 九
 産地：北見；ドンデン。野田；金北山, 赤泊村, 相川町-戸中。秋庭；佐和田町-真光寺山。
- 630 ケナシスミレ
Viola mandshurica var. *glabra* Nakai
 産地：北見；ドンデン, 羽茂町-小泊。
- 631 ヒカゲスミレ ※
Viola yezoensis Maxim.
 分布：北(西南部), 本, 四, 九
 産地：北見；佐和田町-乙和池, 相川町-戸地。池上・石澤；分布図(1) no.24-真野町-西三川。
- 632 シハイスミレ
Viola violacea Makino
 分布：本(長野県西南部以西), 四, 九
 産地：北見；ドンデン, 金井町-貝塚。野田；金北山, 大塚山。秋庭；佐和田町-真光寺山。
- 633 マキノスミレ ※
Viola violacea var. *makinoi* (H. Boiss.) Hiyama
 分布：本
 産地：野田；金北山
- 634 スミレサイシン ※
Viola vaginata Maxim.
 分布：北(西南部), 本, 日本海側
 産地：北見；羽茂町-小泊, 両津市-長江。野田；金北山, 佐和田町-乙和池, 畑野町-松ヶ崎。秋庭；佐和田町-真光寺山。
- 635 ナガバノスミレサイシン
Viola bissetii Maxim.
 分布：本(関東以西, 太平洋側), 四, 九
 産地：北見；両津市-羽黒。
- 636 アオイスミレ ※
Viola hondoensis W. Becker et H. Boiss.
 分布：本, 四, 九
 産地：北見；両津市-梅津。野田；両津市-梅津。
- 637 オオタチツボスミレ ※
Viola kusanoana Makino
 分布：北, 本(日本海側), 九(北部)
 産地：北見；佐和田町-二宮(真保一輔)。野田；金北山, 経塚山。
- 638 ナガハシスミレ ※
Viola rostrata Prush
 var. *japonica* (W. Becker et H. Boiss.) Ohwi
 分布：本(北部~鳥取県) 日本海側
 産地：北見；ドンデン, 羽茂町-村山。野田；金北山。
- 639 テリハタチツボスミレ ※
Viola faurieana W. Becker
 分布：本(北部) 日本海側
 産地：北見；羽茂町-村山。池上・石澤；分布図(2) no. 104-金井町-中興ムロ山。
- 640 タチツボスミレ ※
Viola grypoceras A. Gray
 分布：北, 本, 四, 九, 琉
 産地：北見；ドンデン, 両津市-笠取峠。野田；佐渡。
- 641 ニオイタチツボスミレ
Viola obtusa (Makino) Makino
 分布：北(西南部), 本, 四, 九
 産地：北見；羽茂町-村山。野田；両津市-梅津。
- 642 ツボスミ(ニョイスミレ) ※
Viola verecunda A. Gray
 分布：北, 本, 四, 九
 産地：北見；ドンデン。野田；佐渡。秋庭；佐和田町-真光寺山。

643 イブキスマシレ

Viola mirabilis L. var. *subglabra* Ledeb.

分布：本

産地：北見；両津（真保一輔）

きぶし科

644 キブシ ※

Stachyurus praecox Sieb. et Zucc.

分布：北（西南部），本，四，九，小笠原

産地：北見；両津市－梅津，羽茂町－小泊。野田；相川町－戸中。秋庭；金北山。

ぎょりゅう科

645 ギョリュウ ※

Tamarix tenuissima Nakai

分布：中国原産 帰化植物

産地：北見；小木町

みそはこべ科

646 ミソハコベ ※

Elatine triandra Schk.

分布：本，四，九，琉

産地：水田土上

うり科

647 キカラスウリ ※

Trichosanthes kirilowii Maxim.var. *japonica* (Miq.) Kitam.

分布：北（奥尻島），本，四，九，奄美大島

産地：北見；相川町－入川，両津市－梅津。野田；佐和田町－河原田，新穂村，相川町－相川・石名。

648 カラスウリ（タマズサ）

Trichosanthes cucumeroides (Ser.) Maxim.

分布：本（東北南部以南），四，九

北見；相川町－入川，両津市－梅津。

649 アマチャヅル ※

Gynostemma pentaphylla (Thunb.) Makino

分布：北，本，四，九，琉

産地：北見；両津市－白瀬，羽茂町－小泊。野田；金井町－大和田。

650 スズメウリ ※

Melothria japonica (Thunb. ex Cogn.) Maxim.

分布：本，四，九

産地：野田；相川町

651 ゴキヅル ※

Actinostemma lobatum Maxim. ex Franch. et Savat.

分布：本，四，九

産地：北見；相川町－石名・大倉。野田；相川町－大倉。

みそはぎ科

652 サルスベリ

Lagerstroemia indica L.

分布：中国原産 帰化植物

産地：北見；羽茂町－村山。

653 キカシグサ ※

Rotala indica (Willd.) Koehnevar. *uliginosa* (Miq.) Koehne

分布：北，本，四，九，琉

産地：北見；羽茂町－小泊。野田；金井町，両津市－内海府。

654 ヒメミソハギ

Ammannia multiflora Roxb.

分布：本，四，九，琉

産地：北見；両津市－梅津。

655 エゾミソハギ ※

Lythrum salicaria L.

分布：北，本，四，九

産地：北見；羽茂町－小泊，大佐渡地域。野田；相川町－入川・石花。秋庭；相川町－後尾浜。

656 ミソハギ

Lythrum anceps (Koehne) Makino

分布：北，本，四，九

産地：北見；相川町－鹿野浦，小佐渡地域。野田；赤泊村，畑野町－松ヶ崎，相川町－相川・戸中・片辺，佐和田町－乙和池。秋庭；相川町－片辺。

ひし科

657 ヒシ ※

Trapa japonica Flerov

分布：北，本，四，九

産地：北見；相川町－山の神。

658 ヒメビシ

Trapa incisa Sieb. et Zucc.

分布：北，本，四，九

産地：北見；新穂村－田野澤。野田；両津市－水津～河崎，新穂村。

あかばな科

659 オオアカバナ（フヨウアカバナ）※

Epilobium hirsutum L.

分布：本（福島県，佐渡）

産地：北見；相川町，両津市。秋庭；相川町－川内海岸。
ノート：フヨウアカバナ…秋庭の採集品について牧野富太郎博士が付した仮名

660 イワアカバナ

Epilobium cephalostigma Hausskn.

分布：北，本，四，九

産地：北見；佐和田町－乙和池浮島，ドンデン。

661 アカバナ ※

Epilobium pyrricholophum Franch. et Savat.

- 分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；羽茂町-村山。野田；小木町-蓮華峯, 畑野町-松ヶ崎・多田, 相川町-金北山小川口・戸中, 両津市-内海府。秋庭；妙見山腹。
- 662 ヒメアカバナ ※
Epilobium fauriei Lévl.
分布：北, 本(伯耆大山まで)
産地：北見；金北山。野田；金北山。秋庭；妙見山刀根。
- 663 チョウジタデ ※
Ludwigia epilobioides Maxim.
分布：北, 本, 四, 九, 琉
産地：北見；佐和田町-山田。野田；両津市-梅津・鷺崎, 佐和田町-二宮。
- 664 ミズユキノシタ ※
Ludwigia ovalis Miq.
分布：本, 四, 九, 琉
産地：両津市-馬首(上の平 池沼)。
- 665 マツヨイグサ
Oenothera stricta Ledeb.
分布：南アメリカ チリ原産 帰化植物
産地：北見；佐和田町-河原田。秋庭；佐和田町-河原田海岸。
- 666 オオマツヨイグサ ※
Oenothera erythrosepala Borbas
分布：北, 本, 四, 九 帰化植物 明治初期に渡来
産地：北見；羽茂町-村山。秋庭；佐和田町-河原田海岸。
- 667 メマツヨイグサ (アレチマツヨイグサ) ※
Oenothera biennis L.
分布：日本各地 北アメリカ原産 帰化植物
産地：北見；羽茂町-亀脇, 真野町-新町。
- 668 ミヤマタニタデ ※
Circaea alpina L.
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；相川町-入川。野田；アオネバ越え。
- 669 ウシタキソウ ※
Circaea cordata Royle
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；ドンデン。野田；アオネバ越え, 赤泊村。
- 670 ミズタマソウ ※
Circaea mollis Sieb. et Zucc.
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；ドンデン, 両津市-両津・真更川。笠取り峠・大川, 羽茂町-小泊。野田；金北山, 相川町-戸中, 赤泊村。

ありのとうぐさ科

- 671 アリノトウグサ ※
Haloragis micrantha (Thunb.) R. Br.
分布：日本全土
産地：北見；羽茂町-小泊。野田；金北山, 妙見山。秋

- 庭；佐和田町-真光寺山。
- 672 ホザキノフサモ (キンギヨモ)
Myriophyllum spicatum L.
分布：北, 本, 四, 九, 琉
産地：野田；金井町-中興・国府川。
- 673 フサモ
Myriophyllum verticillatum L.
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；金井町-中興。

やまとぐさ科

- 674 ヤマトグサ ※
Theligonum japonicum Okubo et Makino
分布：本(関東以西), 四, 九 日本特産
産地：北見；相川町-相川・南片辺船山。野田；金北山, アオネバ越え, 両津市-梅津, 相川町-小田・片辺, 真野町, 畑野町, 赤泊村-下川茂。秋庭；佐和田町-乙和池下。池上・石澤；分布図(3)no.203-新潟県内佐渡のみ。

うりのき科

- 675 ウリノキ ※
Alangium platanifolium (Sieb. et Zucc.) Harms
var. *trilobum* (Miq.) Ohwi
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；相川町-高下, 両津市-羽黒, 畑野町-後山。野田；佐和田町-二宮, 相川町-石花, 小木町-深浦。

みずき科

- 676 ハナイカダ ※
Helwingia japonica (Thunb.) F. G. Dicitrich
分布：北(南部), 本, 四, 九
産地：北見；相川町-戸地・寒戸, 羽茂町-小泊, 両津市-椿・大川・野浦。野田；両津市-岩首・蛇, 新穂村-国見山, 金北山。秋庭；金北山金井口。池上・石澤；分布図(2)no.105-佐渡全域。

- 677 アオキ
Aucuba japonica Thunb.
分布：本(中国地方を除く), 四(東部)
産地：北見；両津市。野田；金北山。

- 678 ヒメアオキ ※
Aucuba japonica var. *borealis* Miyabe et Kudo
分布：北, 本 日本海側型気候の多雪地帯
産地：北見；羽茂町-小泊。野田；畑野町-飯出山。

- 679 クマノミズキ ※
Swida macrophylla (wall.) Sojak
分布：本, 四, 九, 屋久島
産地：北見；羽茂町-村山。野田；相川町-大倉・川内。秋庭；佐和田町-真光寺山。池上・石澤；分布図(1)no.25-両津市-山居池・豊岡・片野尾・久知

- 川・杉池, 相川町-大塚山・達者, 金井町-中興・上野口, 畑野町-畑野・経塚山, 小木町-城山。
- 680 ミズキ ※
Swida controversa (Hemsl.) Sojak
分布: 北, 本, 四, 九
産地: 北見; 相川町-大倉。野田; 両津市-砲。秋庭; 妙見山腹。
- 681 ヤマボウシ ※
Benthamidia japonica (Sieb. et Zucc.) Hara
分布: 本, 四, 九 (屋久島), 琉
産地: 北見; 羽茂町-村山, 佐和田町-沢根紅葉山, 両津市-長江, 新穂村-大野。秋庭; 佐和田町-真光寺山。池上・石澤; 分布図(3)-佐和田町-真光寺山, 真野町-西三川・経塚山。
- 682 アメリカヤマボウシ (ハナミズキ)
Benthamidia florida (L.) Spach
分布: 北アメリカ原産 帰化植物
産地: 各地で庭園, 公園, 街路樹に植栽。
- 683 ゴゼンタチバナ ※
Chamaepericlymenum canadense (L.) Aschers. et Graebn.
分布: 北, 本(中部以北, 奈良県, 愛知県)
産地: 北見; 金北山
- うこぎ科
- 684 タラノキ ※
Aralia elata (Miq.) Seemann
分布: 北, 本, 四, 九
産地: 北見; 相川町-入川, 両津市-梅津。野田; 相川。
- 685 キツタ ※
Hedera rhombea (Miq.) Bean
分布: 北(南部), 本, 四, 九, 琉
産地: 北見; 羽茂町-小泊, 両津市-梅津, 相川町-矢柄。池上・石澤; 分布図(3)no.205-佐渡全域。
- 686 ヤツデ ※
Fatsia japonica (Thunb.) Decne. et Planch.
分布: 本(茨城県以南), 四(太平洋側)
産地: 北見; 羽茂町-小泊。
- 687 ヒメウコギ
Acanthopanax sieboldianus Makino
分布: 中国原産 帰化植物
産地: 野田; 小木町-深浦。
- 688 ヤマウコギ (ウコギ) ※
Acanthopanax spinosus (L. fil.) Miq.
分布: 本(岩手県以南)
産地: 北見; 羽茂町-小泊, 両津市-梅津。野田; 両津市-梅津。秋庭; 佐和田町-乙和池道。
- 689 オカウコギ
Acanthopanax japonicus Franch. et Savat.
分布: 本(関東南部, 東海, 紀伊半島)
産地: 北見; 両津市-梅津, 金井町-中興。

- 690 エゾウコギ
Acanthopanax senticosus (Rupr. et Maxim.) Harms
分布: 北
産地: 北見; 羽茂町-小泊, 両津市-北五十里・水津。野田; 畑野町-後山。
- 691 ケヤマウコギ (オニウコギ) ※
Acanthopanax divaricatus (Sieb. et Zucc.) Seem.
分布: 北, 本, 四, 九
産地: 北見; 相川町-入川。野田; 相川町-金北山小川口・川内, 経塚山。
- 692 コシアブラ ※
Acanthopanax sciadophylloides Franch. et Savat.
分布: 北, 本, 四, 九
産地: 北見; 両津市-梅津, 畑野町-後山, 羽茂町-小泊。野田; 両津市-加茂。秋庭; 金北山新保口。
- 693 タカノツメ (イモノキ) ※
Evodiopanax innovans (Sieb. et Zucc.) Nakai
分布: 北, 本, 四, 九
産地: 北見; 佐和田町-山田, 畑野町-飯出山。野田; 畑野町-飯出山, 佐和田町-山田。
- 694 ハリギリ (センノキ) ※
Kalopanax pictus (Thunb.) Nakai
分布: 北, 本, 四, 九
産地: 北見; 両津市-梅津, 羽茂町-小泊。野田; 相川町-大塚山・戸中。秋庭; 佐和田町-真光寺山。
- 695 ウド ※
Aralia cordata Thunb.
分布: 北, 本, 四, 九
産地: 北見; 羽茂町-小泊, 相川町-関, 両津市-野浦。
- 696 トチバニンジン (チクセツニンジン) ※
Panax japonicus C. A. Meyer
分布: 北, 本, 四, 九
産地: 北見; ドンデン, 両津市-両尾越え, 畑野町-大地山。野田; 金井町, 佐和田町-二宮, 相川町。秋庭; 佐和田町-乙和池下。
- せり科
- 697 チドメグサ
Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
分布: 本, 四, 九, 琉
産地: 北見; 相川町-入川, 両津市-梅津。
- 698 ノチドメ ※
Hydrocotyle maritima Honda
分布: 本, 四, 九, 琉, 小笠原
産地: 北見; 相川町-入川, 両津市-梅津。野田; 金北山, 両津市, 相川町-入川。
- 699 オオチドメ (ヤマチドメ) ※
Hydrocotyle ramiflora Maxim.
分布: 北, 本, 四, 九
産地: 北見; 羽茂町-小泊, ドンデン。野田; 小木町-宿根木。秋庭; 佐和田町-乙和池下。

- 700 ツボクサ ※
Centella asiatica (L.) Urban
分布：本(関東地方以西), 四, 九, 琉, 小笠原
産地：北見；羽茂町-亀脇, 相川町-小川, 野田；小木町。
- 701 ウマノミツバ ※
Sanicula chinensis Bunge
分布：日本全土
産地：北見；両津市-梅津・米竈, 野田；両津市-加茂, 秋庭；佐和田町-乙和池下。
- 702 ヤブジラミ ※
Torilis japonica (Houtt.) DC.
分布：日本全土
産地：北見；羽茂町-小泊, 野田；金井町, 国府川。
- 703 オヤブジラミ ※
Torilis scabra (Thunb.) DC.
分布：本, 四, 九, 琉
産地：北見；羽茂町-小泊, 野田；新穂村, 秋庭；佐和田町-河原田。
- 704 ノラニンジン ※
Daucus carota L.
分布：ヨーロッパ原産 ニンジンの逸出
産地：北見；相川町-入川, 秋庭；相川町-稲鯨海岸。
- 705 シャク ※
Anthriscus aemula Schischkin
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；羽茂町-小泊。
- 706 ヤブニンジン ※
Osmorhiza aristata (Thunb.) Rydb.
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；羽茂町-小泊, 秋庭；佐和田町-真光寺山。
- 707 オオカサモチ (オニカサモチ) ※
Pleurospermum camtschaticum Hoffm.
分布：北, 本(中部以北)
産地：北見；相川町-入川(真保一輔), 野田；相川町-入川。
- 708 ホタルサイコ ※
Bupleurum longeradiatum Turcz.
subsp. *sachalinense* (Fr. Schm.) Kitag.
var. *elatus* Kitag.
分布：本, 四, 九
産地：北見；羽茂町-小泊, 野田；アオネバ越え。
- 709 ミツバ ※
Cryptotaenia japonica Hassk.
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；相川町-後尾, 両津市-羽島-両尾越え, 野田；両津市-加茂, 畑野町-経塚山, 佐和田町-河原田。
- 710 セリ ※
Oenanthe javanica DC.
分布：日本全土
- 産地：北見；相川町-矢柄, 羽茂町-小泊, 野田；金井町。
- 711 セントウソウ ※
Chamaele decumbens (Thunb.) Makino
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；相川町-大倉・跳坂, 両津市-藻浦, 野田；両津市-梅津, 池上・石澤；分布図(1) no.26-両津市-北松ヶ崎・東強清水・山居池, 新穂村-生え椿, 赤泊村-外山, 真野町-竹田ダム・西三川, 畑野町-多田・小倉峠・河内。
- 712 ムカゴニンジン ※
Sium ninsi L.
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；金井町-吉井, 野田；金北山, 金井町。
- 713 ヌマゼリ (サワゼリ) ※
Sium suave Walter
subsp. *nipponicum* (Makino) Sugimoto
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；赤泊村-下川茂(真保一輔)。
- 714 ハマゼリ ※
Cnidium japonicum Miq.
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；相川町-北狄, 両津市-真更川・顯・水津, 野田；小木町-蓮華峯。
- 715 イブキボウフウ
Libanotis coreana (Wolff.) Kitag.
分布：北, 本(近畿以東)
産地：北見；相川町-北狄, 野田；小木町-蓮華峯, 真野町-西三川, 相川町-戸中・入川・片辺・石花。
- 716 ハマイブキボウフウ (ヒロハノイブキボウフウ) ※
Libanotis coreana forma *ugoensis* Kitag.
分布：北, 本(近畿以東)
産地：秋庭；相川町-後尾。
- 717 イブキゼリモドキ ※
Tilingia holopetala (Maxim.) Kitag.
分布：北, 本(中部以北) 日本特産
産地：北見；金北山, 二の岳(真保一輔), 野田；金北山。
- 718 ハマボウフウ ※
Glehnia littoralis Fr. Schm. ex Miq.
分布：北, 本, 四, 九, 琉
産地：北見；羽茂町-素浜, 佐和田町-河原田海岸, 野田；真野町-西三川・素浜, 秋庭；佐和田町-河原田海岸。
- 719 セリモドキ (タニセリモドキ) ※
Dystaenia ibukiensis (Yabe) Kitag.
分布：本(関東以西), 四, 九 日本海側 日本特産
産地：北見；佐和田町(真保一輔), 野田；佐和田町-二宮。
- 720 ノダケ ※
Angelica decursiva (Miq.) Franch. et Savat.
分布：本(関東以西), 四, 九

- 産地：北見；金北山。野田；金北山，畑野町－経塚山。
秋庭；佐和田町－乙和池下。
- 721 シシウド (ウドタラシ)
Angelica pubescens Maxim.
分布：本，四，九 日本特産
産地：北見；相川町－入川。秋庭；佐和田町－乙和池下。
- 722 ミヤマシシウド
Angelica matsumurayae Yabe
分布：本(深山)
産地：北見；相川，両津(真保一輔)。
- 723 ミチノクヨロイグサ ※
Angelica sachalinensis Maxim.
var. *glabra* (Koidz.) Yamazaki
分布：本(東北地方～北陸地方の日本海側)
ノート：この地帯で従来 シシウド，ミヤマシシウドと
したものは本種という
- 724 エゾニユウ
Angelica ursina (Rupr.) Maxim.
分布：北，本(中部以北)
産地：北見；相川町－北狄。野田；金北山。秋庭；佐和田町－真光寺山。
- 725 オオバセンキュウ ※
Angelica genuflexa Nuttall
分布：北，本(中部以北)
産地：北見；両津市－鷺崎。
- 726 アマニユウ ※
Angelica edulis Miyabe ex Yabe
分布：北，本(中部以北)，伯耆大山，四(石鎚山)
産地：北見；相川町－鹿野浦。野田；佐和田町－二宮。
池上・石澤；分布図(2) no. 106－両津市－山居池・
杉池・豊岡，相川町－寒戸，佐和田町－乙和池，新
穂村－清水平，畑野町－経塚山・小倉。
- 727 シラネセンキュウ (スズカゼリ) ※
Angelica polymorpha Maxim.
分布：本，四，九
産地：北見；両津市－鷺崎。
- 728 トウキ ※
Angelica acutiloba (Sieb. et Zucc.) Kitag.
分布：本(中北部)
産地：北見；相川町－入川。野田；金北山，相川町－入
川。秋庭；佐和田町－二の岳。
- 729 ミヤマトウキ (イワテトウキ)
Angelica acutiloba
subsp. *iwatensis* (Kitag.) Kitag.
分布：北，本(東北地方)
産地：大佐渡山脈尾根 小葉の幅が広い。
- 730 ヤマゼリ
Ostericum sieboldii (Miq.) Nakai
分布：本，四，九
産地：北見；相川(真保一輔)

- 731 ボタンボウフウ
Peucedanum japonicum Thunb.
分布：本(中部)，四，九，琉
産地：北見；相川町－小田，両津市－鷺崎。
- 732 カワラボウフウ
Peucedanum terebinthaceum Fisch.
分布：北，本，四，九
産地：野田；両津市－鷺崎。
- 733 ハナウド
Heracleum nipponicum Kitag.
分布：本(関東以西)，四，九
産地：北見；相川町－石花。野田；金北山。
- 734 オオハナウド ※
Heracleum dulce Fisch.
分布：北，本(近畿以北)
産地：池上・石澤；分布図(3) no. 206－両津市－願・大野
亀・藻浦，相川町－北片辺・寒戸・戸地・関(大
佐渡北西海岸沿い)。

双子葉植物 合弁花類

いろうめ科

- 735 イワカガミ
Schizocodon soldanelloides Sieb. et Zucc.
分布：北，本，四，九
産地：野田；佐渡
- 736 オオイワカガミ ※
Schizocodon soldanelloides
var. *magnus* (Makino) Hara
分布：北(南部)，本(東北地方，中部地方の日本海側)
産地：北見；ドンデン。野田；金北山，畑野町－多田。秋
庭；佐和田－真光寺山。
ノート：*シロバナオオイワカガミ *forma niveus* Hara
産地：北見；両津市－梅津，畑野町－飯出山。

りょうぶ科

- 737 リョウブ ※
Clethra barvinervis Sieb. et Zucc.
分布：北(南部)，本，四，九
産地：北見；ドンデン。野田；金井町，二の岳，大塚山。
秋庭；金北山金井口。
- 738 チャボリョウブ
Clethra barvinervis var. *storonofera* Honda
産地：北見；相川町－大倉。

いちやくそう科

- 739 コバノイチヤクソウ
Pyrola alpina H. Andres
分布：北，本(中部以北)
産地：北見；相川町－南片辺船山。野田；相川町－高千。

740 マルバナイチヤクソウ ※
Pyrola nephrophylla (H. Andres) H. Andres
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；妙見山。野田；金北山, 畑野町-飯出山。
秋庭；相川町-片辺越。

741 ジンヨウイチヤクソウ
Pylora renifolia Maxim.
分布：北, 本(中部以北)
産地：北見；相川町-関。

742 イチヤクソウ ※
Pylora japonica Klentze
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；羽茂町-亀脇。野田；金北山, 大塚山, 佐和田町-乙和池, 畑野町-飯出山・多田。秋庭；佐和田-真光寺山。

743 ベニバナイチヤクソウ ※
Pylora incarnata Fischer
分布：北, 本(中部以北)
産地：北見；相川町-大倉。

744 ウメガサソウ ※
Chimaphila japonica Miq.
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；金北山, ドンデン, 相川町-関。野田；金北山, 相川町-大塚山・片辺, 両津市-真更川。秋庭；金北山金井口。

745 ギンリョウソウ ※
Monotropastrum humile (D. Don) Hara
分布：北, 本, 四, 九, 琉
産地：北見；両津市-梅津。野田；金井町。秋庭；佐和田-乙和池上。
ノート：*ベニバナギンリョウソウ forma *roseum* Honda 北見；両津市-五月雨山・和木。

746 シャクジョウソウ ※
Monotropa hypopitys L.
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；羽茂町-亀脇。野田；畑野町-多田, 妙見山(三本槽)。秋庭；金北山金井口。

747 ギンリョウソウモドキ (アキノギンリョウソウ) ※
Monotropa uniflora L.
分布：本, 四, 九
産地：北見；ドンデン, 両津市-梅津。

つつじ科

748 ミヤマホツツジ
Cladothamnus bracteatus (Maxim.) Yamazaki
分布：北, 本(北中部) 亜高山~高山帯
産地：野田；金北山

749 ホツツジ ※
Elliottia paniculata (Sieb. et Zucc.) Benth. et Hook.
分布：北(南部), 本, 四, 九
産地：北見；ドンデン。野田；金北山。秋庭；妙見山。

750 シロバナホツツジ
Elliottia paniculata forma *albiflora* Y. Kimura
産地：北見；両津市-梅津, 畑野町-大地山。

751 ウラジロヨウラク ※
Menziesia multiflora Maxim.
分布：本(関東地方, 中部地方中南部, 東北地方)
産地：北見；ドンデン。野田；佐渡。池上・石澤；分布図(3) no. 208-大塚山, 佐和田-乙和池。

752 ガクウラジロヨウラク ※
Menziesia multiflora var. *longicylix* Kitam.
分布：北(南部), 本(東北地方, 中部地方)
産地：秋庭；佐和田-真光寺山。池上・石澤；分布図(2) no. 109-妙見山, ドンデン, アオネバ越え。
ノート：佐渡にはこのvar. が多い

753 オオコメツツジ ※
Rhododendron tschonoskii Maxim.
var. *trinerve* (Franch. ex Boissier) Makino
分布：本(山形県~滋賀県) 日本海側
産地：野田；畑野町-多田・松ヶ崎・飯出山。

754 レンゲツツジ ※
Rhododendron japonicum (A. Gray) Suringar
分布：本, 四, 九
産地：北見；ドンデン。野田；金北山。秋庭；佐和田-真光寺山。

755 ムラサキヤシオツツジ ※
Rhododendron albrechtii Maxim.
分布：北, 本(中北部)
産地：北見；金北山, 相川町-船山。野田；金北山。

756 ハクサンシャクナゲ ※
Rhododendron brachycarpum G. Don
分布：北, 本(中北部), 四(亜高山)
産地：野田；金北山。秋庭；佐和田-真光寺山。

757 アズマシャクナゲ
Rhododendron degronianum Carriere
分布：本(東北地方~宮城県, 山形県以南)
産地：北見；金北山。野田；金北山(シャクナゲ var. *pentamerum*)。

758 シロバナアズマシャクナゲ
Rhododendron degronianum Carriere
forma *leucanthum* Hara
産地：北見；ドンデン, 佐和田-乙和池。

759 ツガザクラ
Phyllodoce nipponica Makino
分布：本(東北中部~伯耆大山), 四
産地：北見；相川町。秋庭；妙見山山頂。

760 イワナシ ※
Epigaea asiatica Maxim.
分布：北(西南部), 本(日本海側)
産地：北見；畑野町-経塚山, 猿八, 両津市-下久知・両尾越え。野田；佐渡。秋庭；妙見山山頂。池上・石澤；分布図(1) no. 27-両津市-久知河内, 畑野町

-栗野江・城ヶ平・加茂神社・長谷, 佐和田-真光寺。

761 サラサドウダン

Enkianthus campanulatus (Miq.) Nicholson

分布: 北(西南部), 本(兵庫県以東), 四

産地: 北見; ドンデン

762 ハナヒリノキ ※

Leucothoe grayana Maxim.

分布: 北, 本(東北地方~近畿地方)

産地: 北見; 佐和田-乙和池。野田; 佐渡。

763 ウラジロハナヒリノキ(コシノハナヒリノキ) ※

Leucothoe grayana var. *hypoleuca* Nakai

分布: 本(山形県~鳥取県大山) 日本海側

産地: 北見; 金北山。野田; 金北山。秋庭; 佐和田-真光寺山。

764 ヒロハハナヒリノキ(エゾウラジロハナヒリノキ)

Leucothoe grayana var. *glabra* Komatsu

分布: 北, 本(山形県, 宮城県以北)

産地: 野田; 金北山

765 アセビ ※

Pieris japonica (Thunb.) D. Don

分布: 本(宮城県以南, 関東地方, 中部地方)

産地: 北見; 羽茂町-村山。植栽

766 ナツハゼ ※

Vaccinium oldhamii Miq.

分布: 北, 本, 四, 九

産地: 北見; ドンデン, 両津市-真木・野浦, 畑野町-後山。野田; 佐和田-二宮, 相川町-戸中。秋庭; 佐和田-真光寺山。

767 オオバスノキ

Vaccinium smallii A. Gray

分布: 北, 本(東北地方, 中部地方中北部と近畿・中国の日本海側)

産地: 野田; 畑野町-多田。

768 ウスノキ(カクミノスノキ) ※

Vaccinium hirtum Thunb.

var. *pubescens* (Koidz.) Yamazaki

分布: 北, 本(日本海側), 四(中北部)

産地: 北見; 金北山, 金井町-大和・安養寺, 佐和田-石田・青野峠。野田; 金北山。秋庭; 佐和田-真光寺山。

769 アクシバ ※

Vaccinium japonicum Miq.

分布: 北, 本(中部地方北東部, 関東以北)

産地: 北見; 羽茂町-小泊。野田; 金北山, 両津市-岩首。秋庭; 佐和田-真光寺山。

やぶこうじ科

770 ヤブコウジ ※

Ardisia japonica (Thunb.) Blume

分布: 北(奥尻島), 本, 四, 九

産地: 北見; 相川町-北狄。野田; 金北山, 赤泊村-下川茂, 両津市-真更川。秋庭; 佐和田-西部真光寺山。

771 カラタチバナ ※

Ardisia crispa (Thunb) DC.

分布: 本(茨城県, 新潟県以西), 四, 九

産地: 北見; 羽茂町-飯岡。池上・石澤; 分布図(2) no. 406-両津市-北小浦(分布の北限)。

さくらそう科

772 クサレダマ ※

Lysimachia vulgaris L.

var. *davurica* (Ledeb.) R. Kunth

分布: 北, 本, 九

産地: 北見; 畑野町-坊ヶ浦。野田; 金井町-大和田。

773 ヒロハクサレダマ

Lysimachia vulgaris

var. *davurica* forma *latifolia* Hara

産地: 北見; 金井町-千種。野田; 両津市-梅津, 金井町, 畑野町。

774 コナスビ ※

Lysimachia japonica Thunb.

分布: 北, 本, 四, 九, 琉

産地: 北見; ドンデン。野田; 金北山。秋庭; 佐和田-乙和池。

775 ハマボッサ ※

Lysimachia mauritiana Lam.

分布: 北, 本, 四, 九, 琉

産地: 北見; 相川町-北河内, 両津市-願・水津, 小木町-宿根木。野田; 相川町-達者, 両津市-鮑, 真野町-新町。秋庭; 相川町-後尾。池上・石澤; 分布図(1) no. 28-両津市-大野亀, 相川町-橋・大浦, 小木町-白木・深浦。

776 ギンレイカ(ミヤマタゴボウ) ※

Lysimachia acroadenia Maxim.

分布: 本, 四, 九

産地: 北見; ドンデン, 相川町-入川。野田; 相川町-石名。池上・石澤; 分布図(3) NO. 213-両津市-願・真更川・山居池。

777 ヌマトラノオ ※

Lysimachia fortunei Maxim.

分布: 本, 四, 九

産地: 北見; 金井町-千種, 真野町-金丸。野田; 金井町-大和田。

778 オカトラノオ ※

Lysimachia clethroides Duby

分布: 北, 本, 四, 九

産地: 北見; 羽茂町-小泊, 両津市-梅津。野田; 金井町, 両津市-梅津。秋庭; 佐和田-真光寺山。池上・石澤; 分布図(3) no. 214-佐渡全域。

779 ウミミドリ (シオマツバ) ※
Glaux maritima L. var. *obtusifolia* Fern.
分布: 北, 本 (北部) 海岸生
産地: 北見; 相川町-高瀬・後尾・北河内, 両津市-願・水津。野田; 相川町-入川。秋庭; 相川町-橋海岸。

780 オオサクラソウ ※
Primura jesoana Miq.
分布: 北 (西南部), 本 (中部以北) 亜高山帯
産地: 北見; 相川町-関越え。野田; 相川町-高千。池上・石澤; 分布図 (2) no.110-相川町-関越え。

781 ハイハマボス (ヒメボス) ※
Samolus parviflorus Rafin.
分布: 北, 本
産地: 北見; ドンデン, 両津市-真更川・笠取り峠・両尾越え。野田; 金北山, ドンデン。秋庭; 相川町-片辺越え・大塚山。池上・石澤; 分布図 (2) no.111-両津市-大倉越え・アオネバ越え・北小浦。

かきのき科

782 カキノキ ※
Diospyros kaki Thunb.
分布: 本 (西部), 四, 九
産地: 野田; 畑野町-松ヶ崎, 赤泊村, 金井町-中興ノート: 古くから農家の庭先にいろいろな種類の柿の木が植えてあった

783 リュウキュウマメガキ (シナノガキ)
Diospyros japonica Sieb. et Zucc.
分布: 本 (関東地方以西), 四, 九, 琉
産地: 北見; 相川町-関。佐渡では“メメガキ”という。

えごのき科

784 エゴノキ (ロクロギ, チシャノキ) ※
Styrax japonica Sieb. et Zucc.
分布: 北, 本, 四, 九, 琉
産地: 北見; 相川町-山の神。野田; 金北山, 両津市-梅津。秋庭; 佐和田-真光寺山。

はいのき科

785 タンナサワフタギ ※
Symplocos coreana (Lev.) Ohwi
分布: 本 (関東地方以西), 四, 九
産地: 北見; 佐和田-山田。野田; 畑野町-多田・飯出山・松ヶ崎, 赤泊村, 相川町-金北山小川口・天狗塚山。秋庭; 佐和田-真光寺山。池上・石澤; 分布図 (3) no.215-佐渡全域 (県南と佐渡に分布)。

786 サワフタギ ※
Symplocos chinensis (Lour.) Druel
var. *leucocarpa* (Nakai) Ohwi
forma *pilosa* (Nakai) Ohwi

分布: 北, 本, 四, 九
産地: 北見; ドンデン。野田; 金北山, 大塚山, 畑野町, 金井町-新保川上流。

787 クロミノニシゴリ
Symplocos paniculata (Thunb.) Miq.
分布: 本 (中部地方以西) 比較的稀
産地: 北見; ドンデン。野田; 金北山, 両津市-梅津, 真野町-西三川。

もくせい科

788 ヤチダモ ※
Fraxinus mandshurica Rupr. var. *japonica* Maxim.
分布: 北, 本
産地: 北見; 羽茂町-村山, 両津市-梅津。

789 アオダモ (コバノトネリコ) ※
Fraxinus lanuginosa Koidz.
forma *serrata* (Nakai) Murata
分布: 北, 本, 四, 九
産地: 秋庭; 佐和田町-真光寺山。

790 コバシジノキ
Fraxinus sambucina (Blume) Koidz.
分布: 本, 四
産地: 北見; 相川町-南片辺船山。

791 マルバアオダモ ※
Fraxinus sieboldiana Blume
分布: 北, 本, 四, 九
産地: 北見; 羽茂町-小泊。野田; 金北山, 佐和田町-二宮, 新穂村-国見山。

792 コガネアオダモ
Fraxinus sieboldiana var. *angustata* Blume
産地: 北見; 両津市-願。

793 トネリコ
Fraxinus japonica Bl.
分布: 本 (中部以北)
産地: 野田; 佐和田町-乙和池。

794 ヤマトアオダモ ※
Fraxinus longicuspis Sieb. et Zucc.
分布: 本, 四, 九
産地: 北見; 相川町-大倉。野田; 両津市-梅津, 相川町-石花。

795 ツクシトネリコ (ヒロハアオダモ, ウラギネトネリコ)
Fraxinus longicuspis var. *latifolia* Nakai
分布: 本, 四, 九
産地: 北見; 両津市-梅津。

796 レンギョウ
Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl
分布: 中国原産 帰化植物
産地: 北見; 羽茂町-小泊。

797 シナレンギョウ
Forsythia viridissima Lindl.
分布: 中国原産 帰化植物

- 産地：各地で植栽
- 798 ハシドイ ※
Syringa reticulata (Bl.) Hara
 分布：北, 本, 四, 九
 産地：北見；両津市－梅津, 相川町－入川・姫ヶ平。野田；相川町－入川。秋庭；相川町－入川上流。池上・石澤；分布図 (2) p. 406－相川町－後尾。
- 799 オウバイ
Jasminum nudiflorum Lindl.
 分布：中国原産 帰化植物
 産地：栽培
- 800 キソケイ
Jasminum humile L. var. *revolutum* (Sims) Stokes
 分布：ヒマラヤ原産 帰化植物
 産地：庭園植栽
- 801 ヒイラギ
Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green
 分布：本 (関東地方以西), 四, 九, 琉
 産地：北見；羽茂町－小泊。
- 802 キンモクセイ
Osmanthus fragrans Lour. var. *aurantiacus* Makino
 分布：中国原産
 産地：庭園植栽
- 803 ギンモクセイ
Osmanthus fragrans var. *fragrans*
 分布：中国原産
 産地：北見；羽茂町－小泊。植栽
- 804 ネズミモチ(タマツバキ)
Ligustrum japonicum Thunb.
 分布：本, 四, 九, 琉
 産地：庭園植栽
- 805 オオバイボタ
Ligustrum ovalifolium Hassk.
 分布：本, 四, 九
 産地：北見；相川町－小田, 両津市－馬首。秋庭；佐和田町－河原田植栽。
- 806 ミヤマイボタ ※
Ligustrum tschonoskii Decne.
 分布：北, 本, 四, 九
 産地：北見；相川町－南片辺船山。野田；両津市－梅津, 相川町－入川, 佐和田町－二宮。秋庭；佐和田町－真光寺山。
- 807 エゾイボタ ※
Ligustrum tschonoskii
 forma *glabrescens* (Koidz.) Murata
 分布：北, 本, 四, 九
 産地：北見；ドンデン。野田；金北山相川口。
- りんどう科
- 808 ツルリンドウ ※
Tripterospermum japonicum (Sieb. et Zucc.) Maxim.
 分布：北, 本, 四, 九
 産地：北見；羽茂町－小泊, 両津市－梅津。野田；金北山, 畑野町－畑野・経塚山・松ヶ崎, 赤泊村。秋庭；佐和田町－西真光寺山。池上・石澤；分布図 (3) no.218－佐渡全域。
- 809 フデリンドウ ※
Gentiana zollingeri Fawcett
 分布：北, 本, 四, 九
 産地：北見；相川町－入川。野田；金北山, 畑野町－経塚山。秋庭；佐和田町－真光寺山。
- 810 ハルリンドウ
Gentiana thunbergii (G. Don) Griseb.
 分布：本, 四, 九
 産地：野田；金北山
- 811 リンドウ ※
Gentiana scabra Bunge var. *buergeri* (Miq.) Maxim.
 分布：本, 四, 九, 奄美大島
 産地：北見；相川町－入川。野田；相川町－入川。
- 812 エゾリンドウ ※
Gentiana triflora Pallas
 var. *japonica* (Kusnez.) Hara
 分布：北, 本(中部以北)
 産地：北見；ドンデン, 畑野町－経塚山。
- 813 アケボノソウ ※
Swertia bimaculata (Sieb. et Zucc.) Hook. et Thoms.
 分布：北, 本, 四, 九
 産地：北見；両津市－笠取り峠, 相川町－入川, 小木町－沢崎。野田；金北山小川口, 畑野町－松ヶ崎。池上・石澤；分布図 (2) no.113－佐渡全域。
- 814 イヌセンブリ ※
Swertia diluta (Turcz.) Benth. et Hook. fil.
 var. *tosaensis* (Makino) Hara
 分布：本, 四, 九
 産地：北見；羽茂町－小泊, 両津市－梅津。野田；金井町－千種。
- 815 センブリ ※
Swertia japonica (Schult.) Makino
 分布：北(西南部), 本, 四, 九
 産地：北見；ドンデン, 相川町－関越え, 佐和田町－屋敷平。野田；金北山, 赤泊村, 畑野町, 佐和田町－二宮。
- みつがしわ科
- 816 ミツガシワ ※
Menyanthes trifoliata L.
 分布：北, 本, 九
 産地：北見；羽茂町－小泊, 両津市－梅津。野田；金北山。秋庭；金北山新保道 (ジュンサイ池)。池上・石澤；分布図 (1) no.29－両津市－真更川, 山居池, 北小浦。

きょうちくとう科

- 817 テイカカズラ ※
Trachelospermum asiaticum (Sieb. et Zucc.) Nakai
分布：本, 四, 九
産地：北見；羽茂町－飯岡, 小木町－宿根木, 相川町－大倉・寒戸・両津市－片野尾。野田；小木町－小比叡, 真野町, 相川町－大倉。秋庭；相川町－小川。池上・石澤；分布図(2)no.114－小佐渡海岸部岩上。

- 818 チョウジカズラ
Trachelospermum majus Nakai
産地：北見；真野町－真野。
819 キョウチクトウ ※
Nerium indicum Mill.
分布：インド原産 帰化植物
産地：庭園 植栽
820 チョウジソウ
Amsonia elliptica (Thunb.) Roem. et Schult.
分布：本, 九
産地：北見；羽茂町－小泊。野田；真野町－西三川, 両津市－鷺崎。

- 821 ツルニチニチソウ ※
Vinca major L.
分布：ヨーロッパ原産 帰化植物
産地：北見；相川町－蔵倉, 佐和田町－長木, 両津市－野浦。

ががいも科

- 822 ガガイモ ※
Metaplexis japonica (Thunb.) Makino
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；羽茂町－亀脇。野田；赤泊村。
823 イケマ ※
Cynanchum caudatum (Miq) Maxim.
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；相川町－北片辺。野田；金井－新保川, 畑野町。秋庭；佐和田町－西部真光寺山。

- 824 コイケマ
Cynanchum wilfordii (Maxim.) Hemsl.
分布：本(関東以西), 四, 九
産地：北見；相川町－石花。野田；相川町－高千。
825 スズサイコ ※
Cynanchum paniculatum (Bunge) Kitag.
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；羽茂町－小泊。野田；金井町。

- 826 フナバラソウ
Cynanchum atratum Bunge
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；羽茂町－村山。

- 827 コバノカモメヅル
Cynanchum sublaeolatum (Miq.) Matsum.

- 分布：本(関東中部, 近畿地方)
産地：野田；畑野町－多田。

- 828 ハコネカモメヅル
Cynanchum macranthum (Maxim.) Nakai
var. *dickinsii* (Franch. et Savat.) Ohwi
分布：本(三重県, 中部地方, 関東地方)
産地：北見；佐和田町－山田。
829 オオカモメヅル ※
Tylophora aristolochioides Miq.
分布：北, 本, 四, 九
産地：野田；佐和田町－二宮, 畑野町－松ヶ崎, 大塚山。

- 830 コカモメヅル
Tylophora floribunda Miq.
分布：本, 四, 九
産地：北見；真野町－新町, 新穂村－行谷。

あかね科

- 831 クチナシ
Gardenia jasminoides Ellis
分布：本(静岡県以西), 四, 九, 琉
産地：北見；羽茂町－飯岡。
832 オオヤエクチナシ
Gardenia jasminoides var. *fortuniana* Lindl.
産地：北見；新穂村－行谷。植栽
833 ハクチョウゲ
Serissa japonica (Thunb.) Thunb.
分布：中国原産 帰化植物
産地：北見；羽茂町－村山。植栽

- 834 ハシカグサ ※
Hedyotis lindleyana Hook.
var. *hirsuta* (L. fil.) Hara
分布：本, 四, 九, 琉
産地：北見；両津市－真更川・長江, 羽茂町－小泊。野田；金井町－中興, 相川町－戸中。

- 835 ヤイトバナ (ヘクソカズラ) ※
Paederia scandens (Lour.) Merrill
分布：北, 本, 四, 九, 琉
産地：北見；羽茂町－小泊, 両津市－梅津。野田；両津市－砲, 佐和田町－河原田。

- 836 ツルアリドオシ ※
Mitchella undulata Sieb. et Zucc.
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；羽茂町－飯岡。野田；金北山。秋庭；佐和田町－真光寺山。
837 オオキヌタソウ ※
Rubia chinensis Regel et Maack.
var. *glabrescens* (Nakai) Kitag.
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；相川町－南片辺。野田；相川町－高千。

- 838 アカネ ※
Rubia argyi (Lev.) Hara
 分布：本, 四, 九
 産地：北見；羽茂町-小泊, 両津市-梅津・野浦・大川。
 野田；佐和田町-二宮。秋庭；佐和田町-真光寺
 一の川。
- 839 オオアカネ ※
Rubia hexaphylla (Makino) Makino
 分布：本(関東北部~中部地方), 九(北部)
 産地：野田；金北山
- 840 クルマバアカネ
Rubia cordifolia L. var. *pratensis* Maxim.
 分布：本(中部地方), 九(北部)
 産地：野田；金井町
- 841 キバナカワラマツバ ※
Galium verum L. var. *asiaticum* Nakai
 分布：北, 本, 四, 九
 産地：北見；相川町-入川。野田；相川町-石花。秋庭：
 佐和田町-山田。
- 842 カワラマツバ
Galium verum var. *asiaticum* forma *nikkoense* Ohwi
 分布：北, 本, 四, 九
 産地：北見；相川町-入川。野田；金井町。秋庭；佐和
 田町-山田。
- 843 ヤエムグラ ※
Galium spurium L.
 var. *echinospermon* (Wallr.) Hayek
 分布：北, 本, 四, 九, 琉
 産地：北見；相川町-北片辺。野田；金北山, 真野町-西
 三川。
- 844 クルマムグラ ※
Galium trifloriforme Komar.
 var. *nipponicum* (Makino) Nakai
 分布：北, 本, 四, 九
 産地：北見；相川町-南片辺船山, 羽茂町-飯岡。秋庭；
 佐和田町-真光寺山。
- 845 オククルマムグラ ※
Galium trifloriforme var. *trifloriforme*
 分布：北, 本, 四, 九
 産地：野田；真野町
- 846 オオバヤエムグラ ※
Galium pseudoasprellum Makino
 分布：北, 本, 四, 九
 産地：北見；相川町-入川, 佐和田町-乙和池。
- 847 ホソバノヨツバムグラ ※
Galium trifidum L.
 var. *brevipedunculatum* Regel
 分布：北, 本, 四, 九
 産地：野田；金北山, 金井町-中興・新保, 佐和田町-
 乙和池。
- 848 ヤマムグラ ※
Galium pogonanthum Franch. et Savat.
 分布：本, 四, 九
 産地：北見；両津市-梅津。野田；金北山, 真野町-西三
 川。秋庭；佐和田町-真光寺山。
- 849 オヤマムグラ
Galium pogonanthum var. *trichopetalum* Hara
 分布：本(近畿以西), 四
 産地：野田；小木町
- 850 ヨツバムグラ ※
Galium trachyspermum A. Gray
 分布：北, 本, 四, 九
 産地：北見；羽茂町-小泊。野田；金北山。秋庭；佐和
 田町-真光寺山。
- 851 ヒメヨツバムグラ
Galium gracilens (A. Gray) Makino
 分布：本, 四, 九
 産地：北見；羽茂町-小泊。
- 852 キクムグラ ※
Galium kikumugura Ohwi
 分布：北, 本, 四, 九
 産地：北見；相川町-大倉。野田；真野町-西三川・真野・
 経塚山, 相川町-入川。
- 853 ミヤマムグラ
Galium paradoxum Maxim.
 分布：北, 本, 四, 九
 産地：北見；相川町-大倉。
- 854 オオバノヨツバムグラ ※
Galium kamtschaticum Steller
 var. *acutifolium* Hara
 分布：北, 本, 四
 産地：北見；相川町-入川, 佐和田町-乙和池。野田；
 金北山, 片辺。秋庭；佐和田町-真光寺山。
- 855 エゾノヨツバムグラ
Galium kamtschaticum var. *kamtschaticum*
 分布：北, 本(中北部)
 産地：北見；ドンデン
- 856 クルマバソウ ※
Asperula odorata L.
 分布：北, 本
 産地：北見；ドンデン。野田；金北山, 畑野町-松ヶ崎・経
 塚山, 赤泊村-大杉, 佐和田町-乙和池。秋庭；佐
 和田町-真光寺山。池上・石澤；分布図(2) no.115
 -沿岸部全域。
- ひるがお科
- 857 ネナシカズラ ※
Cuscuta japonica Choisy
 分布：北, 本, 四, 九, 琉
 産地：北見；羽茂町-亀脇。野田；相川町-石花, 両津市
 -鷲崎。

- 858 マメダオシ ※
Cuscuta australis R. Por.
分布：北, 本, 四, 九, 琉
産地：北見；佐和田町－石田, 両津市－加茂歌代。野田；
小木町, 金井町, 両津市－鷺崎。
- 859 ハマネナシカズラ
Cuscuta chinensis L.
分布：本(中部地方以北), 四, 九, 琉
産地：北見；相川町－石名, 両津市－藻浦。野田；相川町
－石花。
- 860 ハマヒルガオ ※
Calystegia soldanella (L.) Roem. et Schult.
分布：北, 本, 四, 九, 琉
産地：北見；羽茂町－素浜・荒磯山。野田；両津市－水
津・河崎。秋庭；佐和田町－河原田海岸。
- 861 コヒルガオ ※
Calystegia hederacea Wall.
分布：本, 四, 九
産地：北見；相川町－八百町。
- 862 ヒルガオ ※
Calystegia japonica Choisy
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；羽茂町－小泊。野田；赤泊村, 金井町, 相川
町, 両津市－内海府。
- 863 グンバイヒルガオ ※
Ipomoea pes-caprae (L.) Sweet
分布：四, 九(南部), 琉 亜熱帯～熱帯
産地：北見；羽茂町－素浜。
- むらさき科
- 864 スナビキソウ ※
Messerschmidia sibirica L.
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；相川町－千本, 羽茂町－亀脇。野田；相川
町－入川。秋庭；佐和田町－河原田海岸。
- 865 ハマベンケイソウ ※
Mertensia maritima (L.) S. F. Gray
subsp. *asiatica* Takeda
分布：北, 本(日本海側, 三陸)
産地：北見；相川町－北河内・北田ノ浦, 両津市－藻浦,
小木町－宿根木。野田；小木町－宿根木, 両津市
－藻浦, 相川町－入川。
- 866 ホタルカズラ ※
Lithospermum zollingeri DC.
分布：北, 本, 四, 九, 琉
産地：北見；相川町－入川・大ザレ, 小木町－沢, 両津
市－水津・野浦。野田；小木町, 両津市－岩首。池
上・石澤；分布図(2) no.117－両津市－片野尾・風
島弁天・大川, ドンデン, 畑野町－伊泰磯山, 小
木町－強清水。
- 867 イヌムラサキ
Lithospermum arvense L.
分布：本, 四, 九
産地：北見；羽茂町－亀脇。野田；羽茂町－亀脇。
- 868 ハナイバナ ※
Bothriospermum tenellum (Hornem.)
Fisch. et C. A. Mey.
分布：北, 本, 四, 九, 琉, 小笠原
産地：北見；両津市, 佐和田町－山田。野田；両津市, 小
木町。
- 869 ワスレナグサ
Myosotis scorpioides L.
分布：北, 本(中部以北) 帰化植物 ヨーロッパ原産
産地：野田；金井町－中興。
- 870 ミズタバコ ※
Trigonotis brevipes (Maxim.) Maxim.
分布：本, 四, 九
産地：北見；ドンデン。野田；アオネバ越え。秋庭；相
川町－入川上流。
- 871 コシジタバコ ※
Trigonotis brevipes var. *coronata* (Ohwi) Ohwi
分布：本, 四, 九
産地：北見；ドンデン, 両津市－和木。野田；金北山, 大
塚山, 両津市－馬首。
- 872 キュウリグサ(タバコ) ※
Trigonotis peduncularis (Trevir.) Benth.
分布：北, 本, 四, 九, 琉
産地：北見；相川町－石花, 両津市－和木。野田；金井
町。
- 873 オオルリソウ
Cynoglossum zeylanicum (Vahl) Thunb.
分布：本, 四, 九
産地：北見；佐和田町(真保一輔)。野田；佐和田町－二
宮, 両津市－馬首。
- くまつづら科
- 874 ムラサキシキブ ※
Callicarpa japonica Thunb.
分布：北, 本, 四, 九, 琉
産地：北見；羽茂町－小泊, 両津市－梅津。野田；金井
町, 佐和田町－二宮, 両津市－水津, 赤泊村, 相川
町－戸中・石花。秋庭；佐和田町－真光寺山二つ
坂。池上・石澤；分布図(2) no.118－佐渡低地全
域。
- 875 オオムラサキシキブ
Callicarpa japonica var. *luxurians* Rehder
分布：本(南部), 四, 九, 琉
産地：北見；羽茂町－小泊。
- 876 コムラサキ(コシキブ) ※
Callicarpa dichotoma (Lour.) K. Koch.
分布：本, 四, 九, 琉

産地：野田；両津市－長江。池上・石澤；分布図(3) no. 221－両津市－長江，金井町－野口。

877 クサギ ※

Clerodendrum trichotomum Thunb.

分布：北，本，四，九，琉

産地：北見；相川町－北狄，羽茂町－小泊。野田；相川町，小木町－蓮華峯。池上・石澤；分布図(2) no. 119－佐渡全域 林縁。

878 ハマゴウ ※

Vitex rotundifolia L. fil.

分布：本，四，九，琉

産地：北見；相川町－入川，羽茂町－亀脇，両津市－水津。野田；佐和田町－河原田，相川町－達者・入川，両津市－弾崎。秋庭；佐和田町－河原田海岸。池上・石澤；分布図(3) no. 222－両津市－願，相川町－下戸・橋・達者，小木町－白木・素浜。

879 カリガネソウ ※

Caryopteris divaricata (Sieb. et Zucc.) Maxim.

分布：北，本，四，九

産地：北見；両津市－加茂歌代・北鶴島，羽茂町－小泊。野田；佐和田町－二宮，相川町－入川・小田，両津市－河崎。池上・石澤；分布図(1) no. 31－両津市－河崎，相川町－入川・小田，佐和田町－二宮。

880 クマツヅラ

Verbena officinalis L.

分布：本，四，九，琉

産地：北見；金北山。野田；金北山，外海府。

あわごけ科

881 アワゴケ

Callitriche japonica Engelm.

分布：本(栃木県以西)，四，九，琉

産地：北見；相川町－小川。野田；相川町。

しそ科

882 ツルカコソウ ※

Ajuga shikotanensis Miyabe et Tatew.

分布：本，色丹島

産地：北見；相川町－矢柄・長坂。野田；外海府。

883 キランソウ(ジゴクノカマノフタ) ※

Ajuga decumbens Thunb.

分布：本，四，九

産地：北見；ドンデン

884 ジュウニヒトエ

Ajuga nipponensis Makino

分布：本，四

産地：北見；相川町－入川。野田；相川町－入川。

885 ニシキゴロモ ※

Ajuga yesoensis Maxim.

分布：北，本，四，九

産地：北見；羽茂町－小泊。野田；金北山。秋庭；佐和

田町－真光寺山。

886 ツルニガクサ ※

Teucrium viscidum Blume

var. *miquelianum* (Maxim.) Hara

分布：北，本，四，九，琉

産地：北見；相川町－大倉。

887 ニガクサ ※

Teucrium japonicum Houtt.

分布：北，本，四，九，琉

産地：北見；両津市－梅津・水津，羽茂町－小泊・村山。野田；小木町－深浦，畑野町，両津市－加茂，相川町－戸中・石花。

888 ナミキソウ ※

Scutellaria strigillosa Hemsl.

分布：北，本，四，九

産地：北見；相川町－山の神・千本，羽茂町－亀脇。野田；真野町，相川町－石花・矢柄。

889 シソバタツナミ

Scutellaria laeteviolacea Koidz.

分布：本(福島県以西)，四，九

産地：北見；佐和田町－乙和池。野田；両津市－大倉越え。

890 デワノタツナミソウ ※

Scutellaria muramatsui Hara

分布：本(近畿地方以北) 日本海側

産地：山地林下

891 タツナミソウ

Scutellaria indica L.

分布：本，四，九

産地：北見；相川町－入川。野田；アオネバ越え。秋庭；相川町－入川上流。

892 コバノタツナミ

Scutellaria indica var. *parvifolia* (Makino) Makino

分布：本(伊豆半島以西)，四，九 海岸生

産地：野田；二の岳，佐和田町－乙和池。

893 クロバナヒキオコシ ※

Rabdosia trichocarpa (Maxim.) Hara

分布：北，本(日本海側)

産地：北見；相川町－入川，両津市－梅津・馬首。野田；金北山。

894 ヒキオコシ ※

Rabdosia japonica (Burm.) Hara

分布：北(西南部)，本，四，九

産地：北見；相川町－入川。野田；両津市－馬首・内海府，畑野町－畑野・松ヶ崎，小木町－蓮華峯。池上・石澤；分布図(2)－両津市－藻浦。

895 ヤマハッカ ※

Rabdosia inflexa (Thunb.) Hara

分布：北，本，四，九

産地：北見；小木町－深浦。野田；小木町－蓮華峯，相川町－戸中。

- 896 アキギリ
Salvia glabrescens Makino
分布：本(中部地方～近畿地方)
産地：北見；羽茂町-天沢・小泊。
- 897 アキノタムラソウ ※
Salvia japonica Thunb.
分布：本, 四, 九, 琉
産地：北見；ドンデン。野田；金北山, 金井町, 佐和田町-二宮, 畑野町-松ヶ崎, 両津市-加茂。秋庭；佐和田町-乙和池。
- 898 シロバナアキノタムラソウ
Salvia japonica forma *albiflora* Hiya.
産地：北見；両津市-梅津。
- 899 ナツノタムラソウ
Salvia lutescens Koidz.
var. *intermedia* (Makino) Murata
分布：本(神奈川県, 東海地方, 近畿地方)
産地：北見；ドンデン, 両津市-梅津。
- 900 シロバナナツノタムラソウ
Salvia lutescens forma *albiflora* Murata
産地：北見；両津市-梅津, 相川町-大倉。
- 901 ヤマジソ ※
Mosla japonica (Benth.) Maxim.
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；ドンデン
- 902 ヒメジソ ※
Mosla dianthera (Hamilt.) Maxim.
分布：北, 本, 四, 九, 琉
産地：北見；金井町-中興。野田；金北山, 金井町, 両津市-梅津・河崎・鷺崎。
- 903 イヌコウジュ ※
Mosla punctulata (J. F. Gmel.) Nakai
分布：北, 本, 四, 九, 琉
産地：北見；佐和田町-河原田。
- 904 エゾシロネ ※
Lycopus uniflorus Michx.
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；ドンデン。野田；金井町, 佐和田町-乙和池。
- 905 コシロネ (イヌシロネ)
Lycopus ramosissimus Makino
var. *japonicus* (Matsum. et Kudo) Kitam.
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；両津市-梅津。野田；佐和田町-二宮。
- 906 ヒメシロネ ※
Lycopus maackianus (Maxim.) Makino
分布：北, 本, 四, 九
産地：野田；金北山, 金井町, 赤泊村。
- 907 シロネ ※
Lycopus lucidus Turcz.
分布：北, 本, 四, 九
- 産地：北見；ドンデン。野田；赤泊村, 相川町-相川・石花。
- 908 ナギナタコウジュ ※
Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hylander
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；ドンデン, 金北山, 両津市-梅津, 畑野。
- 909 ハッカ ※
Mentha arvensis L. var. *piperascens* Malinv.
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；真野町-田切須, 羽茂町-小泊, 両津市-梅津。野田；小木町-蓮華峯, 相川町-戸中。
- 910 エゴマ
Perilla frutescens (L.) Britton var. *frutescens*
分布：東南アジア原産 栽培植物
産地：北見；佐和田町-山田, 相川町-北狄。野田；両津市-河崎。
- 911 イブキジャコウソウ ※
Thymus serpyllum L.
subsp. *quinquecostatus* (Celak.) Kitam.
分布：北, 本, 九
産地：北見；金北山, 相川町-入川, 両津市-鷺崎。野田；相川町-石花。
- 912 ミヤマククルマバナ ※
Clinopodium macranthum (Makino) Hara
分布：本(東北地方～北陸地方)
産地：北見；金北山(真保一輔)。秋庭；妙見山腹。
- 913 クルマバナ ※
Clinopodium chinense (Benth.) O. Kuntze
subsp. *grandiflorum* (Maxim.) Hara
var. *parviflorum* (Kudo) Hara
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；相川町-跳坂, 佐和田町-乙和池, 羽茂町-小泊。野田；佐渡。秋庭；妙見山頂。
- 914 ヤマククルマバナ ※
Clinopodium chinense subsp. *grandiflorum*
var. *shibetschense* Koidz.
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；金北山, 金井町-中興。野田；金北山, 佐和田町-二宮。
- 915 トウバナ ※
Clinopodium gracile (Benth.) O. Kuntze
分布：本, 四, 九, 琉
産地：北見；金北山, 両津市-梅津。野田；赤泊村, 金北山, 金井町, 国府川。秋庭；相川町-橋。
- 916 ミヤマトウバナ ※
Clinopodium sachalinense (Fr. Schm.) Koidz.
分布：北, 本(近畿地方以北)
産地：北見；金北山(真保一輔)。秋庭；妙見山頂。
- 917 イヌトウバナ ※
Clinopodium micranthum (Regel) Hara
分布：北, 本, 四, 九

- 産地：北見；ドンデン。野田；真野町。
- 918 ヤマトウバナ ※
Clinopodium multicaule (Maxim.) O. Kuntze
分布：本（中部地方以西），四，九
産地：北見；ドンデン。野田；二の岳，真野町－西三川。
- 919 カワミドリ ※
Agastache rugosa (Fisch. et Mey.) O. Kuntze
分布：北，本，四，九
産地：北見；ドンデン，小木町－宿根木。野田；金井町，相川町，小木町，両津市－内海府。
- 920 ラシヨウモンカズラ
Meehania urticifolia (Miq.) Makino
分布：本，四，九
産地：北見；羽茂町－飯岡・小泊。野田；金北山。池上・石澤；分布図（1）no.33－畑野町－上小倉。
- 921 カキドオシ ※
Glechoma hederacea L.
subsp. *grandis* (A. Gray) Hara
分布：北，本，四，九
産地：北見；両津市－梅津，羽茂町－小泊，相川町－京町。秋庭；佐和田町－真光寺山。
- 922 ウツボグサ ※
Prunella vulgaris L. subsp. *asiatica* (Nakai) Hara
分布：北，本，四，九
産地：北見；両津市－梅津。野田；両津市－入桑・大川，佐和田町－河原田。秋庭；相川町－橋。
- 923 ジャコウソウ ※
Chelonopsis moschata Miq.
分布：北，本，四，九
産地：野田；畑野町－多田，金井町－吉井，両津市－水津。秋庭；妙見山
- 924 イヌゴマ ※
Stachys riederi Chamisso
var. *intermedia* (Kudo) Kitam.
分布：北，本，四，九
産地：北見；佐和田町－河原田。野田；アオネバ越え。
- 925 メハジキ ※
Leonurus japonicus Houtt.
分布：本，四，九，琉
産地：北見；ドンデン。野田；畑野町－松ヶ崎。
- 926 キセワタ ※
Leonurus macranthus Maxim.
分布：北，本，四，九
産地：北見；佐和田町－乙和池，両津市－和木，羽茂町－新倉。野田；佐和田町－乙和池。
- 927 ホトケノザ ※
Lamium amplexicaule L.
分布：本，四，九，琉
産地：北見；両津市－梅津，羽茂町－小泊。野田；小木町，赤泊村，畑野町－多田。

- 928 ヒメオドリコソウ ※
Lamium purpureum L.
分布：ヨーロッパ，小アジア原産 帰化植物
産地：路傍など
- 929 オドリコソウ ※
Lamium album L.
var. *barbatum* (Sieb. et Zucc.)
Franch. et Savat.
分布：北，本，四，九
産地：北見；羽茂町－小泊。秋庭；佐和田町－真光寺山谷下口。池上・石澤；分布図（1）no.32－両津市－北松ヶ崎・久知川・願。金井町－中興・吉井。相川町－大塚山・寒戸・五十浦，新穂村－生え椿・新穂ダム，畑野町－長谷・小倉河内・松ヶ崎・多田，真野町－大須・小川内川・金山・経塚山，羽茂町－小泊・大崎，赤泊村－真浦・杉野浦・大崎，小木町－深浦・強清水。
- 930 エゾノオドリコソウ
Lamium album L.
産地：野田；金北山，佐和田町－二宮，相川町，小木町－蓮華峯。
- 931 マネキグサ（ヤマキセワタ）
Lamium ambiguum (Makino) Ohwi
分布：本（神奈川県以北），四，九
産地：北見；ドンデン，佐和田町－乙和池。
- なす科
- 932 クコ ※
Lycium chinense Miller
分布：北，本，四，九，琉
産地：北見；相川町－山の神・入川，真野町－高崎，両津市－湊。野田；両津市，佐和田町－河原田。
- 933 ハダカホオズキ ※
Tubocapsicum anomalum (Franch. et Savat.) Makino
分布：本，四，九，琉，小笠原
産地：北見；相川町－石花，羽茂町－小泊。野田；真野町－西三川。池上・石澤；分布図（3）no.224－両津市－願・北小浦，相川町－大倉・小田・小野見・五十浦・後尾。
- 934 ホオズキ ※
Physalis alkekengi L.
var. *franchetii* (Masters) Hort.
分布：アジア原産
産地：北見；相川町－入川。野田；真野町－西三川。
- 935 センナリホオズキ
Physalis angulata L.
分布：熱帯アメリカ原産 帰化植物
産地：北見；相川町－入川。
- 936 イガホオズキ ※
Physaliastrum japonicum (Franch. et Savat.) Honda
分布：北，本，四，九

- 産地：北見；相川町－入川。野田；相川町－入川。池上・石澤；分布図(3) no.223－両津市－黒姫越え，相川町－大倉・大塚山・南片辺。
- 937 ヒヨドリジョウゴ ※
Solanum lyratum Thunb.
分布：北，本，四，九，琉
産地：北見；金井町－中興。野田；赤泊村，金井町，経塚山。池上・石澤；分布図(2) no.122－相川町－相川・関，両津市－赤玉，新穂村－清水寺越え，畑野町－小倉，赤泊村－真浦。
- 938 ヤマホロシ ※
Solanum japonense Hakai
分布：北，本，四，九
産地：北見；相川町－入川。
- 939 イヌホオズキ ※
Solanum nigrum L.
分布：北，本，四，九，琉
産地：北見；相川町－入川，佐和田町－河原田。野田；佐和田町－河原田。
- ふじうつぎ科
- 940 フサフジウツギ(チチフジウツギ)
Buddleja davidii Franch.
分布：中国原産 帰化植物 植栽
- ごまのはぐさ科
- 941 キリ ※
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.
分布：中国原産 帰化植物
産地：植栽(東北地方，関東北部)
- 942 ビロードモウズイカ ※
Verbascum thapsus L.
分布：ヨーロッパ原産 帰化植物
産地：北見；相川町－大立坑，佐和田町－河原田。
- 943 ウンラン ※
Linaria japonica Miq.
分布：北，本(千葉県以北太平洋沿岸，瀬戸内海沿岸，日本海沿岸)
産地：北見；相川町－千本，羽茂町－桑浜。秋庭；佐和田町－河原田海岸。
- 944 ヒナノウスツボ
Scrophularia duplicato-serrata (Miq.) Makino
分布：本(関東以西)，四，九
産地：北見；相川町－石花，佐和田町－山田。野田；真野。
- 945 エゾヒナノウスツボ ※
Scrophularia grayana Maxim.
分布：北，本(日本海側－石川県以北，太平洋側－岩手県北部，青森県)
産地：北見；相川町－鹿野浦，真野町－高崎，小木町－城山，両津市－水津。野田；相川町－入川・戸中・影ノ神・塔ノ釜，両津市－水津・岩首。赤泊村。秋庭；相川町－川内海岸。
- 946 オオヒナノウスツボ ※
Scrophularia kakudensis Franch.
分布：北(南部)，本，四，九
産地：野田；金北山
- 947 キクモ ※
Limnophila sessiliflora Blume
分布：本(宮城県以南)，四，九，琉
産地：北見；両津市－梅津，金井町－中興。野田；金井町，両津市－加茂・水津。
- 948 アブノメ
Dopatrium junceum (Roxb.) Buch.-Hamil.
分布：本(福島県以南)，四，九，琉
産地：北見；両津市－長江。
- 949 サワトウガラシ ※
Deinostema violaceum (Maxim.) Yamazaki
分布：本，四，九
産地：野田；佐和田町－二宮。
- 950 スズメハコベ
Microcarpaea minima (Koenig) Merrill
分布：本(関東以西)，四，九，琉
産地：水田土
- 951 ミゾホオズキ ※
Mimulus nepalensis Benth. var. *japonicus* Miq.
分布：北，本，四，九
産地：北見；両津市－笠取り峠・真更川。野田；相川町－石花。秋庭；妙見山清水。
- 952 トキワハゼ ※
Mazus pumilus (Burm. fil.) van Steenis
分布：北，本，四，九，琉
産地：北見；羽茂町－小泊，両津市－梅津。野田；国府川。
- 953 サギゴケ ※
Mazus miquelii Makino
分布：本，四，九
産地：北見；金井町－中興。秋庭；妙見山腹。
- 954 アゼナ ※
Lindernia procumbens (Krock.) Philcox
分布：北半球の温～熱帯
産地：北見；金井町－中興。野田；金井町－中興，赤泊村。
- 955 アゼトウガラシ ※
Lindernia angustifolia (Benth.) Wettst.
分布：本，四，九 暖～熱帯
産地：北見；両津市－梅津。野田；金井町，両津市－加茂。
- 956 クガイソウ ※
Veronicastrum sibiricum (L.) Pennell
subsp. *japonicum* (Nakai) Yamazaki
分布：本

産地：北見；相川町－北立嶋，羽茂町－小泊，両津市－
鷺崎・水津。秋庭；佐和田町－乙和池道。池上・石
澤；分布図(3) no.227－佐渡全域－山地林縁草地。

957 エチゴトラノオ ※

Pseudolysimachion kiusianum (Furumi) Yamazaki
subsp. *maritimum* (Nakai) Yamazaki
var. *maritimum*

分布：本(東北地方，中部地方海岸)

産地：北見；相川町－青野峠・小田，羽茂町－小泊，両
津市－水津・野浦。野田；相川町。

958 サドトラノオ

Veronica holophylla Nakai var. *maritima* Nakai

分布：佐渡島

産地：北見；両津市 *エチゴトラノオに含まれる

959 シラゲエチゴトラノオ ※

Pseudolysimachion kiusianum
var. *canescens* (Satake) Yamazaki

分布：佐渡島

産地：野田；赤泊村，畑野町－多田，小木町－蓮華峯，真
野町－西三川，相川町－石花・外海府海岸。

960 ホソバエチゴトラノオ

Pseudolysimachion kiusianum
subsp. *maritimum* var. *maritimum*
forma *angustatum* (Satake) Yamazaki

分布：本(東北地方，中部地方)

産地：野田；畑野町－多田。

961 ヒメトラノオ

Pseudolysimachion rotundum (Nakai) Yamazaki
var. *subintegrum* (Nakai) Yamazaki
forma *petiolatum* Yamazaki

分布：本(中部地方，関東地方)

産地：北見；相川町－石花。

962 タチイヌノフグリ ※

Veronica arvensis L.

分布：ヨーロッパ原産 帰化植物，1883年頃東京に，日
本全土に分布

産地：北見；両津市－梅津，相川町－入川，羽茂町－村
山。野田；金北山。秋庭；妙見山頂。

963 オオイヌノフグリ ※

Veronica persica Poir.

分布：ヨーロッパ原産 帰化植物，日本全土，1887年頃
東京へ

産地：北見；相川町－京町・達者，羽茂町－羽茂本郷，真
野町－新町，両津市－梅津。

964 ヒヨクソウ ※

Veronica melissaefolia Poir.

分布：北(西南部)，本，四

産地：池上・石澤；分布図(3) no.226－両津市－岩首，相
川町－夕白沢。

965 ヒキヨモギ ※

Siphonostegia chinensis Benth.

分布：北，本，四，九，琉

産地：北見；相川町－石花。野田；金井町。

966 ミヤマママコナ ※

Melanphyrum laxum Miq. var. *nikkoense* Beauv.

分布：北(西南部)，本(中北部，中国地方)

産地：北見；両津市－梅津・ドンデン。野田；金北山，大
塚山，畑野町－飯出山・多田。秋庭；金北山。

967 シロバナミヤマママコナ

Melanphyrum laxum
var. *nikkoense* forma *albiflorum* Hara

産地：北見；両津市－梅津。

968 ケヤマウツボ ※

Lathraea japonica Miq. var. *miqueliana* Ohwi

分布：本(関東地方以西)，四，九

産地：北見；両津市－白瀬。野田；両津市－白瀬。

969 コシオガマ ※

Phtheirospermum japonicum (Thunb.) Kanitz.

分布：北，本，四，九

産地：北見；ドンデン，羽茂町－小泊。野田；畑野町－
松ヶ崎・経塚山，真野町，両津市－鷺崎・内海府。

970 シオガマギク ※

Pedicularis resupinata L. var. *oppositifolia* Miq.

分布：北(中南部)，本，四，九

産地：北見；ドンデン，両津市－大倉越え。野田；佐渡。
秋庭；妙見山頂。

971 ミヤマコゴメグサ ※

Euphrasia insignis Wettst. subsp. *insignis*
var. *insignis*

分布：本，四，九

産地：野田；金北山，大塚山。

972 トガクシコゴメグサ(サドコゴメグサ)

Euphrasia insignis subsp. *insignis*
var. *togakusiensis* (Y. Kimura) Y. Kimura

分布：長野県(浅間山，戸隠山，飯縄山)

産地：佐渡の山地

973 タチコゴメグサ

Euphrasia maximowiczii Wettst.

分布：本(中国地方西部，近畿～東北地方南部)

産地：北見；ドンデン

974 エゾコゴメグサ

Euphrasia maximowiczii var. *yezoensis* Hara

分布：北，本(東北地方)

産地：北見；金北山(真保一輔)。秋庭；妙見山頂。

のうぜんかずら科

975 キササゲ

Catalpa ovata G. Don

分布：中国原産 帰化植物

産地：北見；両津市－梅津・城の腰。植栽

976 ノウゼンカズラ

Campsis glandiflora (Thunb.) Loisel.

分布：中国原産 帰化植物
産地：北見；金井町-中興。植栽

はまうつぼ科

977 ナンバンギセル

Aeginetia indica L.

分布：北, 本, 四, 九, 琉

産地：北見；真野町（真保一輔）

978 オオナンバンギセル

Aeginetia sinensis G. Beck.

分布：本, 四, 九

産地：北見；金井町-中興, 両津市-加茂歌代, 畑野町-経塚山, 羽茂町-小泊。野田；金北山。

979 ハマウツボ ※

Orobanche coerulescens Stephan

分布：北, 本, 四, 九, 琉 海岸, 川原生 カワラヨモギの根に寄生

産地：北見；羽茂町-素浜, 真野町-新町。野田；羽茂町-素浜。

たぬきも科

980 コタヌキモ

Utricularia intermedia Heyne

分布：北, 本（三重県以北）

産地：北見；両津市-梅津。

981 タヌキモ

Utricularia vulgaris L.

var. *japonica* (Makino) Tamura

分布：北, 本, 四, 九

産地：北見；相川町-北狄。野田；両津市-加茂湖。池上・石澤；分布図(2) no.123-両津市-加茂湖, 畑野町-経塚山, 相川町。

はえどくそう科

982 ハエドクソウ ※

Phryma leptostachya L. var. *asiatica* Hara

分布：北, 本, 四, 九

産地：北見；羽茂町-村山, 両津市-梅津・大川。野田；両津市-砲, 佐和田町-二宮, 金北山。秋庭；金北山腹金井町口。

おおばこ科

983 トウオオバコ ※

Plantago major L.

var. *japonica* (Franch. et Savat.) Miyabe

分布：本, 四, 九

産地：野田；相川町-戸中。秋庭；相川町-北狄。

984 テリハオオバコ

Plantago major

var. *japonica* forma *yezomaritima* (Koidz.) Ohwi

産地：北見；相川町-大倉走り。

985 オオバコ ※

Plantago asiatica L.

分布：北, 本, 四, 九, 琉

産地：北見；両津市-二つ亀。野田；金北山, 金井町, 相川町, 畑野町-松ヶ崎。

986 エゾオオバコ ※

Plantago camtschatica Cham.

分布：北, 本, 九 日本海側

産地：北見；両津市-二つ亀, 大佐渡山脈尾根。野田；真野町-西三川。秋庭；相川町-入川海岸。

987 ヘラオオバコ ※

Plantago lanceolata L.

分布：ヨーロッパ原産 全世界, 日本全土 帰化植物

産地：北見；金井町-中興, 真野町-田切須。

すいかずら科

988 ニワトコ ※

Sambucus racemosa L.

subsp. *sieboldiana* (Miq) Hara

分布：本, 四, 九, 種子島, 奄美大島

産地：北見；相川町-南片辺船山・山の神。両津市-大川。野田；金北山, 金井町, 相川町-高千。秋庭；相川町-入川上流。

オオニワトコ var. *major* (Nakai) Murata を含む。

989 ソクズ (クサニワトコ) ※

Sambucus chinensis Lindley

分布：本, 四, 九 暖帯

産地：北見；相川町-入川, 両津市-梅津。野田；畑野町-多田, 佐和田町-二宮。

990 カンボク (ケナシカンボク) ※

Viburnum opulus L.

var. *calvescens* (Rehder) Hara

分布：北, 本 (中北部)

産地：池上・石澤；分布図(2) no.125-新穂村-大野・岩の平, 赤泊村-上川茂・外山。

991 ゴマギ

Viburnum sieboldii Miq.

分布：本 (関東地方以西太平洋側)

産地：北見；ドンデン, 相川町-北狄, 両津市-片野尾。野田；佐和田町-二宮, 相川町-石花。秋庭；佐和田町-真光寺祓川。

992 マルバゴマギ (オオゴマギ) ※

Viburnum sieboldii

var. *obovatifolium* (Yanagita) Sugimoto

分布：本 (北部, 日本海側)

産地：池上・石澤；分布図(1) no.36-両津市-杉池・山居池・真更川, 新穂村-清水寺越え・生え椿, 金井町-平, 佐和田町-真光寺祓川・乙和池, 真野町-真野・経塚山, 相川町-大塚山・北狄・小野見峠・達者・寒戸・鹿野浦。

- 993 サンゴジュ
Viburnum odoratissimum Ker-Gawler
 var. *awabuki* (K. Koch) Zabel
 分布：本（関東地方南部以西），四，九，琉
 産地：北見；羽茂町－小泊。
- 994 オオカメノキ（ムシカリ）※
Viburnum furcatum Blume ex Maxim.
 分布：北，本，四，九，対馬，屋久島
 産地：北見；ドンデン，相川町－入川。野田；金北山，佐和田町－乙和池。秋葉；佐和田町－真光寺山。
- 995 ヤブデマリ
Viburnum plicatum Thunb.
 var. *tomentosa* (Thunb.) Miq.
 分布：本，四，九
 産地：北見；ドンデン
- 996 ケナシヤブデマリ ※
Viburnum plicatum
 var. *plicatum* forma *glabrum*
 (Koidz. ex Nakai) Rehder
 分布：本（日本海側）
 産地：池上・石澤；分布図(2) no.126－真野町－田切須。
 植栽
- 997 オオデマリ（テマリバナ）
Viburnum plicatum var. *plicatum* forma *plicatum*
 産地：野田；赤泊村－下川茂。秋庭；佐和田町－真光寺。
 植栽
- 998 ミヤマガマズミ ※
Viburnum wrightii Miq.
 分布：北，本，四，九
 産地：北見；ドンデン。野田；金北山，経塚山。秋庭；佐和田町－真光寺山。
- 999 ガマズミ（アラゲガマズミ）※
Viburnum dilatatum Thunb.
 分布：北（西南部），本，四，九，種子島
 産地：北見；相川町－入川。野田；佐和田町－二宮，相川町－大倉。秋庭；佐和田町－真光寺山。池上・石澤；分布図(3) no.231－佐渡全域。
- 1000 ウゴツクバネウツギ（オオバツクバネウツギ）
Abelia spathulata Sieb. et Zucc.
 var. *stenophylla* Honda
 分布：本（東北，北陸）日本海側
 産地：野田；金北山
- 1001 タニウツギ ※
Weigela hortensis (Sieb. et Zucc.) K. Koch
 分布：北，本（東北，北陸，山陰地方）
 産地：北見；金北山，羽茂町－小泊。野田；金北山，両津市－鷺崎。秋葉；佐和田町－真光寺山。
- 1002 シロバナタニウツギ
Weigela hortensis forma *albiflora*
 (Sieb. et Zucc.) Rehder
 産地：北見；両津市－梅津。
- 1003 スイカズラ（ニンドウ）※
Lonicera japonica Thunb.
 分布：北（渡島半島南端），本，四，九，琉
 産地：北見；羽茂町－小泊，両津市－梅津。野田；両津市－梅津・入桑・相川町－入川・相川，金井町。秋庭；佐和田町－真光寺山。
- 1004 キンギンボク（ヒョウタンボク）※
Lonicera morrowii A. Gray
 北（西南部），本（東北地方，日本海側）
 産地：北見；金北山。野田；金北山。秋庭；佐和田町－真光寺山。
- 1005 ミヤマウグイスカグラ
Lonicera gracilipes Miq. var. *glandulosa* Maxim.
 分布：本（東北，北陸，山陰地方），四，九
 産地：北見；羽茂町－大崎
- 1006 アラゲヒョウタンボク（オオバヒョウタンボク）※
Lonicera strophiphora Franch.
 分布：北（西北部），本，四（剣山）
 産地：北見；羽茂町－小泊，両津市－羽黒，相川町－入川。野田；真野，佐和田町－乙和池。
- 1007 オニヒョウタンボク
Lonicera vidalii Franch. et Savat.
 分布：本（群馬県，長野県，広島県，島根県，隠岐の島）
 産地：北見；ドンデン
- おみなえし科
- 1008 ツルカノコソウ ※
Valeriana flaccidissima Maxim.
 分布：本，四，九
 産地：北見；相川町－入川。秋庭；相川町－入川上流。池上・石澤；分布図(3) no.233－両津市－願・虫崎・野城，相川町－入川・相川，新穂村－生え椿。
- 1009 ノジシャ ※
Valerianella locusta (L.) Betcke
 分布：ヨーロッパ原産 帰化植物 日本全土
 産地：北見；羽茂町－小泊，相川町－山の神，金井町－中興。野田；佐和田町－二宮，国府川。
- 1010 オトコエシ（チメクサ，トチナ）※
Patrinia villosa (Thunb.) Juss.
 分布：北，本，四，九，奄美大島
 産地：北見；ドンデン，両津市－梅津・大川・野浦，畑野町－大地山。野田；両津市－馬首。
- 1011 オミナエシ（オミナメシ，アワバナ）
Patrinia scabiosaefolia Fisch.
 分布：北，本，四，九
 産地：北見；真野町－四日町，金井町－中興。野田；赤泊村。
- 1012 マルバキンレイカ ※
Patrinia gibbosa Maxim.
 分布：北，本（新潟県以北）
 産地：北見；ドンデン，両津市－鷺崎・野浦，畑野町－大

地山。野田；金北山，畑野町－飯出山・多田。池上・石澤；分布図(1) no.38－両津市－山居池・久知川，ドンデン，佐和田－真光寺・乙和池，妙見山，大塚山，畑野町－猿八・経塚山。

まつむしそう科

1013 ナベナ ※

Dipsacus japonicus Miq.

分布：本，四，九

産地：北見；相川町－矢柄。野田；畑野町－松ヶ崎。

1014 マツムシソウ

Scabiosa japonica Miq.

分布：北，本，四，九

産地：北見；相川町－北狄・関，佐和田町－屋敷平。野田；金北山。秋庭；妙見山。

1015 タカネマツムシソウ ※

Scabiosa japonica var. *alpina* Takeda

分布：本，四，高山生

産地：妙見山大芝場

ききょう科

1016 キキョウ

Platycodon grandiflorum (Jacq.) A. DC.

分布：北，本，四，九，奄美大島

産地：北見；相川町－山の神，金井町－中興。野田；金北山，赤泊村。

1017 シロキキョウ

Platycodon grandiflorum

forma *albiflorum* (Honda) Hara

産地：野田；佐渡

1018 ツルニンジン (ジイソブ) ※

Codonopsis lanceolata (Sieb. et Zucc.) Trautv.

分布：北，本，四，九

産地：北見；金北山，羽茂町－小泊。野田；両津市－河崎。秋庭；佐和田町－乙和池。

1019 ツリガネニンジン ※

Adenophora triphylla (Thunb.) A. DC.

var. *japonica* (Regel) Hara

分布：北，本，四，九

産地：北見；相川町－北狄，佐和田町－山田。野田；金井町，畑野町－経塚山，両津市－鮑・内海府。

1020 シラゲシャジン ※

Adenophora triphylla

var. *japonica* forma *canescens* Kitamura

産地：北見；金北山，金井町－中興，新穂村－上新穂。野田；赤泊村，金井町，相川町－小田・石花。

1021 ハマシャジン

Adenophora triphylla

var. *japonica* forma *glabra* Kitamura

産地：北見；相川町－北狄，両津市－願。

1022 ソバナ ※

Adenophora remotiflora (Sieb. et Zucc.) Miq.

分布：本，四，九

産地：北見；佐和田町－山田，両津市－鷺崎。野田；金北山，妙見山，佐和田町－二宮，両津市－鮑・両尾。

1023 トウシャジン (マルバノニンジン)

Adenophora stricta Miq.

分布：本 (東北地方)

産地：野田；両津市－水津，小木町－蓮華峯。(中国より渡来，植栽)

1024 ホタルブクロ ※

Campanula punctata Lam.

分布：北 (西南部)，本，四，九

産地：北見；両津市－梅津，相川町－入川。野田；アオネバ越え。秋庭；佐和田町－乙和池下。

1025 ヤマホタルブクロ ※

Campanula punctata

var. *hondoensis* (Kitam.) Ohwi

分布：本 (東北地方南部～近畿地方東部)

産地：北見；相川町－入川，両津市－梅津・水津。野田；金北山相川口。

1026 タニギキョウ ※

Peracarpa carnoswa (Wall.) Hook. fil. et Thomson

var. *circaeoides* (Fr. Schm.) Makino

分布：北，本，四，九

産地：北見；ドンデン。野田；経塚山，相川町－片辺。

1027 ミゾカクシ (アゼムシロ) ※

Lobelia chinensis Lour.

分布：北，本，四，九，琉

産地：北見；相川町－入川。野田；畑野町－加茂林。

1028 シロバナミゾカクシ

Lobelia chinensis forma *lactiflora* Hara

産地：北見；両津市－長江。

きく科

1029 オナモミ ※

Xanthium strumarium L.

分布：アジア大陸原産 帰化植物

産地：北見；羽茂町－素浜，相川町－北狄・入川。野田；赤泊村，相川町，佐和田町－河原田。

1030 ブタクサ ※

Ambrodia artemisiaefolia L.

var. *elatior* (L.) Descurtilz

分布：北アメリカ原産 帰化植物

産地：北見；両津市－豊岡。

1031 エゾノコギリソウ ※

Achillea ptarmica L.

subsp. *macrocephala* (Ruprecht) Heimerl

分布：北，本 (中部以北) 温～寒帯

産地：北見；両津市－願。野田；両津市－大野亀。

- 1032 トキンソウ (タネヒリグサ, ハナヒリグサ) ※
Centipeda minima (L.) A. Br. et Ascherson
 分布: 日本全土
 産地: 北見; 両津市-長江, 羽茂町-小泊。野田; 金井町。
- 1033 コシカギク
Matricaria matricarioides (Less.) Porter
 分布: 北, 本
 産地: 金井町-佐渡女子高校々庭
- 1034 イヌカミツレ
Matricaria inodora L.
 分布: ユーラシア原産 帰化植物
 産地: 北見; 両津市-和木。
- 1035 シロバナムシヨケギク
Pyrethrum cinerariifolium Trevir.
 産地: 北見; 羽茂町-村山。
- 1036 カワラヨモギ ※
Artemisia capillaris Thunb.
 分布: 本, 四, 九, 琉
 産地: 北見; 羽茂町-素浜, 真野町-新町。野田; 真野町-西三川。
- 1037 オトコヨモギ ※
Artemisia japonica Thunb.
 分布: 北, 本, 四, 九, 琉
 産地: 北見; 羽茂町-小泊, 小木町-沢。野田; 小木町-蓮華峯, 真野町, 金井町, 相川町, 両津市-真更川。秋庭; 相川町-北狄。
- 1038 ハマオトコヨモギ
Artemisia japonica
 subsp. *littoricola* (Kitam.) Kitam.
 分布: 北, 本 (北部)
 産地: 北見; 両津市-二つ亀。
- 1039 イヌヨモギ ※
Artemisia keiskeana Miq.
 分布: 北, 本, 四, 九
 産地: 北見; ドンデン。野田; 金北山。
- 1040 ヒトツバヨモギ ※
Artemisia monophylla Kitam.
 分布: 本 (日本海側) 温~寒帯
 産地: 野田; 金北山。秋庭; 佐和田町-真光寺山。
- 1041 オオヨモギ (ヤマヨモギ, エゾヨモギ) ※
Artemisia montana (Nakai) Pamp.
 分布: 北, 本 (近畿地方以北)
 産地: 北見; 小木町-沢崎, 真野町-田切須。
- 1042 ヨモギ (カズザキヨモギ) ※
Artemisia princeps Pamp.
 分布: 本, 四, 九, 小笠原
 産地: 北見; 羽茂町-小泊, 小木町-城山。野田; 相川町-小川, 真野町, 赤泊村。
- 1043 タカサブロウ ※
Eclipta prostrata L.
 分布: 北, 本, 四, 九, 琉, 小笠原 帰化植物
 産地: 北見; 羽茂町-小泊。野田; 金井町, 両津市-鷺崎。
- 1044 オオハンゴンソウ ※
Rudbeckia laciniata L.
 分布: 北, 本, 北アメリカ原産 帰化植物, 明治中頃に移入
 産地: 北見; 羽茂町-小泊。
- 1045 ネコノシタ (ハマグルマ) ※
Wedelia prostrata (Hook. et Arn.) Hemsl.
 分布: 本 (関東地方, 北陸地方以西, 四)
 産地: 北見; 羽茂町-素浜, 真野町-新町。野田; 真野町-西三川。秋庭; 佐和田町-河原田海岸。
- 1046 センダングサ
Bidens biternata (Lour.) Merr. et Sherff
 分布: 本 (関東以西), 四, 九 暖~熱帯
 産地: 北見; 相川町-南片辺, 小木町-城山。
- 1047 アメリカセンダングサ (セイタカウコギ) ※
Bidens frondosa L.
 分布: 本, 四, 九, 北アメリカ原産 帰化植物, 1923年に京都で記録
 産地: 北見; 小木町-城山。
- 1048 タウコギ ※
Bidens tripartita L.
 分布: 日本全土 温~熱帯
 産地: 北見; 羽茂町-小泊, 相川町-北狄。野田; 相川町-戸中。
- 1049 メナモミ ※
Siegesbeckia orientalis L.
 subsp. *pubescens* (Makino) Kitam.
 分布: 北, 本, 四, 九 温~暖帯
 産地: 北見; 両津市-鷺崎。野田; 金井町, 両津市-河崎・鷺崎。
- 1050 コメナモミ ※
Siegesbeckia orientalis
 subsp. *glabrescens* (Makino) Kitam.
 分布: 北, 本, 四, 九, 琉 温~亜熱帯
 産地: 北見; 相川町-入川, 羽茂町-小泊。
- 1051 モミジガサ (モミジソウ, シトギ) ※
Cacalia delphiniifolia Sieb. et Zucc.
 分布: 北, 本, 四, 九
 産地: 北見; 相川町-入川, 佐和田町-山田。野田; 両津市-河崎, 佐和田町-二宮, 畑野町-経塚山。
- 1052 テバコモミジガサ
Cacalia tebakoensis (Makino) Makino
 分布: 本 (関東~近畿地方 太平洋側), 四
 産地: 北見; 小木町-沢崎。

- 1053 ミミコウモリ
Cacalia auriculata DC.
 var. *kamtschatica* (Maxim.) Matsum.
 分布：北, 本 (東北地方) 温~寒帯
 産地：北見；ドンデン, 相川町-南片辺船山。
- 1054 タマブキ
Cacalia farfaraefolia Sieb. et Zucc.
 var. *bulbifera* (Maxim.) Kitam.
 分布：北, 本 (関東地方以北)
 産地：野田；佐渡
- 1055 オオカニコウモリ ※
Cacalia nikomontana Matsum.
 分布：本 (東北地方, 北陸地方, 近畿地方以北)
 産地：北見；ドンデン, 野田；金北山, 畑野町-飯出山, 赤泊村, 相川町-岩谷口。
- 1056 ヨブスマソウ
Cacalia hastata L. subsp. *orientalis* Kitam.
 分布：北, 本 (関東地方以北)
 産地：北見；佐和田町-乙和池, 野田；金北山, 畑野町-飯出山, 相川町-大倉, 両津市-馬首, 秋庭；金北山。
- 1057 イヌドウナ ※
Cacalia hastata subsp. *orientalis*
 var. *tanakae* (Franch. et Savat.) Kitam.
 分布：本 (東北地方, 関東地方北部)
 産地：佐渡でヨブスマソウとしたものの多くはこの種に入る
- 1058 コウモリソウ
Cacalia hastata
 subsp. *farfaraefolia* (Maxim.) Kitam.
 分布：本 (関東地方~近畿地方)
 産地：北見；ドンデン
- 1059 サワギク (ポロギク) ※
Senecio nikoensis Miq.
 分布：北, 本, 四, 九
 産地：北見；両津市-梅津。
- 1060 サワオグルマ ※
Senecio pierotii Miq.
 分布：本, 四, 九, 琉 温~亜熱帯
 産地：北見；金井町-中興, 両津市-上横山, 野田；金井町-新保川。
- 1061 ハンゴンソウ ※
Senecio cannabifolius Less.
 分布：北, 本 (中部地方以北) 温~寒帯
 産地：北見；ドンデン, 両津市-梅津・大川, 相川町-石花, 野田；金北山, 相川町-大倉。
- 1062 ノボロギク ※
Senecio vulgaris L.
 分布：ヨーロッパ原産 帰化植物, 明治の初めに渡来
 産地：北見；羽茂町-小泊, 両津市-梅津, 野田；佐和田町-河原田。
- 1063 ツワブキ ※
Farfugium japonicum (L. fil.) Kitam.
 分布：本 (太平洋側-福島県以南, 日本海側-石川県以南)
 産地：北見；相川町-長坂・吹上, 小木町-宿根木。
- 1064 ベニニガナ
Emilia sagittata DC.
 分布：熱帯
 産地：北見；羽茂町-村山, 栽培
- 1065 ダンドボロギク ※
Erechtites hieracifolia (L.) Raf.
 分布：北アメリカ原産 帰化植物
 産地：北見；畑野町-畑野, 新穂村-行谷, 両津市-豊岡。
- 1066 チョウジギク (クマギク) ※
Arnica mallatopus (Franch. et Savat.) Makino
 分布：本, 四
 産地：北見；ドンデン, 相川町-北狄・関, 両津市-野浦, 野田；相川町-入川。
- 1067 ノブキ ※
Adenocaulon himalaicum Edgew.
 分布：北, 本, 四, 九
 産地：北見；両津市-鷲崎・野浦, 相川町-北狄, 野田；両津市-加茂・河崎・梅津, 畑野町-多田, 相川町-戸中。
- 1068 フキ ※
Petasites japonicus (Sieb. et Zucc.) Maxim.
 分布：本 (岩手県水沢付近以南), 四, 九
 産地：北見；羽茂町-小泊, 野田；両津市-梅津, 畑野町-多田。
- 1069 オオアレチノギク ※
Conyza sumatrensis (Retz.) Walker
 分布：本 (東北地方南部以南), 四, 九, 琉 南アメリカ原産, 帰化植物
- 1070 ミヤマヨメナ (ノシュンギク) ※
Miyamayomena savatieri (Makino) Kitam.
 分布：本, 四, 九
 産地：北見；相川町-跳坂。
- 1071 ユウガギク ※
Kalimeris pinnatifida (Maxim.) Kitam.
 分布：本近畿地方以北)
 産地：北見；ドンデン, 野田；両津市-加茂, 金井町, 相川町-石花。
- 1072 アズマギク ※
Erigeron thunbergii A. Gray
 分布：本 (中部地方以北)
 産地：北見；両津市-願, 相川町-岩谷口, 野田；両津市-二つ亀。
- 1073 ハルジオン ※
Erigeron philadelphicus L.
 分布：北アメリカ原産 帰化植物

- 産地：市街地の空き地等に侵入
- 1074 ヒメムカシヨモギ ※
Erigeron canadensis L.
分布：北アメリカ原産 帰化植物
産地：北見；羽茂町-小泊。野田；佐和田町-河原田，相川町。
- 1075 シラヤマギク ※
Aster scaber Thunb.
分布：北，本，四，九
産地：北見；佐和田町-乙和池，小木町-深浦，羽茂町-小泊。野田；金北山，相川町。
- 1076 ゴマナ ※
Aster glehni Fr. Schm. var. *hondoensis* Kitam.
分布：本
産地：北見；ドンデン，金井町-千種。
- 1077 エゾゴマナ
Aster glehni var. *glehni*
分布：北
産地：野田；相川町-大倉，畑野町-松ヶ崎。
- 1078 ヒメシオン
Aster fastigiatus Fisch.
分布：本，四，九
産地：北見；羽茂町-亀脇，両津市-梅津。
- 1079 ノコンギク ※
Aster ageratoides Turcz.
subsp. *ovatus* (Franch. et Savat.) Kitam.
分布：本，四，九
産地：北見；小木町-深浦。野田；金井町，小木町-蓮華峯，相川町。
- 1080 ハマコンギク (エノシマヨメナ)
Aster ageratoides subsp. *ovatus*
var. *littoricola* Kitam.
分布：本 (神奈川県江ノ島，静岡県伊豆半島)
産地：北見；羽茂町-素浜。
- 1081 ユウゼンギク
Aster novi-helgii L.
分布：北アメリカ原産 帰化植物
産地：北見；佐和田町-河原田，両津市-白山。
- 1082 シロヨメナ
Aster ageratoides
subsp. *leiophyllus* (Franch. et Savat.) Kitam.
分布：本，四，九
産地：北見；ドンデン。野田；相川町-小川，小木町-蓮華峯。
- 1083 タマバシロヨメナ ※
Aster ageratoides subsp. *leiophyllus*
var. *ovalifolius* Kitam.
分布：本 (岩手県，山形県，新潟県，富山県)
産地：北見；相川町-大倉。野田；金井町。
- 1084 ヒメジョオン ※
Stenactis annuus (L.) Cass.
分布：北アメリカ原産，帰化植物，全世界
産地：北見；両津市-梅津，羽茂町-村山。
- 1085 セイタカアワダチソウ ※
Solidago altissima L.
分布：北アメリカ原産，帰化植物，本 (京阪神，関東地方，中部地方)
産地：国府川，新保川その他の堤防など。
- 1086 カナダアキノキリンソウ
Solidago canadensis L.
分布：北アメリカ原産，帰化植物，栽培
産地：北見；相川町-入川。
- 1087 アキノキリンソウ ※
Solidago virgaurea L. subsp. *asiatica* Kitam.
分布：北，本，四，九
産地：北見；羽茂町-小泊，両津市-梅津。野田；畑野町-多田，小木町-蓮華峯，相川町-金北山小川口。
- 1088 オオアキノキリンソウ (オクコガネギク) ※
Solidago virgaurea
subsp. *gigantea* (Nakai) Kitam.
分布：北 (西南部)，本 (北部，日本海側海岸植物)
産地：北見；両津市-梅津。
- 1089 ヤブタバコ ※
Carpesium arbotanoides L.
分布：北，本，四，九，琉 温～暖帯
産地：北見；小木町-深浦。野田；相川町-戸中。
- 1090 サジガンクビソウ ※
Carpesium glossophyllum Maxim.
分布：本，四，九，琉 暖帯
産地：北見；羽茂町-小泊，両津市-梅津。野田；両津市-梅津・ドンデン，佐和田町-二宮。秋庭；佐和田町-真光寺山。
- 1091 コヤブタバコ ※
Carpesium cernuum L.
分布：北，本，四，九，琉 温～暖帯
産地：北見；ドンデン
- 1092 ホソバガンクビソウ
Carpesium divaricatum Sieb. et Zucc.
var. *abrotanoides* (Koidz.) Kitam.
分布：本，四，九 温～暖帯
産地：野田；ドンデン，金井町。
- 1093 ミズギク
Inula ciliaris (Miq.) Maxim.
分布：本 (近畿地方以東)，九 (宮崎県)
産地：北見；相川町-入川。
- 1094 カセンソウ ※
Inula salicina L. var. *asiatica* Kitam.
分布：北，本，四，九 温～暖帯
産地：北見；羽茂町-飯岡。野田；佐渡。
- 1095 オグルマ ※
Inula britannica L.
subsp. *japonica* (Thunb.) Kitam.

- 分布：北、本、四、九 温～暖帯
産地：北見；相川町－入川。野田；相川町－石花。
- 1096 ヤマハハコ ※
Anaphalis margaritacea (L.)
Benth. et Hook. fil. Hook. fil.
分布：北、本 (長野県、石川県以北)
産地：北見；ドンデン。野田；金北山。
- 1097 ホソバナヤマハハコ
Anaphalis margaritacea
subsp. *japonica* (Sch. Bip.) Kitam.
分布：本 (福井県、愛知県以西)，四、九
産地：野田；金北山
- 1098 カワラハハコ ※
Anaphalis margaritacea
subsp. *yedoensis* (Thunb. et Savat.) Kitam.
分布：北、本、四、九 温～暖帯
産地：北見；相川町－入川，両津市－梅津，真野町－西三川。
- 1099 ハハコグサ ※
Gnaphalium affine D. Don
分布：日本全土
産地：北見；羽茂町－小泊。野田；真野町－西三川，両津市－両津・大川。
- 1100 アキノハハコグサ ※
Gnaphalium hypoleucum DC.
分布：本、四、九
産地：北見；羽茂町－小泊，両津市－水津。野田；小木町－蓮華峯。
- 1101 チチコグサ ※
Gnaphalium japonicum Thunb.
分布：日本全土
産地：北見；羽茂町－小泊。野田；真野町－西三川，畑野町－多田，佐和田町－二宮。
- 1102 キッコウハグマ ※
Ainsliaea apiculata Sch. Bip.
分布：北、本、四、九
産地：北見；羽茂町－小泊，両津市－梅津。野田；金北山，畑野町－経塚山・松ヶ崎，両津市－椿。秋庭；佐和田町－真光寺山。
- 1103 モミジハグマ
Ainsliaea acerifolia Sch. Bip. var. *acerifolia*
分布：本 (関西以西)，四、九
産地：北見；相川町－入川
- 1104 センボンヤリ (ムラサキタンポポ) ※
Leibnitzia anandria (L.) Turcz.
分布：北、本、四、九
産地：北見；両津市－梅津，相川町－入川。野田；金北山，両津市－鷺崎。秋庭；佐和田町－真光寺山。
- 1105 サワヒヨドリ ※
Eupatorium lindleyanum DC.
分布：北、本、四、九、琉
- 産地：北見；両津市－梅津，真野町－田切須。秋庭；相川町－戸中。
- 1106 ヒヨドリバナ ※
Eupatorium chinense L.
分布：北、本、四、九
産地：北見；ドンデン。野田；金北山，金井町，佐和田町－二宮，相川町－石花。
- 1107 ヨツバヒヨドリ ※
Eupatorium chinense
subsp. *sachalinense* (Fr. Schm.) Kitam.
分布：北、本 (近畿地方以東)，四
産地：北見；金北山，ドンデン，両津市－梅津。野田；相川町－片辺・関・戸中。秋庭；佐和田町－西部真光寺山。
- 1108 ミツバヒヨドリ
Eupatorium chinense
subsp. *sachalinense* forma *tripartitum* Hara
産地：北見；金北山。野田；相川町。
- 1109 サケバヒヨドリ
Eupatorium laciniatum Kitam.
分布：本 (関東西部以西)，四、九
産地：野田；金北山
- 1110 ノアザミ ※
Cirsium japonicum DC.
分布：本、四、九
産地：北見；金井町－中興，羽茂町－小泊。野田；佐和田町－河原田，新穂村，相川町－石花，金北山。秋庭；佐和田町－真光寺山。
- 1111 シロバナアザミ
Cirsium japonicum forma *leucanthum* Nakai
分布：本、四、九
産地：北見；羽茂町－小泊。野田；佐和田町－岩野。
- 1112 ノハラアザミ
Cirsium oligophyllum (Franch. et Savat.) Matsum.
分布：本 (中北部)
産地：北見；羽茂町－小泊。野田；畑野町－畑野・松ヶ崎，金井町。
- 1113 モリアザミ
Cirsium dipsacolepis (Maxim.) Matsum.
分布：本、四、九
産地：北見；相川町－矢柄。
- 1114 ヒメアザミ (ヒメヤマアザミ)
Cirsium buergeri Miq.
分布：本 (近畿地方以西)，四、九
産地：北見；畑野町 (真保一輔)。野田；両津－水津，相川町－戸中・外海府。
- 1115 ナンプアザミ ※
Cirsium nipponicum (Maxim.) Makino
分布：本 (中北部)
産地：野田；佐渡
- 1116 トネアザミ

- Cirsium nipponicum*
var. *incomptum* (Franch. et Savat.) Kitam.
分布：本(関東地方太平洋側)
産地：北見；ドンデン，小木町-深浦。
ノート：佐渡のこの種はサドアザミとなる
- 1117 サドアザミ ※
Cirsium nipponicum var. *sadoensis* Yamazaki
分布：佐渡島特産(山崎 敬: Aug. 20, 1985)
産地：山崎；大倉越え。(山地尾根筋，海岸沿い)
- 1118 ヒメヒゴタイ ※
Saussurea pulchella Fischer
分布：北，本，四，九
産地：北見；羽茂町-小泊・素浜。池上・石澤；分布図(3)no. 375-相川町-相川；青野峠・屋敷平。
- 1119 セイタカトウヒレン
Saussurea tanakae Franch. et Savat.
分布：本(関東地方，中部地方，岡山県)
産地：北見；羽茂町-小泊。野田；金北山，小木町-蓮華峯，畑野町-松ヶ崎。
- 1120 トガヒゴタイ
Saussurea nipponica Miq.
var. *muramatsui* Ohwi
産地：野田；金井町，畑野町-飯出山。
- 1121 ホクロクトウヒレン ※
Saussurea nipponica
subsp. *hokurokuensis* Kitam.
分布：本(北陸地方)
産地：真野町-田切須。
- 1122 オヤマボクチ ※
Synurus pungens (Franch. et Savat.) Kitam.
分布：北(西南部)，本(青森県~岐阜県)
産地：北見；羽茂町-小泊，両津市-梅津・真木。野田；金北山，赤泊村。
- 1123 タムラソウ ※
Serratula coronata L.
subsp. *insularis* (Iljin) Kitam.
分布：本，四，九
産地：北見；佐和田町-乙和池，小木町-深浦。野田；金北山。
- 1124 オケラ
Atractylodes japonica Koidz. ex Kitam.
分布：本，四，九
産地：野田；金北山，妙見山。
- 1125 サドオケラ(ホソバオケラ)
Atractylodes lancea DC.
産地：北見；金井町-千種，羽茂町-村山・飯岡，真野町-田切須。
- 1126 コウゾリナ ※
Picris hieracioides L.
subsp. *japonica* (Thunb.) Krylov
分布：北，本，四，九
- 産地：北見；相川町-入川，羽茂町-小泊。野田；金北山，新穂村。秋庭；佐和田町-真光寺山。
- 1127 ブタナ ※
Hypochoeris radicata L.
分布：ヨーロッパ原産，帰化植物，昭和の初めに帰化，産地：路傍その他の草地
- 1128 オニタビラコ ※
Youngia japonica (L.) DC.
分布：北，本，四，九，琉
産地：北見；両津-鷺崎。野田；真野町-西三川，赤泊村，相川町-入川，両津市-鷺崎。秋庭；佐和田町-真光寺山。
- 1129 ヤクシソウ ※
Youngia denticulata (Houttuyn) Kitam.
分布：北，本，四，九
産地：北見；羽茂町-小泊，両津-梅津。野田；佐渡。
- 1130 ハチジョウナ ※
Sonchus brachyotus DC.
分布：北，本，四，九
産地：北見；相川町-入川。
- 1131 ノゲシ(ハルノノゲシ) ※
Sonchus oleraceus L.
分布：ヨーロッパ原産，帰化植物，中国から移入
産地：北見；小木町-宿根木。野田；新穂村。秋庭；佐和田町-真光寺。
- 1132 オニノゲシ ※
Sonchus asper (L.) Hill.
分布：ヨーロッパ原産，帰化植物，明治時代に入る
産地：北見；佐和田町-乙和池，相川町-二見，両津-梅津。野田；新穂村，相川町，両津。
- 1133 ムラサキニガナ ※
Lactuca sororia Miq.
分布：本，四，九
産地：山地林縁の草地
- 1134 ヤマニガナ ※
Lactuca raddeana Maxim.
var. *elata* (Hemsl.) Kitam.
分布：北，本，四，九
産地：北見；相川町-入川。野田；佐和田町-二宮。秋庭；佐和田町-乙和池道。
- 1135 ミヤマアキノノゲシ
Lactuca triangulata Maxim.
分布：本(関東地方，中部地方の山地)，稀
産地：野田；両津-河崎~畑野町-松ヶ崎。
- 1136 アキノノゲシ ※
Lactuca indica L.
分布：北，本，四，九，琉
産地：北見；小木町-宿根木。野田；佐渡。
- 1137 ホソバアキノノゲシ
Lactuca indica forma *indica* Hara
分布：北，本，四，九，琉

- 産地：北見；相川町－南片辺。
- 1138 ハマニガナ ※
Ixeris repens (L.) A. Gray
分布：北, 本, 四, 九, 琉
産地：北見；羽茂町－素浜, 相川町－千本, 両津－願。
秋庭：佐和田町－河原田海岸。
- 1139 イワニガナ (ジシバリ) ※
Ixeris stolonifera A. Gray
分布：北, 本, 四, 九, 琉
産地：北見；ドンデン。野田；相川町－入川。秋庭；二の岳。
- 1140 オオジシバリ ※
Ixeris debilis A. Gray
分布：北(西南部), 本, 四, 九, 琉
産地：北見；相川町－入川。野田；金北山。
- 1141 ニガナ ※
Ixeris dentata (Thunb.) Hakai
分布：日本全土
産地：野田；金北山, 金井町。秋庭；佐和田町－真光寺山。
ノート：白花品をシロニガナという
- 1142 シロバナニガナ ※
Ixeris dentata
var. *albiflora* (Makino) Nakai
分布：日本全土
産地：北見；金北山, 相川町－入川。野田；金北山, 相川町－入川。秋庭；佐和田町－真光寺山。
- 1143 ハナニガナ ※
Ixeris dentata
var. *albiflora* forma *amplifolia* (Kitam.) Hiyama
分布：日本全土
産地：北見；両津－梅津, 真野町－田切須。
- 1144 フクオウソウ ※
Prenanthes acerifolia (Maxim.) Matsum.
分布：本, 四, 九
産地：北見；ドンデン。野田；相川町－入川。
- 1145 オオニガナ ※
Prenanthes tanakae (Franch. et Savat.) Koidz.
分布：本(近畿地方以北)
産地：野田；金井町, 畑野町, 両津－梅津。
- 1146 ヤナギタンポポ ※
Hieracium umbellatum L.
分布：北, 本, 四
産地：北見；羽茂町－飯岡, 相川町－青野峠。野田；相川町－金北山小川口, 畑野町－多田。
- 1147 セイヨウタンポポ ※
Taraxacum officinale Weber
分布：ヨーロッパ原産, 帰化植物
産地：北見；相川町－橋, 両津市－梅津。
- 1148 シロバナタンポポ ※
Taraxacum albidum Dahlst.

- 分布：本(東京以西), 四, 九
産地：北見；羽茂町－小泊。
- 1149 エゾタンポポ ※
Taraxacum hondoense Nakai
分布：北, 本(中部地方, 関東地方, 東北地方)
産地：北見；羽茂町－小泊。秋庭；妙見山。
- 1150 ヤマザトタンポポ
Taraxacum araki Kitam.
産地：野田；両津市－梅津, 金北山。
- 1151 コオニタビラコ (タビラコ)
Lapsana apogonoides Maxim.
分布：本, 四, 九
産地：北見；羽茂町－小泊, 両津市－梅津, 相川町－入川。野田；両津市－両津・大川。
- 1152 ヤブタビラコ ※
Lapsana humilis (Thunb.) Makino
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；両津市－梅津, 新穂村－井内。

単子葉植物

- おもだか科
- 1153 ウリカワ ※
Sagittaria pygmaea Miq.
分布：北(西南部), 本, 四, 九, 琉
産地：北見；相川町－入川。野田；両津市－水津, 相川町－入川。
- 1154 オモダカ ※
Sagittaria trifolia L.
分布：北, 本, 四, 九, 琉
産地：北見；相川町－北狄。野田；金井町, 相川町－入川, 両津市－内海府。
- 1155 ホソバオモダカ
Sagittaria trifolia forma *longiloba* Makino
産地：北見；相川町－入川。
- 1156 アギナシ ※
Sagittaria aginashi Makino
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；金井町－中興。
- 1157 ヘラオモダカ ※
Alisma canaliculatum A. Br. et Bouche
分布：北, 本, 四, 九, 琉
産地：野田；両津市－加茂。
- 1158 サジオモダカ
Alisma plantago-aquatica L.
var. *orientale* Samuels.
分布：北, 本(北部)
産地：北見；金井町－中興。

とちかがみ科

- 1159 ミズオオバコ ※
Ottelia japonica Miq.
 分布：本, 四, 九
 産地：北見；羽茂町-村山, 両津市-原黒。野田；両津市-水津, 真野, 小木町-宿根木。

- 1160 ヤナギスブタ ※
Blyxa japonica (Miq.) Maxim.
 分布：本, 四, 九, 琉
 産地：北見；両津市-下横山

ひるむしろ科

- 1161 ヒルムシロ ※
Potamogeton distinctus A. Bennett
 分布：北, 本, 四, 九, 琉
 産地：北見；羽茂町-小泊。野田；真野町-西三川・経塚山。

- 1162 エゾノヒルムシロ
Potamogeton gramineus L.
 var. *heterophyllus* (Schreb.) Fries
 分布：北, 本(中部以北)
 産地：金北山東方 カキツバタ池, ca. 1000m

- 1163 コバノヒルムシロ (トゲミズヒキモ)
Potamogeton cristatus Regel et Maack
 分布：本
 産地：北見；ドンデン, 両津市-北小浦。

- 1164 ホソバミズヒキモ (ヒメヒルムシロ)
Potamogeton octandrus Poiret
 分布：北, 本, 四, 九, 琉
 産地：北見；金井町-大和田 長池。

- 1165 ミズヒキモ
Potamogeton octandrum Poir.
 var. *miduhikimo* (Makino) Hara
 分布：本, 四, 九
 産地：北見；佐和田町-乙和池。野田；金井町。

- 1166 エビモ
Potamogeton crispus L.
 分布：日本全土
 産地：北見；新穂村。野田；国府川。

- 1167 ヤナギモ
Potamogeton oxyphyllus Miq.
 分布：北, 本, 四, 九
 産地：北見；金井町-中興。野田；畑野町-経塚山。

- 1168 ネジリカワツルモ ※
Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande
 分布：佐渡島-加茂湖
 産地：笹川通博；両津市-樹崎, 加茂湖(1990, 1996)。石沢 進・笹川通博(1989, 1990)

あまも科

- 1169 アマモ ※
Zostera marina L.
 分布：北, 本, 四, 九
 産地：北見；佐和田町-河原田。野田；両津市, 真野湾。秋庭；佐和田町-河原田海岸。

- 1170 スゲアマモ
Zostera caespitosa Miki
 分布：北, 本(宮城県以北の太平洋側, 日本海側全域)
 産地：野田；佐渡

- 1171 スガモ
Phyllospadix iwatensis Makino
 分布：北, 本(北部)
 産地：北見；両津市。野田；佐渡。

いばらも科

- 1172 トリゲモ
Najas minor All.
 分布：本, 四, 九, 琉
 産地：北見；羽茂町-村山。

- 1173 ホッサモ
Najas graminea Del.
 分布：本, 四, 九, 琉
 産地：野田；両津市-水津。

ゆり科

- 1174 ヤブラン ※
Liriope platyphylla Wang et Tang
 分布：本, 四, 九, 琉
 産地：北見；羽茂町-小泊。野田；金井町, 赤泊村, 両津市-河崎・加茂。池上・石澤；分布図(1) no. 41-両津市-下久知・東強清水・匏, 相川町-五十浦・関・寒戸・南片辺・大塚山・達者・中山峠・相川・橘・元村, 新穂村-湧上・新穂ダム, 畑野町-畑野・小倉峠・多田, 赤泊村-竹の鼻・杉の浦・赤泊, 羽茂町-大泊。

- 1175 ヒメヤブラン ※
Liriope minor (Maxim.) Makino
 分布：北(西南部), 本, 四, 九, 琉
 産地：北見；羽茂町-小泊。野田；小木町, 金井町, 両津市-加茂。池上・石澤；分布図(2) no. 131-両津市-二つ亀, 新穂村-トキ保護センター, 真野町-真野御陵, 相川町-小川。

- 1176 ジャノヒゲ (リュウノヒゲ) ※
Ophiopogon japonicus (L. fil.) Ker-Gawl.
 分布：北(西南部), 本, 四, 九, 琉
 産地：北見；佐和田町-山田。野田；佐和田町-河原田, 小木町-宿根木。池上・石澤；分布図(1) no. 42-両津市-東強清水・白瀬・椿・吉住・玉崎・北松ヶ崎・下久知, 小木町-琴浦, 羽茂町-大泊・赤泊村-赤泊・杉の浦・竹の鼻, 真野町-西三川。

- 田切須・滝脇、畑野町-小倉、新穂村-瓜生屋、相川町-寒戸・中山。
- 1177 ナガバジャノヒゲ ※
Ophiopogon japonicus var. *umbrosus* Maxim.
分布：本(関東以西), 四, 九
産地：野田；両津市-蛇。池上・石澤；分布図(1) no. 43-両津市-水津・東強清水・蛇・白瀬・大山トンネル・藻浦・鷺崎, 小木町-強清水, 羽茂町-大泊, 赤泊村-竹の鼻・東光寺・杉の浦・外山, 真野町-田切須・金山・西三川, 畑野町-小倉・経塚山, 新穂村-新穂ダム・瀧上・生椿, 相川町-相川・達者・入川・元村・寒戸。
- 1178 ヤマホトトギス
Tricyrtis macropoda Miq.
分布：北(西南部), 本(岩手県以南), 四
産地：北見；金井町-中興。野田；金井町。
- 1179 ショウジョウバカマ ※
Heloniopsis orientalis (Thunb.) C. Tanaka
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；相川町-入川。野田；金北山, 畑野町-多田, 新穂村-新穂。
- 1180 シロバナショウジョウバカマ
Heloniopsis orientalis
var. *flavida* (Nakai) Ohwi
分布：本(関東以西), 四
産地：北見；相川町-山の神, 両津市-羽黒・野浦。秋庭；佐和田町-真光寺山。
- 1181 チャボゼキショウ
Tofieldia coccinea Richards.
var. *hondoi* (Miyabe et Kudo) Hara
分布：北, 本(中部以北), 亜高山
産地：北見；相川町-入川。秋庭；相川町-入川。
- 1182 ハナゼキショウ(イワゼキショウ)
Tofieldia nuda Maxim.
分布：本(関東以西), 九 日本特産
産地：野田；相川町-入川。
- 1183 シライトソウ
Chinographis japonica Maxim.
分布：本(秋田県以南), 四, 九
産地：野田；佐渡。池上・石澤；分布図(2) no. 130-資料不完全, 今後精査。
- 1184 コバイケイソウ
Veratrum stamineum Maxim.
分布：北, 本(中部以北)
産地：北見；相川町-入川(真保一輔)。
- 1185 バイケイソウ ※
Veratrum album L. subsp. *oxysepalum* Hulten
分布：北, 本
産地：北見；ドンデン。野田；アオネバ越え。
- 1186 アオヤギソウ
Veratrum maackii Regel
var. *parviflorum* (Miq.) Hara et Mizushima
分布：北, 本(中部以北)
産地：北見；佐和田町-真光寺。野田；金北山, 佐和田町-二宮, 畑野町-多田。
- 1187 タカネアオヤギソウ
Veratrum maackii
var. *parviflorum* forma *alpinum* (Nakai) Kitam.
分布：本(中部以北) 高山帯
産地：野田；相川町-石花。
- 1188 シュロソウ(オオシュロソウ, サドシュロソウ) ※
Veratrum maackii
var. *japonicum* (Baker) T. Shimizu
分布：北, 本
産地：北見；相川町-入川。野田；佐渡。秋庭；佐和田町-西部真光寺。
- 1189 ノギラン ※
Metanartheceum luteo-viride Maxim.
分布：北, 本, 四, 九
産地：野田；金井町, 畑野町-多田。
- 1190 ユウスゲ(キスゲ)
Hemerocallis citrina Baroni
var. *vesperitina* (Hara) M. Hotta
分布：本, 四, 九
産地：野田；両津市-願・北鶴島。
- 1191 ゼンテイカ(ニッコウキスゲ)
Hemerocallis dumortieri Morr.
var. *esculenta* (Koidz) Kitam.
分布：北, 本(中部以北), 山地~亜高山
産地：北見；相川町-西浜・橘(真保一輔), 秋庭；相川町-二見・橋海岸。
- 1192 トビシマカンゾウ ※
Hemerocallis dumortieri
var. *exaltata* (Shout) Kitam.
分布：飛島, 佐渡島
産地：沿岸地帯草地
- 1193 ノカンゾウ(ベニカンゾウ)
Hemerocallis fulva L.
var. *longituba* (Miq.) Maxim.
分布：本, 四, 九, 琉
産地：北見；相川町-入川。野田；相川町-入川。
- 1194 ヤブカンゾウ(オニカンゾウ) ※
Hemerocallis fulva L. var. *kwanso* Regel
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；相川町-入川。野田；佐和田町-河原田。
- 1195 トウギボウシ(オオバギボウシ) ※
Hosta sieboldiana (Lodd.) Engler
分布：北(西南部), 本, 四, 九
産地：北見；相川町-岩谷口, 羽茂町-亀脇。野田；相川町-石花, 真野町-西三川。秋庭；佐和田町-真光寺山。

- 1196 ミズギボウシ
Hosta longissima Honda
分布：本(愛知県以西), 四, 九
産地：野田；金井町-大和田。
- 1197 コバギボウシ ※
Hosta albo-marginata (Hook.) Ohwi
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；金井町-中興, 両津市-長江・野浦。野田；
金井町-中興。
- 1198 ソクシンラン
Aletris spicata (Thunb.) Franch.
分布：本(関東以西), 四, 九
産地：北見；金井町-千種。野田；金井町。
- 1199 ネバリノギラン
Aletris foliata (Maxim.) Bureau et Franch.
分布：北, 本(中部以北), 四, 九
産地：野田；金北山。秋庭；妙見山腹。
- 1200 キバナノアマナ ※
Gagea lutea (L.) Ker-Gawl.
分布：北, 本(中部以北) 稀
産地：北見；相川町-矢柄・長坂・入川・姫が平。野田；
相川町-北狄。
- 1201 ギョウジャニンニク ※
Allium victorialis L.
subsp. *platyphyllum* Hulten
分布：北, 本(近畿以北)
産地：北見；相川町-達者・北狄・鹿野浦・高下, 真野
町-長浜, 羽茂町-小泊。野田；金井町, 小木町,
相川町-姫津。秋庭；相川町-小川。
- 1202 ヒメニラ ※
Allium monanthum Maxim.
分布：北, 本(近畿以東), 四
産地：北見；羽茂町-大崎, 金井町-平。池上・石澤；分
布図(1)no. 40-両津市-藻浦・大山トンネル・北松
ヶ崎・柿野浦・水津, 相川町-達者, 真野町-大
須, 羽茂町-小泊, 赤泊村-真浦。
- 1203 ニラ ※
Allium tuberosum Rottl.
分布：本, 四, 九
産地：北見；相川町-千本・入川, 両津市-大川, 羽茂
町-小泊。
- 1204 ノビル ※
Allium grayi Regel
分布：北, 本, 四, 九, 琉
産地：北見；相川町-入川。野田；金井町。
- 1205 ヤマラッキョウ
Allium thunbergii G. Don
分布：本(福島県以南), 四, 九, 琉
産地：北見；相川町-大倉越え。
- 1206 アサツキ ※
Allium schoenoprasum L. var. *foliosum* Regel
分布：北, 本, 四
産地：北見；ドンデン, 相川町-石花・入川。野田；金
井町, 相川町。秋庭；相川町-二見海岸。
- 1207 ヤグラネギ
Allium fistulosum L. var. *viviparum* Makino
産地：北見；羽茂町-村山。
- 1208 カタクリ ※
Erythronium japonicum Decne.
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；ドンデン。野田；金北山。秋庭；佐和田町
-真光寺山。
- 1209 シロバナカタクリ
Erythronium japonicum forma *leucanthum* Okayama
産地：北見；ドンデン
- 1210 ホソバナアマナ ※
Lloydia triflora (Ledeb.) Baker
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；相川町-矢柄・長坂・入川・姫が平。
- 1211 アマナ ※
Amana edulis (Miq.) Honda
分布：本(福島県以南, 石川県以西), 四, 九
産地：北見；相川町-入川。野田；金北山, 相川町-入
川。
- 1212 ヒロハノアマナ
Amana latifolia (Makino) Honda
分布：本(関東~近畿), 四
産地：北見；相川町-入川。
- 1213 バイモ (アミガサユリ)
Fritillaria verticillata Willd.
var. *thunbergii* (Miq.) Baker
分布：中国原産 帰化植物
産地：庭に植栽, 自然繁殖
- 1214 オオウバユリ ※
Cardiocrinum cordatum (Thunb.) Makino
var. *glehnii* (Fr. Schm.) Hara
分布：北, 本(中部以北)
産地：北見；相川町-北狄・入川, 両津市-梅津・大川・
野浦。秋庭；妙見山腹。池上・石澤；分布図(3)
no. 235-両津市-藻浦・北小浦・願・黒姫・虫崎・
羽吉・杉池・ドンデン・両尾・久知河内, 相川町
-後尾・達者, 金井町-千種, 赤泊村-外山。
- 1215 スカシユリ (イワユリ) ※
Lilium maculatum Thunb.
分布：本(紀伊半島, 新潟県以北)
産地：北見；相川町-北狄。野田；小木町~両津市-水
津・赤亀, 相川町-入川・外海府・尖閣湾, 両津
市-弾崎。秋庭；相川町-後尾海岸。
- 1216 ヤマユリ ※
Lilium auratum Lindley
分布：本(近畿以北) 日本特産
産地：北見；相川町-山の神, 羽茂町-小泊・飯岡, 畑

- 野町-多田, 両津市-梅津・野浦。
- 1217 オニユリ ※
Lilium lancifolium Thunb.
分布: 北, 本, 四, 九
産地: 北見; 相川町-北立島。野田; 羽茂町-素浜。
- 1218 タカサゴユリ
Lilium philippinense Bak. var. *formosanum* Wils.
分布: 台湾 帰化植物
産地: 栽培品の自然繁殖
- 1219 クルマユリ ※
Lilium medeoloides A. Gray
分布: 北, 本(近畿以北), 四(剣山)
産地: 北見; 羽茂町-小泊, 相川町-入川。野田; 金北山, 畑野町-多田。
- 1220 サドクルマユリ
Lilium medeoloides
var. *sadoinsulare* (Matsum. et Satomi)
Masam. et Satomi
分布: 佐渡島(金北山)
産地: 北見; 相川町-入川。
- 1221 ツルボ ※
Scilla scilloides (Lindl.) Druce
分布: 北(西南部), 本, 四, 九, 琉
産地: 北見; ドンデン, 羽茂町-小泊, 両津市-梅津。野田; 小木町-宿根木, 相川町-入川, 両津市-加茂。
- 1222 シロバナツルボ ※
Scilla scilloides
forma *albiflora* Satake et Okuyama
産地: 北見; 両津市-梅津。
- 1223 キジカクシ ※
Asparagus schoberioides Kunth
分布: 北, 本, 四, 九
産地: 秋庭; 相川町-小川。J池上・石澤; 分布図(2)no. 129-佐渡全域の海岸草地。
- 1224 クサスキカズラ (テンモンドウ)
Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merrill
分布: 北, 本, 四, 九, 琉
産地: 北見; 羽茂町-小泊, 両津市-額・水津。野田; 畑野町-松ヶ崎, 相川町-戸中・入川, 両津市-弾崎。
- 1225 ツクバネソウ ※
Paris tetraphylla A. Gray
分布: 北, 本, 四, 九
産地: 北見; ドンデン, 相川町-入川。野田; 佐和田町-二宮, 両津市-鮑。秋庭; 佐和田町-真光寺山。
- 1226 クルマバツクバネソウ
Paris verticillata M. v. Bieberst.
分布: 北, 本, 四, 九
産地: 北見; 両津市-馬首。
- 1227 エンレイソウ ※
Trillium smallii Maxim.
分布: 北, 本, 四, 九
産地: 北見; 羽茂町-小泊, 両津市-梅津。野田; 金北山, 佐和田町-二宮。秋庭; 佐和田町-真光寺山。
- 1228 キチジョウソウ
Reineckea carnea (Andr.) Kunth
分布: 本(関東以西), 四, 九
産地: 北見; 羽茂町-天沢。
- 1229 オモト ※
Rohdea japonica (Thunb.) Roth
分布: 本(関東以西), 四, 九
産地: 北見; 相川町-北狄, 両津市-下久知。
- 1230 ミヤマナルコユリ ※
Polygonatum lasianthum Maxim.
分布: 北, 本, 四, 九
産地: 北見; ドンデン, 両津市-長江・真木。野田; 金北山, 両津市-梅津, 佐和田町-二宮。秋庭; 佐和田町-真光寺山。
- 1231 アマドコロ ※
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
var. *pluriflorum* (Miq.) Ohwi
分布: 北, 本, 四, 九
産地: 北見; 両津市-梅津。野田; 金北山。秋庭; 佐和田町-乙和池。
- 1232 オオアマドコロ ※
Polygonatum odoratum
var. *maximowiczii* (Fr. Schm.) Koidz.
分布: 北, 本(北部)
産地: 北見; 相川町-入川(真保一輔)。野田; 赤泊村-大杉, 相川町-入川。
- 1233 ナルコユリ
Polygonatum falcatum A. Gray
分布: 本, 四, 九
産地: 北見-ドンデン。
- 1234 オオナルコユリ (オクノオオバオウセイ) ※
Polygonatum macranthum (Maxim.) Koidz.
分布: 北, 本, 四, 九
産地: 北見; ドンデン, 羽茂町-新倉。野田; 金北山, 経塚山, 両津市-河崎, 相川町-入川。
- 1235 タケシマラン ※
Streptopus streptopoides (Ledeb.) Frye et Rigg
var. *japonicus* (Maxim.) Fassett
分布: 本(中部)
産地: 北見; 金北山(真保一輔)
- 1236 ツバメオモト ※
Clintonia udensis Trautv. et Mey.
分布: 北, 本(奈良県以北) 垂高山
産地: 北見; 相川町-大倉越え。野田; 佐渡。
- 1237 マイヅルソウ ※
Maianthemum dilatatum (Wood) Nels. et Macbr.

- 分布：北，本，四，九 垂高山
産地：北見；金北山，両津市－両尾越え。秋庭；金北山頂。
- 1238 ホウチャクソウ ※
Disporum sessile Don
分布：北，本，四，九
産地：北見；相川町－南片辺船山・達者。野田；畑野町－経塚山，佐和田町－二宮，相川町－入川。秋庭；佐和田町－真光寺山。
ノート：*オオホウチャクソウ 北見；ドンデン
- 1239 チゴユリ ※
Disporum smilacinum A. Gray
分布：北，本，四，九
産地：北見；羽茂町－大草，両津市－梅津。野田；金北山。秋庭；金井町－平清水。
ノート：*エダウチチゴユリ 北見；両津市－下久知。
- 1240 ユキザサ ※
Smilacina japonica A. Gray
分布：北，本，四，九
産地：北見；ドンデン。野田；金北山。秋庭；佐和田町－真光寺山。
- 1241 シオデ ※
Smilax riparia A. DC.
var. *ussuriensis* Hara et T. Koyama
分布：北，本，四，九
産地：北見；両津市－梅津・野浦。野田；金北山。
- 1242 サドシオデ ※
Smilax riparia
var. *ussuriensis* forma *sadoensis* T. Koyama
分布：佐渡島
産地：北見；両津市－願。野田；両津市－外海府。
- 1243 タチシオデ ※
Smilax nipponica Miq.
分布：本，四，九
産地：北見；両津市－鷺崎・野浦。野田；新穂村。秋庭；佐和田町－真光寺山。
- 1244 サルトリイバラ ※
Smilax china L.
分布：北，本，四，九
産地：北見；羽茂町－小泊，両津市－梅津。野田－金北山。秋庭；佐和田町－真光寺山。
- 1245 ナガミノサルトリイバラ
Smilax china var. *pruniformis* Honda
分布：佐渡島
産地：北見；羽茂町－小泊。
- ひがんばんな科
- 1246 スイセン ※
Narcissus tazetta L. var. *chinensis* Roem.
分布：本(関東以西) 地中海沿岸・アジア中部，中国原産 帰化植物
- 産地：北見；羽茂町－亀脇，小木町－深浦。
- 1247 ヒガンバナ ※
Lycoris radiata Herb.
分布：北，本，四，九，琉，中国原産 帰化植物
産地：北見；相川町－入川，羽茂町－小泊。野田；畑野町－松ヶ崎・畑野，両津市－河崎。
- 1248 シロバナマンジュシャゲ
Lycoris albiflora Koidz.
分布：九
産地：北見；真野町－大須。植栽
- 1249 キツネノカミソリ ※
Lycoris sanguinea Maxim.
分布：本，四，九
産地：北見；羽茂町－村山。野田；小木町－宿根木，真野。
- 1250 オオキツネノカミソリ
Lycoris sanguinea var. *kiushiana* Makino
分布：本(関東以西)，四，九
産地：北見；羽茂町－村山，相川町－入川。
- 1251 ナツズイセン ※
Lycoris squamigera Maxim.
分布：中国原産 帰化植物
産地：北見；羽茂町－村山。
- やまのいも科
- 1252 ヤマノイモ ※
Dioscorea japonica Thunb.
分布：本，四，九，琉
産地：北見；小木町－深浦。野田；相川町－石花。
- 1253 オニドコロ ※
Dioscorea tokoro Makino
分布：北，本，四，九
産地：北見；両津市－梅津。野田；赤泊村，真野町。秋庭；佐和田町－真光寺二つ坂。
- 1254 ウチワドコロ (コウモリドコロ) ※
Dioscorea nipponica Makino
分布：北，本(中部以北)
産地：北見；ドンデン。秋庭；金北山金井口。
- 1255 ヒメドコロ
Dioscorea tenuipes Franch. et Savat.
分布：本(関東以西)，四，九，琉
産地：北見；金井町(真保一輔)。野田；両津市－河崎，小木町－小比叡。
- 1256 キクバドコロ (モミジドコロ)
Dioscorea septemloba Thunb.
分布：本，四，九
産地：北見；両津市－梅津。
- みずあおい科
- 1257 コナギ ※
Monochoria vaginalis (Burm. fil.) Presl.

var. *plantaginea* (Rexb.) Solms-Laub.

分布：本，四，九，琉

産地：北見；羽茂町-小泊，両津市-梅津。

あやめ科

1258 シャガ ※

Iris japonica Thunb.

分布：本，四，九

産地：北見；相川町-椎木沢，両津市-梅津・下久知。野田；金北山。池上・石澤；分布図(2)no. 136-佐渡全域。

1259 ヒメシャガ ※

Iris gracilipes A. Gray

分布：北(西南部)，本，四，九(北部)

産地：北見；羽茂町-須川，畑野町-猿八。池上・石澤；分布図(2)no. 135-羽茂町-大橋。

1260 ノハナショウブ ※

Iris ensata Thunb. var. *spontanea* (Makino) Nakai

分布：北，本，四，九

産地：北見；金北山，相川町-大ザレ。野田；金北山。秋庭；佐和田町-真光寺山二つ坂。池上・石澤；分布図(3)no. 237-両津市-杉池，相川町-大浦，佐和田町-乙和池，金井町-中興上野口。

1261 カキツバタ ※

Iris laevigata Fisch.

分布：北，本，四，九

産地：北見；相川町-二つ岩，羽茂町-小泊。野田；金北山両津道。池上・石澤；分布図(3)no. 238-両津市-杉池，小木町-深浦。

1262 アヤメ ※

Iris sanguinea Hornem.

分布：北，本，四，九

産地：北見；金北山。野田；金井町-大和田。

1263 ヒオウギアヤメ

Iris setosa Pallas

分布：北，本(中部以北)

産地：北見；相川町-大ザレ，羽茂町-小泊。

1264 キショウブ ※

Iris pseudacorus L.

分布：西アジア~ヨーロッパ原産，帰化植物 明治時代に移入栽培

産地：各地で植栽鑑賞

1265 ヒオウギ ※

Belamcanda chinensis (L.) DC.

分布：本，四，九，琉

産地：北見；相川町-山の神・入川姫が平。

1266 ニワゼキショウ ※

Sisyrinchium atlantium Bicknell

分布：北アメリカ原産，帰化植物 明治20年頃渡来

産地：北見；相川町-山の神，佐和田町-東野。

いぐさ科

1267 ドロイ (ミズイ) ※

Juncus gracillimus (Buchen.) V. Krecz. et Gontsch.

分布：北，本，四，九

産地：北見；相川町-北河内・入川，小木町-宿根木。野田；小木町-蓮華峯，相川町-達者・入川。秋庭；相川町-後尾。

1268 クサイ ※

Juncus tenuis Willden.

分布：北，本，四，九

産地：北見；新穂村-正明寺。

1269 イグサ (イ，トウシンソウ) ※

Juncus effusus L. var. *decipiens* Buchen.

分布：北，本，四，九，琉

産地：北見；羽茂町-小泊。野田；赤泊村，国府川，新穂村，両津市-馬首。秋庭；佐和田町-真光寺山。

1270 ラセンイ

Juncus effusus

var. *decipiens* forma *spiralis* Satake

産地：北見；金井町-中興。

1271 エゾホソイ

Juncus filiformis L.

分布：北，本(中部以北) 亜高山帯

産地：北見；両津市-二つ亀。

1272 イヌイ (ヒライ) ※

Juncus yokoscensis (Franch. et Savat.) Satake

分布：北，本

産地：北見；相川町-入川。野田；真野町-西三川，相川町-入川。

1273 タチコウガイゼキショウ ※

Juncus krameri Franch. et Savat.

分布：北，本，四，九，琉

産地：北見；羽茂町-村山

1274 アオコウガイゼキショウ (ホバ/コウガイゼキショウ) ※

Juncus papillosus Franch. et Savat.

分布：北，本，四，九

産地：北見；ドンデン。野田；金井町，畑野町-多田。

1275 コモチコウガイゼキショウ

Juncus monticola Steud.

分布：北，本，四，九，琉

産地：北見；相川町-入川，両津市-加茂歌代，畑野町-猿八。

1276 コウガイゼキショウ ※

Juncus leschenaultii Gay

分布：北，本，四，九

産地：北見；相川町-入川。野田；金井町，両津市-水津，小木町，相川町-金北山小川口。

1277 ヌカボシソウ ※

Luzula plumosa E. Meyer

var. *macrocarpa* (Buchen.) Ohwi

分布：北、本、四、九
産地：北見；ドンデン、経塚山。野田；経塚山、佐和田町ー金北山真光寺道。秋庭；佐和田町ー真光寺山。

1278 ミヤマヌカボシソウ
Luzula rostrata Buchen.

分布：北、本、四、亜高山～高山帯

産地：北見；ドンデン

1279 スズメノヤリ(スズメノヒエ) ※
Luzula capitata (Miq.) Miq.

分布：北、本、四、九、琉

産地：北見；ドンデン、両津市ー梅津。野田；畑野町ー松ヶ崎。秋庭；佐和田町ー真光寺山。

1280 ヤマスズメノヒエ ※
Luzula multiflora Lejeune

分布：北、本、四、九

産地：北見；羽茂町ー飯岡、両津市ー梅津。野田；佐和田町ー二宮・金北山真光寺道。秋庭；金井町ー平清水。

つゆくさ科

1281 ヤブミョウガ
Pollia japonica Thunb.

分布：本(関東以西)、四、九

産地：北見；金井町ー中興。

1282 ツユクサ ※
Commelina communis L.

分布：北、本、四、九、琉

産地：北見；羽茂町ー小泊、両津市ー梅津。野田；金井町、金北山。

1283 ケツユクサ
Commelina communis var. *helespatha* Nakai

産地：野田；羽茂町ー素浜。

1284 ウスイロツユクサ ※
Commelina communis
forma *coeruleo-purpurascens* Makino

産地：北見；羽茂町ー村山、相川町ー岩谷口。

1285 イボクサ ※
Murdannia keisak (Hassk.) Hand-Mazz.

分布：本、四、九、琉

産地：北見；相川町ー山の神、羽茂町ー小泊、両津市ー梅津・野浦。野田；佐和田町ー二宮。

1286 ムラサキツユクサ
Tradescantia canaliculata Rafin.

分布：北アメリカ原産、帰化植物 栽培

産地：北見；相川町ー入川。

ほしくさ科

1287 イトイヌノヒゲ(コイヌノヒゲ)
Eriocaulon decemflorum Maxim.

分布：北、本、四、九

産地：北見；両津市ー梅津。

1288 ホシクサ
Eriocaulon cinereum R. Br.

分布：本、四、九、琉

産地：北見；金井町ー中興。野田；金井町ー大和田。

1289 ニッポンイヌノヒゲ ※
Eriocaulon hondoense Satake

分布：北、本、四、九

産地：北見；金井町ー千種。

1290 イヌノヒゲ
Eriocaulon miquelianum Koernicke

分布：本、四、九

産地：北見；羽茂町ー小泊。野田；両津市ー加茂・水津。

1291 シロイヌノヒゲ
Eriocaulon sikokianum Maxim.

分布：本、四、九

産地：野田；両津市ー加茂。

1292 ヒロハイヌノヒゲ ※
Eriocaulon robustius (Maxim.) Makino

分布：北、本、四、九

産地：北見；金井町ー千種。野田；小木町ー蓮華峯、金井町、相川町ー小田・金北山小川口、両津市ー内海府・馬首。

いね科

1293 ジュズダマ ※
Coix lacryma-jobi L.

分布：インドシナ、インドネシア原産、帰化植物

産地：栽培、時に逸出

1294 ハトムギ
Coix ma-yuen Roman.

産地：栽培、民間薬

1295 ウシノシッペイ ※
Hemarthria sibirica (Gandog.) Ohwi

分布：本、四、九

産地：北見；羽茂町ー小泊、両津市ー梅津・野浦。

1296 アイアシ ※
Phacelurus latifolius (Steud.) Ohwi

分布：北、本、四、九

産地：北見；両津市ー二つ亀・大野亀。

1297 カモノハシ ※
Ischaemum aristatum L.

分布：本、四、九

産地：北見；羽茂町ー素浜、相川町ー入川。野田；相川町ー大塚山。

1298 ケカモノハシ ※
Ischaemum antheplhoroides (Steud.) Miq.

分布：北、本、四、九

産地：北見；羽茂町ー素浜、相川町ー橋。秋庭；佐和田町ー河原田海岸。

- 1299 コブナグサ ※
Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino
 分布：日本全土
 産地：北見；羽茂町-小泊。野田；畑野町-経塚山，金北山，相川町-小田。
- 1300 ササガヤ ※
Microstegium japonicum (Miq.) Koidz.
 分布：北，本，四，九
 産地：北見；小木町-宿根木。野田；金北山，両津市-河崎。
- 1301 ミヤマササガヤ
Microstegium nudum (Trin.) A. Camus
 分布：本(東海地方以西)，四，九
 産地：金井町-千種。
- 1302 アシボソ ※
Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus
 分布：日本全土
 産地：北見；佐和田町-山田，羽茂町-飯岡。
- 1303 オオアブラススキ
Spodiopogon sibiricus Tyn.
 分布：北，本，四，九
 産地：北見；相川町-入川・矢柄。
- 1304 ミヤマアブラススキ ※
Spodiopogon depauperatus Hack.
 分布：本(中北部)，日本海側
 産地：北見；ドンデン，両津市-二つ亀。野田；相川町-相川・戸中。秋庭；佐和田町-真光寺山。
- 1305 オギ ※
Miscanthus sacchariflorus (Maxim.) Benth.
 分布：北，本，四，九
 産地：北見；真野(真保一輔)。野田；相川町-二見。
- 1306 ススキ ※
Miscanthus sinensis Anderss.
 分布：北，本，四，九，琉
 産地：北見；羽茂町-小泊。野田；小木町-蓮華峯，真野，両津市-加茂，金北山。
 ノート：小木半島沢崎周辺には幅の広い葉のものがある(ハチジョウススキ型)
- 1307 ムラサキススキ
Miscanthus sinensis forma *purpurascens* Nakai
 産地：北見；金井町-中興，両津市-加茂歌代。
- 1308 チガヤ ※
Imperata cylindrica (L.) Beauv.
 分布：日本全土
 産地：北見；羽茂町-小泊。野田；両津市-水津。秋庭；佐和田町-河原田海岸。
- 1309 アブラススキ ※
Eccoilopus cotulifer (Thunb.) A. Camus
 分布：日本全土
 産地：北見；相川町-小田。野田；両津市-梅津・馬首・外海府，佐和田町-山田，畑野町。
- 1310 チゴザサ ※
Isachne globosa (Thunb.) O. Kuntze
 分布：北，本，四，九，琉
 産地：北見；羽茂町-小泊・冬居。野田；金井町，佐和田町-乙和池浮島。秋庭；佐和田町-乙和池道。
- 1311 ハイチゴザサ ※
Isachne nipponensis Ohwi
 分布：本(関東以西)，四，九
 産地：池上・石澤；分布図(2)p. 405-相川町-後尾。
- 1312 イヌビエ ※
Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.
 分布：本，四，九，琉，小笠原
 産地：北見；両津市-鷺崎。野田；両津市-鷺崎。
- 1313 ノビエ
Echinochloa crus-galli var. *submutica* Kitag.
 産地：野田；佐和田町-二宮。
- 1314 ヒエ
Echinochloa utilis Ohwi et Yabuno
 分布：中国原産 栽培
 産地：北見；相川町-山の神。
- 1315 チヂミザサ
Oplismenus undulatifolius (Arduino)
 Roemer et Schultes
 分布：日本全土
 産地：北見；両津市-梅津，佐和田町-乙和池。野田；畑野町。
- 1316 ケチヂミザサ ※
Oplismenus undulatifolius forma *undulatifolius*
 産地：野田；畑野町-松ヶ崎。
- 1317 コチヂミザサ ※
Oplismenus undulatifolius
 forma *japonicus* (Steud.) T. Koyama
 分布：日本全土
 産地：北見；羽茂町-小泊，両津市-加茂歌代。
- 1318 ナルコビエ ※
Eriochloa villosa (Thunb.) Kunth
 分布：本，四，九，琉
 産地：北見；羽茂町-冬居。野田；相川町-石花。
- 1319 スズメノヒエ ※
Paspalum thunbergii Kunth
 分布：本，四，九，琉，小笠原
 産地：北見；ドンデン。野田；両津市-弾崎。
- 1320 メヒシバ ※
Digitaria ciliaris (Retz.) Koel.
 分布：日本全土
 産地：北見；佐和田町-河原田海岸。野田；金井町。
- 1321 コメヒシバ
Digitaria timorensis (Kunth) Balansa
 分布：本(関東以西)，四，九，琉，小笠原
 産地：北見；両津(真保一輔)

- 1322 アキメヒシバ ※
Digitaria violascens Link
分布：日本全土
産地：北見；両津市－梅津。野田；金井町－中興。
- 1323 ヌカキビ ※
Panicum bisulcatum Thunb.
分布：北，本，四，九，琉
産地：北見；羽茂町－小泊，真野－田切須。野田；両津市－梅津・内海府・鷺崎・真更川，佐和田町－山田。
- 1324 ヌメリグサ ※
Sacciolepis indica (L.) Chase
var. *oryztorum* (Makino) Ohwi
分布：本，四，九，琉
産地：北見；金井町，小木－宿根木。
- 1325 エノコログサ ※
Setaria virides (L.) Beauv.
分布：日本全土
産地：北見；羽茂町－亀脇。
- 1326 オオエノコログサ
Setaria × pycnocomma Henrard
産地：北見；佐和田町－河原田。
- 1327 ムラサキエノコ
Setaria virides forma *micera* Honda
分布：日本全土
産地：北見；羽茂町－亀脇，両津市－梅津。野田；真野町－西三川。
- 1328 ハマエノコロ ※
Setaria virides
var. *pachystachys* (Franch. et Savat.)
Makino et Nemoto
分布：日本全国の海岸
産地：北見；両津市－二つ亀，羽茂町－小泊，相川町－北狄。野田；小木，相川町－戸中。
- 1329 アキノエノコログサ ※
Setaria faberi Herrm.
分布：北，本，四，九
産地：北見；羽茂町－小泊。
- 1330 キンエノコロ ※
Setaria glauca (L.) Beauv.
分布：日本全土
産地：北見；ドンデン，両津市－梅津。野田；相川。
- 1331 コツブキンエノコロ
Setaria pallide-fusca (Schumach.) Stapf et
C. E. Hubb.
分布：本，四，九，琉
産地：野田；金井町
- 1332 チカラシバ ※
Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng.
分布：北(西南部)，本，四，九，琉
産地：北見；両津市－下横山，羽茂町－小泊。野田；金
- 北山。
- 1333 トグシバ ※
Arundinella hirta (Thunb.) C. Tanaka
分布：北，本，四，九
産地：北見；羽茂町－村山。野田；金井町，両津市－水津・内海府。
- 1334 シバ ※
Zoysia japonica Steud.
分布：日本全土
産地：北見；ドンデン。野田；金北山，新穂村，赤泊村。秋庭；佐和田町－河原田海岸。
- 1335 オニシバ ※
Zoysia macrostachya Franch. et Savat.
分布：北，本，四，九，琉
産地：北見；両津市－願，羽茂町－亀脇。野田；真野町－西三川，羽茂町－素浜。
- 1336 ネズミガヤ
Muhlenbergia japonica Steud.
分布：北，本，四，九
産地：北見；金北山。野田；金北山，金井町，両津市－内海府。
- 1337 ネズミノオ ※
Sporobolus fertilis (Steud.) W. Clayton
分布：本，四，九，琉
産地：北見；羽茂町－小泊。野田；相川。
- 1338 ギョウギシバ ※
Cynodon dactylon (L.) Pers.
分布：日本全土
産地：北見；羽茂町－素浜，相川町－入川。野田；相川町－入川。
- 1339 チョウセンガリヤス ※
Cleistogenes hackelii (Honda) Honda
分布：本，四，九
産地：北見；相川町－矢柄。野田；相川町－戸中・大倉・外海府。
- 1340 オヒシバ ※
Eleusine indica (L.) Gaertn.
分布：本，四，九，琉，小笠原
産地：北見；佐和田町－河原田海岸，両津市－下横山。
- 1341 ニワホコリ ※
Eragrostis multicaulis Steud.
分布：日本全土
産地：北見；羽茂町－小泊，両津市－梅津。
- 1342 カゼクサ ※
Eragrostis ferruginea (Thunb.) Beauv.
分布：本，四，九
産地：北見；羽茂町－素浜，両津市－下横山。
- 1343 シナダレスズメガヤ ※
Eragrostis curvula (Schrad.) Nees
分布：南アフリカ原産，帰化植物，土木工事の土留めに植える。

- ア原産
産地：牧草地，土木工事の土留め
- 1366 オニウシノケグサ ※
Festuca arundinacea Schreb.
分布：本（北部）帰化植物，ヨーロッパ原産
産地：牧草地，土木工事の土留め
- 1367 ナギナタガヤ ※
Festuca myuros L.
分布：本，四，九 帰化植物，ヨーロッパ，アフリカ，西アジア原産
産地：北見；相川町－入川，真野町－新町，両津市－野浦・願。
- 1368 ネズミムギ ※
Lolium multiflorum Lam.
分布：日本各地 帰化植物，ヨーロッパ原産 牧草・Italian ryegrass
産地：北見；畑野町－栗野江。
- 1369 ドクムギ
Lolium temulentum L.
分布：ヨーロッパ原産，帰化植物 Darnel
産地：北見；相川町－入川，野田；相川町－二見・達者。
- 1370 コバンソウ
Briza maxima L.
分布：ヨーロッパ原産，帰化植物
産地：北見；佐和田町－河原田海岸。秋庭；佐和田町－河原田海岸。
- 1371 ヒメコバンソウ ※
Briza minor L.
分布：日本各地，帰化植物 ヨーロッパ原産
産地：北見；羽茂町－小泊，野田；赤泊村，国府川，佐和田町－二宮。
- 1372 カモガヤ ※
Dactylis glomerata L.
分布：北，本，四，九 帰化植物 牧草・Orchard grass
産地：北見；小木町－沢，両津市－二つ亀，野田；真野町－西三川。
- 1373 キツネガヤ ※
Bromus pauciflorus (Thunb.) Hack.
分布：北，本，四，九
産地：北見；羽茂町－小泊，小木町－城山。
- 1374 スズメノチャヒキ ※
Bromus japonicus Thunb.
分布：北，本，四，九
産地：北見；両津市－両津・梅津，佐和田町－河原田。秋庭；佐和田町－河原田海岸。
- 1375 カラスノチャヒキ ※
Bromus secalinus L.
分布：北，本（中北部）帰化植物 ヨーロッパ，アジア原産
産地：北見；相川町（真保一輔）。野田；相川町。
- 1376 イヌムギ ※
Bromus catharticus Vahl
分布：北，本，四，九 帰化植物 南アメリカ原産
産地：路傍，畦畔など
- 1377 テンキグサ（ハマニンニク，クサドウ） ※
Elymus mollis Trin.
分布：北，本，九（北部）
産地：北見；両津市－願，羽茂町－素浜，佐和田町－河原田。野田；真野町－新町。秋庭；佐和田町－河原田海岸。
- 1378 アオカモジグサ ※
Agropyron ciliare (Trin.) Franch.
var. *minus* (Miq.) Ohwi
分布：北，本，四，九
産地：路傍，耕地の周辺雑草として
- 1379 タチカモジグサ
Agropyron ciliare var. *pilosum* (Korsh.) Honda
産地：北見；金井町（真保一輔）
- 1380 カモジグサ ※
Agropyron tsukushiense (Honda) Ohwi
var. *transiens* (Hack.) Ohwi
分布：日本全土
産地：北見；両津市－梅津・願，野田；金井町－中興，新穂村。
- 1381 エゾカモジグサ
Agropyron yezoense Honda
分布：北，本（長野県）
産地：北見；相川町－青野峠。
- 1382 ヤマカモジグサ ※
Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv.
分布：北，本，四，九
産地：北見；金北山，相川町－北狄。
- 1383 ハルガヤ ※
Anthoxantum odoratum L.
分布：北，本，四，九 帰化植物 ヨーロッパ，シベリア原産
産地：路傍草地
- 1384 クサヨシ ※
Phalaris arundinacea L.
分布：北，本，四，九
産地：北見；両津市－加茂歌代，新穂村。野田；赤泊村，新穂村，両津市－加茂。
- 1385 シマガヤ ※
Phalaris arundinacea var. *picta* L.
産地：北見；赤泊村（真保一輔）
- 1386 イブキヌカボ ※
Milium effusum L.
分布：北，本，四，九
産地：野田；金井町－新保川上流。
- 1387 ヌカススキ
Aira caryophyllea L.

- 1344 スズメガヤ
Eragrostis cilianensis Link. ex Vignolo Lutati
分布：本，四，九，琉
産地：北見；真野町－新町。
- 1345 タツノヒゲ ※
Diarrhena japonica Franch. et Savat.
分布：北，本，四，九
産地：北見；羽茂町－小泊，佐和田町－乙和池。池上・石澤；分布図(3)竹田川ダム。
- 1346 ダンチク ※
Arundo donax L.
分布：本(関東南部以西)，四，九，琉，小笠原
産地：庭園植栽
- 1347 ツルヨシ ※
Phragmites japonica Steud.
分布：本，四，九，琉
産地：北見；相川町－矢柄，両津市－北鶴島・大野川・淨蓮坊川。野田；両津市－外海府。
- 1348 ヨシ ※
Phragmites communis Trin.
分布：北，本，四，九，琉
産地：北見；羽茂町－小泊。野田；両津市－水津・真更川。
- 1349 ササクサ
Lophatherum gracile Brongn.
分布：本(関東以西)，四，九，琉
産地：北見；真野町－国分寺。野田；畑野町－加茂神社。
- 1350 トウササクサ ※
Lophatherum sinense Rendle
分布：本(北陸，近畿以西)，四，九
産地：北見；畑野町
- 1351 マコモ ※
Zizania latifolia Turcz.
分布：北，本，四，九
産地：北見；真野町－吉岡，両津市－梅津・下横山。野田；両津市－水津。
- 1352 エゾノサヤヌカグサ
Leersia oryzoides (L.) Sw.
分布：北，本，四，九
産地：山間地の減反水田などに
- 1353 サヤヌカグサ ※
Leersia sayanuka Ohwi
分布：北(西南部)，本，四，九
産地：北見；金井町－中興。野田；相川町－小田。
- 1354 コメガヤ ※
Melica nutans L.
分布：北，本，四，九
産地：相川町－入川。野田；佐和田町－河原田。秋庭；佐和田町－真光寺山。
- 1355 ドジョウツナギ ※
Glyceria ischyronoura Steud.
分布：北，本，四，九
産地：北見；ドンデン。野田；新穂村，佐和田町－二宮。秋庭；相川町－曼荼羅寺・二見。
- 1356 スズメノカタビラ ※
Poa annua L.
分布：日本全土，旧世界原産
産地：北見；羽茂町－小泊。野田；金井町。秋庭；佐和田町－長木実相寺。
- 1357 ミゾイチゴツナギ ※
Poa acroleuca Steud.
分布：北，本，四，九，琉
産地：北見；佐和田町－山田。野田；相川町，赤泊村－大杉。
- 1358 タマミゾイチゴツナギ ※
Poa acroleuca var. *submoniliformis* Makino
分布：本，四，九
産地：北見；羽茂町－羽茂本郷，両津市－北松ヶ崎，相川町－戸中。
- 1359 オオイチゴツナギ
Poa nipponica Koidz.
分布：北，本，四，九
産地：北見；佐和田町(真保一輔)。野田；金北山，アオネバ越え，金井町－中興。秋庭；佐和田町－長木実相寺。
- 1360 アイヌソモソモ ※
Poa fauriei Hack.
分布：北，本 日本海側
産地：北見；相川町－大倉・矢柄。
- 1361 ナガハグサ ※
Poa pratensis L.
分布：北，本，四，九
産地：北見；金井町－中興，両津市－梅津。野田；金井町－中興，真野町－西三川。
- 1362 ウシノケグサ ※
Festuca ovina L.
分布：北，本，四，九
産地：北見；金北山，妙見山，両津市－梅津。野田；金北山。
- 1363 オオウシノケグサ ※
Festuca rabra L.
分布：北，本(中部以北の高山，時に海岸)
産地：北見；両津市－二つ亀。野田；赤泊村－大杉，真野町－西三川，新穂村，国府川。秋庭；佐和田町－河原田。
- 1364 トボシガラ ※
Festuca parvigluma Steud.
分布：北，本，四，九
産地：北見；ドンデン。野田；金北山，新穂村。
- 1365 ヒロハノウシノケグサ ※
Festuca elatior L.
分布：北，本，四，九 帰化植物，ヨーロッパ，シベリ

- 分布：ヨーロッパ原産 帰化植物
産地：北見；路傍
- 1388 シラゲガヤ ※
Holcus lanatus L.
分布：ヨーロッパ原産 帰化植物 Velvet grass
産地：路傍
- 1389 コメススキ ※
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.
分布：北、本（中部以北、大峰山、伯耆大山）
産地：北見；相川町－大倉。大佐渡山脈尾根の草原。
- 1390 カニツリグサ ※
Trisetum bifidum (Thunb.) Ohwi
分布：北、本、四、九
産地：北見；羽茂町－飯岡、両津市－梅津。野田；金北山、新穂村、金井町－中興。
- 1391 カラスムギ ※
Avena fatua L.
分布：日本全土、帰化植物；ヨーロッパ、西アジア原産
産地：北見；金井－中興、両津市－梅津。野田；金井町－中興、赤泊村－大杉。秋庭；佐和田町－河原田海岸。
- 1392 マカラスムギ（エンバク）
Avena sativa L.
分布：帰化植物 Oat 栽培種
産地：北見；金井町－中興。
- 1393 オオカニツリ ※
Arrhenatherum elatum (L.) Presl.
分布：北、本、四、九 帰化植物；ヨーロッパ原産
産地：野田；真野町－西三川。
- 1394 チョロギガヤ
Arrhenatherum elatum
var. *bulbosum* (Willd.) Spenner
産地：北見；両津市－源太平。（葉に白斑のあるものをリボンガヤという）
- 1395 ヤマアワ ※
Calamagrostis epigeios (L.) Roth
分布：北、本、四、九
産地：北見；相川町－入川。野田；金井町－新保。池上・石澤；分布図 (3) no. 239－両津市－二つ亀・大野亀・北小浦・杉池、金井町－上野口、畑野町－加茂神社・経塚山。
- 1396 ホッスガヤ ※
Calamagrostis pseudo-phragmites
(Haller fil.) Koeler
分布：北、本
産地：池上・石澤；分布図 (3) no. 240－妙見山真光寺道。
- 1397 イワノガリヤス ※
Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin.
分布：北、本、四 高山
産地：北見；両津市－藤巻、真野町－国分寺・吉岡。
- 1398 ヒメノガリヤス ※
Calamagrostis hakonensis Franch. et Savat.
分布：北、本、四、九
産地：北見；相川町、金井町－中興。野田；金北山相川口。池上・石澤；分布図 (2) no. 138－相川町、佐和田町－妙見山真光寺道、妙見山白雲荘。
- 1399 ヒゲノガリヤス ※
Calamagrostis longiseta Hack.
分布：本（中北部）
産地：北見；相川町－矢柄。野田；金北山。池上・石澤；分布図 (2) no. 139－妙見山大芝場、金北山カキツバタ池、大佐渡山脈尾根草地。
- 1400 ノガリヤス（サイトウガヤ）※
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth
var. *brachytricha* (Steud.) Hack.
分布：北（西南部）、本、四、九
産地：北見；羽茂町－素浜。野田；相川町－金北山小川口。
- 1401 ミノゴメ（カズノコグサ）※
Beckmannia syzigachne (Steud.) Fern.
分布：北、本、四、九
産地：北見；羽茂町－冬居、相川町－橘、両津市－吾瀧。野田；金井町－中興。
- 1402 ヒエガエリ ※
Polypogon fugax Steud.
分布：本、四、九、琉
産地：北見；小木町－沢。野田；相川町－入川。秋庭；相川町－入川上流。
- 1403 コヌカグサ ※
Agrostis alba L.
分布：北、本、四、九 帰化植物；北半球北地
産地：野田；金井町
- 1404 ミヤマヌカボ ※
Agrostis flaccida Hack.
分布：北、本、四、九
産地：野田；金北山
- 1405 ユキクラヌカボ ※
Agrostis hideoi Ohwi
分布：新潟県西部の深山、雪倉岳のちなむ
産地：北見；妙見山
- 1406 ヌカボ ※
Agrostis clavata Trin var. *nukabo* Ohwi
分布：日本全土
産地：北見；ドンデン、羽茂町－素浜。秋庭；金北山金井口。
- 1407 エゾヌカボ
Agrostis scabra Willd.
分布：北、本（中北部）
産地：路傍、畦畔
- 1408 ヒメコヌカグサ
Agrostis nipponensis Honda

- 分布：本（関東以西），四，九
産地：野田；相川町
- 1409 タチヌカボ
Agrostis scouleri Trin.
産地：北見；ドンデン
- 1410 オオアワガエリ ※
Phleum pratense L.
分布：ヨーロッパ，シベリア原産 帰化植物 Timothy
産地：北見；相川町－山の神。野田；大塚山。秋庭；佐和田町－真光寺山。
- 1411 ミヤマアワガエリ
Phleum alpinum L.
分布：北，本（中部）高山帯
産地：野田；大塚山
- 1412 アワガエリ
Phleum paniculatum Huds.
分布：本，四，九
産地：北見；相川町－南片辺，新穂村－大野。野田；小
木町，赤泊村－大杉。
- 1413 セトガヤ
Alopecurus japonicus Steud.
分布：本（関東以西），四，九
産地：北見；羽茂町－天沢。
- 1414 スズメノテッポウ ※
Alopecurus aequalis Sobol.
分布：北，本，四，九
産地：北見；相川町－入川。野田；金北山。
- たけ亜科
- 1415 ホウライチク
Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch.
分布：本（関東地方以西）インドシナ原産 帰化植物
産地：北見；羽茂町－上山田。
- 1416 ホウオウチク
Bambusa multiplex var. *elegans* (Koidz.) Muroi
分布：本（関東地方以西）南中国原産 帰化植物
- 1417 ダイフクチク（ラッキョウダケ）
Bambusa ventricosa McClure
分布：南中国原産
産地：鉢植え鑑賞
- 1418 オカメササ
Shibataea kumasaca (Zoll.) Nakai
分布：本，四，九
産地：北見；相川町－山の神，真野町－阿佛坊。野田；
新穂村。
- 1419 モウソウチク ※
Phyllostachys pubescens Mazel ex
Houzeau de Lehaie
分布：各地で栽培 中国原産 帰化植物
産地：北見；羽茂町－小泊。
- 1420 キッコウチク（ブツメンチク）
Phyllostachys pubescens
var. *heterocycla* Houzeau de Lehaie
産地：庭園に植栽
- 1421 ホテイチク
Phyllostachys aurea Carriere ex
A. Riviere et C. Riviere
分布：各地で栽培 中国原産 帰化植物
産地：北見；羽茂町－小泊・村山，相川町－大工町。
- 1422 マダケ ※
Phyllostachys bambusoides Sieb. et Zucc.
分布：本，四，九 青森県北限
産地：北見；羽茂町－小泊。野田；赤泊村，佐和田町－
二宮。
- 1423 キンメイチク
Phyllostachys bambusoides
var. *castillonis* (Marl. ex Carr.) Makino
産地：北見；羽茂町－上山田。
- 1424 クロチク
Phyllostachys nigra (Loddiges) Munro var. *nigra*
分布：日本各地 中国原産 帰化植物
産地：北見；羽茂町－小泊，真野町－西三川。
- 1425 ハチク ※
Phyllostachys nigra var. *henonis* (Bean) Stapf
分布：日本各地 中国原産 帰化植物
産地：北見；羽茂町－小泊，真野町－西三川。
- 1426 ウンモンチク
Phyllostachys nigra
var. *henonis* forma *boryana* (Mitford) Makino
産地：庭園に植栽
- 1427 シホウチク（シカクダケ）
Tetragonocalamus angulatus (Munro) Nakai
分布：本（関東以西）植栽，中国，台湾原産 帰化植物
産地：北見；羽茂町－上山田・小泊。
- 1428 アオナリヒラ
Semiarundinaria fastuosa (Mitford.) Makino
var. *viridis* Makino
分布：関東地方 植栽
産地：真野町－四日町 大願寺。
- 1429 カンチク
Chimnobambusa marmorea (Mitford) Makino
分布：本（中部以南）日本固有種
産地：羽茂町－羽茂本郷。植栽
- 1430 カンザンチク
Pleioblastus hindsii (Munro) Nakai
分布：本（関東地方以西）植栽，中国南部原産 帰化植
物
産地：羽茂町－羽茂本郷。
- 1431 タイミンチク
Pleioblastus gramineus (Bean) Nakai
分布：本（関東地方以西）植栽 琉球諸島原産

- 産地：北見；羽茂町－村山，金井町－吉井。野田；相川町。
- 1432 アズマネザサ
Pleioblastus chino (Franch. et Savat.) Makino
var. *chino*
分布：北（西南部），本，四，九
産地：金井町－新保。
- 1433 ネザサ
Pleioblastus chino
var. *viridis* (Makino) S. Suzuki
産地：北見；金井町
- 1434 コチク
Pleioblastus chino
var. *viridis* forma *humilis* (Makino) S. Suzuki
産地：金井町－三瀬川。庭園植栽
- 1435 アオネザサ（トヨオカザサ）
Pleioblastus virens Makino
分布：本（東北，関東地方）
産地：北見；佐和田町（真保一輔）。野田；佐和田町－河原田・二宮。
- 1436 オロシマチク
Pleioblastus pygmaeus (Miq.) Nakai
var. *distichus* (Mitford) Nakai
分布：本（関東地方以西），四，九
産地：北見；相川町
- 1437 オキナダケ
Pleioblastus argenteostriatus
(Regel) Nakai cv. *Disticha*
分布：庭園植栽
産地：相川町－南沢，真野町－竹田。
- 1438 ケネザサ
Pleioblastus shibuyanus Makino ex Nakai
forma *pubescens* (Makino) S. Suzuki
分布：本（中部地方以西），四，九
産地：野田；両津市－真木。
- 1439 チゴザサ（シマダケ）
Pleioblastus fortunei (van Houtte) Nakai
分布：日本全国 植栽
産地：北見；羽茂町－小泊。
- 1440 カムロザサ
Pleioblastus viridistriatus (Sieb.) Makino
産地：庭園植栽
- 1441 サドネザサ
Pleioblastus sadoensis Makino
分布：佐渡；佐和田町－二宮，村松七郎 (July 25, 1933)
産地：北見；金北山。野田；佐和田町－河原田。
ノート：サドザサのsyn.，金北山のものはチシマザサの誤認と思われる
- 1442 ヤダケ ※
Pseudosasa japonica (Sieb. et Zucc.) Makino
var. *japonica*
分布：本，四，九
産地：北見；佐和田町－山田。野田；両津市－水津，佐和田町－二宮・真光寺，畑野町，相川町，小木町。
- 1443 ラッキョウヤダケ（ラッキョウダケ）
Pseudosasa japonica var. *tsutsumiana* Yanagita
分布：茨城県水戸市備前町 植栽
産地：金井町－泉，佐和田町八幡－佐渡博物館。
- 1444 メンヤダケ
Pseudosasa japonica var. *pleioblastoides* Muroi
分布：佐渡，四国
産地：佐和田町－四日町・八幡・澤根，真野町－金丸，金井町－中興。
- 1445 シイヤザサ
Sasaella glabra (Nakai) Nakai ex Koidz.
産地：佐和田町－澤根。
- 1446 サドザサ
Sasaella sadoensis (Nakai) S. Suzuki
分布：佐渡；佐和田町－二宮 真光寺，前川文夫 (Jul. 25, 1933)
産地：北見；佐和田町－山田。秋庭；佐和田町－中原 佐渡高校。
- 1447 アズマザサ
Sasaella ramosa (Makino) Makino var. *ramosa*
分布：本，九
産地：北見；金井町－中興。
- 1448 アラゲサドザサ（ウラゲサドザサ）
Sasaella aikawensis (Nakai) Nakai ex Koidz.
分布：佐渡；相川町，池上義信 (1934)
産地：北見；相川町
- 1449 エッサシノ
Sasaella shiobarensis (Hakai) Nakai ex Koidz.)
var. *yessaensis* (Koidz.) S. Suzuki.
分布：佐渡；佐和田町－二宮，池上義信 (Sep. 28, 1938)
ウラゲサドザサのsyn.
- 1450 ウラゲサドザサ
Arundinaria sadoebsis (Makino) Koidz.
var. *infrapilosa* Koidz.
分布：岩手県，水沢町，岩淵初郎 (Sep. 23, 1937)
- 1451 チシマザサ（ネマガリダケ）※
Sasa kurilensis (Rupr.) Makino et Shibata
分布：北，本（鳥取県以北の日本海側）
産地：北見；金北山。野田；金北山。池上・石澤；分布図 (1) no. 46－金北山，妙見山，金剛山。
- 1452 ウラゲチシマザサ
Sasa pilokurilensis Nakai
産地：野田；両津市－羽二生。
- 1453 シャコタンチク
Sasa cernua Makino
forma *nebulosa* (Makino et Shibata) Tatewaki
分布：北（釧路半島），本（北部）
産地：北見；羽茂町－小泊・村山・亀嶽・上山田，両津

- 市-加茂歌代。野田；佐和田-真光寺。
- 1454 チマキザサ ※
Sasa palmata (Marliac) Nakai var. *palmata*
 分布：北，本（日本海側），四，九
 産地：野田；金井町。池上・石澤；分布図（3）no. 242-
 佐和田町-青野。
- 1455 シャコハンチク
Sasa palmata forma *nebulosa* (Makino) S. Suzuki
 産地：佐和田町-山田。
- 1456 クマイザサ（シナノザサ）※
Sasa senanensis (Franch. et Savat.) Rehder
 var. *senanensis*
 分布：北，本（日本海側），九（北部）
 産地：池上・石澤；分布図（3）NO. 243-金井町-水渡田・
 三瀬川，両津市-諏訪の上・旭・長江・椎泊・羽
 二生，相川町-南沢，真野町，小木町-堂釜。
- 1457 フシゲクマイザサ
Sasa senanensis
 forma *hispidula* (Tatewaki) S. Suzuki
 分布：北，本
 産地：新穂村-行谷。
- 1458 リョウツザサ
Sasa ikegamii Nakai
 分布：佐渡；両津市-長江，池上義信（Feb. 20, 1935）
 産地：北見；両津市-加茂歌代。野田；両津市。（クマイ
 ザサのsyn.）
- 1459 アイカワザサ
Sasa yahikoensis Makino var. *glabella* Nakai
 分布：佐渡；相川町-南沢，池上義信（Dec. 12, 1934）
 産地：北見；相川町-広間ヶ岡。野田；相川町。
 ノート：シコタンザサ *Sasa yahikoensis*
 var. *depauperata* (Takeda) S. Suzuki のsyn.
- 1460 クマザサ ※
Sasa veitchii (Carr.) Rehder var. *veitchii*
 分布：日本全国で植栽
 産地：各地の庭園で植栽
- 1461 オオバザサ ※
Sasa megalophylla Makino et Uchida
 分布：北，本（日本海側）
 産地：金井町-横谷。
- 1462 ミヤコザサ
Sasa nipponica (Makino) Makino et Shibata
 分布：北（日高南部），本（太平洋側），四
 産地：北見；金井町-千種。

やし科

- 1463 シュロ ※
Trachycarpus fortunei (Hock.) H. Wendl.
 分布：本（関東以西植栽），九（南部）
 産地：北見；羽茂町-小泊，各地で自然繁殖。

さといも科

- 1464 カラスビシャク（ハンゲ）※
Pinellia ternata (Thunb.) Breit.
 分布：北，本，四，九，琉
 産地：北見；相川町-入川，両津市-梅津。野田；両津
 市，相川町-入川。
- 1465 マイツルテンナンショウ
Arisaema heterophyllum Blume
 分布：本（岩手県～岡山県），四，九
 産地：北見；真野町-経塚山・西三川（真保一輔）。
- 1466 ウラシマソウ ※
Arisaema thunbergii Blume
 subsp. *urashima* (Hara) Ohashi et J. Murata
 分布：北（日高，渡島），本，四，九（佐賀県）
 産地：北見；相川町-南片辺，両津市-梅津。野田；赤
 泊村-大杉，畑野町-経塚山，金北山，相川町-
 片辺。
- 1467 ヒロハテンナンショウ ※
Arisaema amurense Maxim.
 subsp. *robustum* (Engler) Ohashi et J. Murata
 分布：北，本（福井県以北の日本海側），九
 産地：北見；金北山，両津市-羽黒。野田；金北山，畑
 野町-多田。秋庭；佐和田町-真光寺山。
 ノート：syn. サドテンナンショウ *Arisaema sadoensis*
 Nakai 北見；両津市-梅津。
- 1468 マムシグサ ※
Arisaema serratum (Thunb.)
 Schott (*A. japonicum* Blume)
 分布：北，本，四，九
 産地：北見；両津市-梅津。秋庭；佐和田町-乙和池付
 近。
- 1469 ムラサキマムシグサ
Arisaema serratum Schott
 産地：野田；赤泊村-下川茂，佐和田町-二宮。
 ノート：マムシグサに含まれる
- 1470 コウライテンナンショウ
Arisaema japonicum Blume
 var. *atropurpureum* (Engler) Kitam.
 分布：北，本（近畿地方以北）
 産地：北見；相川町（真保一輔）。野田；赤泊村-下川
 茂，相川町-石花・戸中・大塚山。
- 1471 ミズバショウ ※
Lysichiton camtschatcense (L.) Schott
 分布：北，本（中部以北，兵庫県）日本海側
 産地：北見；両津市-長江・馬首。野田；金井町-千種，
 相川町-石花，両津市-馬首・杉池。
- 1472 ザゼンソウ ※
Symlocarpus foetidus Nutt.
 var. *latissimus* (Makino) Hara
 分布：北，本
 産地：北見；ドンデン，妙見山，相川町-南片辺。野田；

- 金北山, 相川町-船山。秋庭; 妙見山麓。
- 1473 ヒメザゼンソウ ※
Symlocarpus nipponicus Makino
分布: 北, 本
産地: 北見; 金井町-平, 両津市-加茂歌代。野田; 金井町-平, 両津市-加茂歌代。
- 1474 ショウブ ※
Acorus calamus L.
分布: 北, 本, 四, 九 温~暖帯
産地: 北見; 羽茂町-小泊, 相川町-千本。野田; 真野町-西三川, 金井町-新保, 両津市-馬首。
- 1475 セキショウ ※
Acorus gramineus Soland
分布: 本, 四, 九
産地: 北見; 相川町-千本, 両津市-河崎。野田; 真野町-西三川, 金井町, 両津市-馬首, 畑野町, 相川町-金北山相川口。
- うきくさ科
- 1476 ウキクサ ※
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.
分布: 日本全土
産地: 北見; 羽茂町-小泊。野田; 金井町-中興, 佐和田町-乙和池。
- 1477 アオウキクサ
Lemna perpusilla Torrey
分布: 日本全土
産地: 北見; 羽茂町-小泊。野田; 金井町。
- 1478 コウキクサ
Lemna minor L.
分布: 北, 本, 四, 九
産地: 北見; 畑野町-坊ヶ浦。
- みくり科
- 1479 ミクリ ※
Sparganium erectum L.
分布: 北, 本, 四, 九
産地: 北見; 羽茂町-天澤。野田; 真野町, 相川町-入川。
- 1480 タマミクリ
Sparganium glomeratum Laest.
分布: 北, 本(中北部)
産地: 北見; ドンデン, 羽茂町-村山。
- 1481 ナガエミクリ
Sparganium japonicum Rothert
分布: 本, 四, 九
産地: 野田; 真野町
- 1482 ヒメミクリ ※
Sparganium stenophyllum Maxim.
分布: 北, 本, 四, 九, 琉
産地: 北見; 佐和田町-乙和池浮島。
- がま科
- 1483 ガマ ※
Typha latifolia L.
分布: 北, 本, 四, 九
産地: 北見; 真野町-田切須。
- 1484 コガマ
Typha orientalis Presl
分布: 本, 四, 九
産地: 北見; 相川町-後尾・入川。野田; 相川町-石花。
- かやつりぐさ科
- 1485 オニスゲ (ミクリスゲ)
Carex dickinsii Franch. et Savat.
分布: 北, 本, 四, 九
産地: 中村・長尾; 両津市-山居池。
- 1486 シオクグ ※
Carex scabrifolia Steud.
分布: 北, 本, 四, 九, 琉
産地: 中村・長尾; 小木町-深浦。
- 1487 コウボウシバ ※
Carex pumilla Thunb.
分布: 北, 本, 四, 九, 琉
産地: 北見; 羽茂町-素浜。野田; 相川町-入川, 佐和田町-河原田。中村・長尾; 佐渡。秋庭; 佐和田町-河原田。
- 1488 カサスゲ ※
Carex dispalata Boott
分布: 北, 本, 四, 九
産地: 北見; 両津市-下横山, 羽茂町-小泊, 相川町-北狄。野田; 新穂村, 赤泊村-下川茂, 佐和田町-二宮。中村・長尾; 佐渡。秋庭; 佐和田町-石田妙照寺。
- 1489 ヤワラスゲ ※
Carex transversa Boott
分布: 本, 四, 九, 琉
産地: 北見; 赤泊村 (真保一輔)。野田; 赤泊村。中村・長尾; 佐渡。
- 1490 アワボスゲ ※
Carex brownii Tuckerm.
分布: 北, 本, 四, 九
産地: 野田; 相川町。中村・長尾; 羽茂町-大谷。池上・石澤; 分布図(3)no. 244-相川町-下戸。
- 1491 タチスゲ
Carex maculata Boott
分布: 本, 四, 九, 琉
産地: 野田; 相川町-関。中村・長尾; 羽茂町-西方。
- 1492 ミヤマシラスゲ ※
Carex olivacea Boott var. *angustior* Kukenth.
分布: 北, 本, 四, 九
産地: 中村・長尾; 佐和田町-青野, 相川町-大倉越え。

- 1493 ナキリスゲ ※
Carex lenta D. Don
 分布：本(関東以西), 四, 九
 産地：北見；相川町-青野峠。野田；佐和田町-二宮, 両津市-内海府。中村・長尾；羽茂町-西方。池上・石澤；分布図(2)no. 144-両津市-鷺崎・片野尾弁天, 金井町-吉井, 真野町-大須, 赤泊村。
- 1494 ヒメシラスゲ ※
Carex mollicula Boott
 分布：北, 本, 四, 九
 産地：北見；相川金北山南片刃道。野田；相川町-片刃, 金北山。中村・長尾；佐渡。
- 1495 ヒゴクサ ※
Carex japonica Thunb.
 分布：北, 本, 四, 九
 産地：北見；金井町-中興。野田；アオネバ越え。中村・長尾；羽茂町-大谷。
- 1496 エナシヒゴクサ ※
Carex aphanolepis Franch. et Savat.
 分布：北, 本, 四, 九
 産地：北見；ドンデン。野田；相川町-石花。中村・長尾；両津市-梅津。
- 1497 シラコスゲ ※
Carex rhizopoda Maxim.
 分布：北, 本, 四, 九
 産地：北見；佐和田町-真光寺(真保一輔)。野田；金北山, 大塚山, 両津市-真更川。中村・長尾；佐渡。秋庭；佐和田町-真光寺山。
- 1498 ホソシラコスゲ
Carex rhizopoda Maxim. var. *longior* Maxim.
 産地：北見；金北山(真保一輔)
- 1499 ヒカゲハリスゲ(ハリスゲ) ※
Carex onoei Franch. et Savat.
 分布：北, 本
 産地：秋庭；妙見山腹
- 1500 マツバスゲ
Carex bivensis Franch.
 分布：本, 四, 九
 産地：北見；羽茂町-小泊。野田；金井町-中興, 金北山。中村・長尾；経塚山, 妙見山, 羽茂町-小泊。
- 1501 ジュズスゲ ※
Carex ischnostachya Steud.
 分布：北, 本, 四, 九, 琉
 産地：北見；両津市-真更川・笠取峠。野田；金北山相川口。中村・長尾；佐渡。池上・石澤；分布図(3)no. 247-両津市-藻浦・野城・杉池, 相川町-大塚山, 金井町-貝塚, 佐和田町-乙和池, 真野町-経塚山・西三川, 赤泊村-外山, 小木町-小比叡。
- 1502 タガネソウ ※
Carex siderosticta Hance
 分布：北, 本, 四, 九
 産地：北見；新穂村(真保一輔)。野田；赤泊村, 新穂村。中村・長尾；佐渡。秋庭；金井町-平清水。
- 1503 コジュズスゲ ※
Carex parciflora Boott
 var. *macroglossa* (Franch. et Savat.) Ohwi
 分布：北, 本, 九
 産地：北見；相川町(真保一輔)。野田；相川町-高千。中村・長尾；妙見山。
- 1504 グレーンスゲ
Carex parciflora Boott var. *parciflora*
 分布：北, 本(東北地方, 中部地方北部)
 産地：北見；相川町(真保一輔)。野田；相川町-高千。中村・長尾；妙見山。
- 1505 タマツリスゲ
Carex filipes Franch. et Savat.
 分布：野田；国府川
- 1506 オオタマツリスゲ ※
Carex filipes var. *rouyana* (Franch.) Kükenth.
 分布：本
 産地：池上・石澤；分布図(2)p. 405-相川町-大塚山。
- 1507 ミヤマジュズスゲ ※
Carex dissitiflora Franch.
 分布：北, 本, 四, 九
 産地：北見；相川町-入川(真保一輔)。野田；相川町-入川。中村・長尾；相川町-関越え。
- 1508 アイズスゲ
Carex hondoensis Ohwi
 分布：本(中北部)
 産地：池上・石澤；分布図(2)no. 140-(玉城1968)。
- 1509 ヒメスゲ ※
Carex oxyandra (Franch. et Savat.) Kudo
 分布：北, 本, 四, 九
 産地：北見；ドンデン。野田；金北山。中村・長尾；金北山, 妙見山。
- 1510 ヒカゲスゲ ※
Carex lanceolata Boott
 分布：北, 本, 四, 九
 産地：北見；真野町-田切須。野田；真野町-西三川。中村・長尾；佐渡。池上・石澤；分布図(2)no. 142-相川町-下相川町・大浦, 新穂村-中村・ときセンター, 真野町-西三川。
- 1511 アオバスゲ ※
Carex insanae Koidz.
 var. *papillativalmis* (Ohwi) Ohwi
 分布：本(中部地方以西), 四, 九
 産地：池上・石澤；分布図(3)no. 246-両津市-上横山。
- 1512 ヒロバスゲ ※
Carex insanae Koidz. var. *insanae*
 分布：北, 本(日本海側)
 産地：北見；羽茂町-村山。野田；真野町-西三川・真

- 野, 畑野町-多田, 金北山, 大塚山。中村・長尾;
佐渡。池上・石澤;分布図(2)no. 141-佐渡全域。
- 1513 ホソバカンスゲ ※
Carex morrowii Boott
var. *temnolepis* (Franch.) Ohwi
分布: 本 (日本海側)
産地: 中村・長尾;相川町-戸地。
ノート: syn. サドカンスゲ
- 1514 オクノカンスゲ
Carex foliosissima Fr. Schm.
分布: 北, 本, 四, 九
産地: 北見; 金北山, ドンデン(真保一輔)。野田; 金北山, 相川町-入川, 両津市-梅津。中村・長尾; 佐渡。
- 1515 ヒメカンスゲ ※
Carex conica Boott
分布: 北(西南部), 本, 四, 九
産地: 北見; 相川町-矢柄, 羽茂町-妹背山。野田; 真野, 金北山。中村・長尾; 佐渡。秋庭; 佐和田町-真光寺山。
- 1516 ミヤマカンスゲ ※
Carex dolichostachya Hayata
var. *glaberrima* (Ohwi) T. Koyama
分布: 北, 本, 四, 九
産地: 北見; 羽茂町-村山。野田; 金北山, 経塚山。中村・長尾; 佐渡。秋庭; 佐和田町-真光寺山。
- 1517 コップモエギスゲ(ワカモエギ, ヒメモエギ)
Carex tristachya Thunb.
var. *pocilliformis* Kükenth.
分布: 本, 四, 九, 琉
産地: 中村・長尾; 羽茂町-西方。
- 1518 ホンモンジスゲ
Carex pisiformis Boott
分布: 本(関東地方南西部, 伊豆半島)
産地: 北見; 相川町-金北山南片辺道。野田; 真野町-西三川, 赤泊村-大杉。
- 1519 ニシノホンモンジスゲ ※
Carex stenostachys Franch. et Savat.
分布: 本(中部以西)
産地: 野田; 佐和田町-二宮, 新穂村, 相川町。中村・長尾; 妙見山。
- 1520 コシノホンモンジスゲ
Carex stenostachys var. *ikegamiana* T. Koyama
分布: 本(北陸地方)
産地: 中村・長尾; 佐渡
- 1521 ゴンゲンスゲ
Carex sachalinensis Fr. Schm. var. *sachalinensis*
分布: 北, 本(中部以北)
産地: 北見; 金北山, 両津市-ショラン堂山。
- 1522 オオイトスゲ
Carex sachalinensis
var. *alterniflora* (Franch.) Ohwi
分布: 北, 本, 四, 九
産地: 北見; 真野町-四日町。野田; 真野町-西三川。
- 1523 アオスゲ ※
Carex breviculmis R. Br.
分布: 北, 本, 四, 九, 琉
産地: 北見; 相川町-青野峠。野田; 佐和田町-二宮。中村・長尾; 佐渡。
- 1524 イトアオスゲ
Carex breviculmis var. *discoidea* Boott
産地: 北見; 相川, 経塚山(真保一輔)。野田; 赤泊村, 経塚山, 金北山。中村・長尾; 金北山。
- 1525 ハマアオスゲ ※
Carex fibrillosa Franch. et Savat.
分布: 本, 四, 九, 琉
産地: 北見; 真野町-新町。中村・長尾; 真野町-新町。
- 1526 メアオスゲ
Carex leucochlora Bunge
var. *aphanandra* T. Toyama
産地: 中村・長尾; 相川町-大倉越え。
- 1527 ノゲアオスゲ
Carex leucochlora Bunge
var. *longearistata* Kitagawa
産地: 中村・長尾; 小木町-宿根木。
- 1528 クサスゲ
Carex rugata Ohwi
分布: (北), 本, 四, 九
産地: 北見; 金北山。野田; 相川町-金北山片辺道。
- 1529 シバスゲ
Carex nervata Franch. et Savat.
分布: (北), 本, 四, 九
産地: 中村・長尾; 佐渡
- 1530 チャシバスゲ
Carex caryophyllea Latour.
var. *microtricha* (Franch.) Kükenth.
分布: 北, 本(中北部)
産地: 中村・長尾; 真野町-新町。
- 1531 ショウジョウスゲ ※
Carex blepharicarpa Franch.
分布: 北, 本, 四, 九
産地: 北見; 金北山(真保一輔)。野田; 金北山, 新穂村, 佐和田町-二宮。中村・長尾; 佐渡。
- 1532 タカネショウジョウスゲ
Carex blepharicarpa var. *dueensis* Akiyama
産地: 北見; 相川町-山の神。野田; 相川町。
- 1533 ナルコスゲ ※
Carex curvicolis Franch. et Savat.
分布: 北(西南部), 本, 四, 九
産地: 北見; 両津市-鷺崎。野田; 経塚山。中村・長尾;

- 佐渡。
- 1534 タヌキラン ※
Carex podogyna Franch. et Savat.
分布：北（西南部），本（中部以北）
産地：北見；相川町－北狄・矢柄。中村・長尾；相川町－外海府。秋庭；相川町－北狄。
- 1535 ヤマテキリスゲ ※
Carex flabellata Lev. et Vant.
分布：北，本
産地：中村・長尾；相川町
- 1536 ヒメゴウソ（アオゴウソ） ※
Carex phacota Spreng.
分布：北，本，四，九，琉
産地：北見；両津市－長江金北山道。野田；金北山，金井町，新穂村，真野町－西三川，小木町－蓮華峯。中村・長尾；佐渡。
- 1537 ゴウソ ※
Carex maximowiczii Miq.
分布：北，本，四，九，琉
産地：北見；両津市－梅津。野田；真野町－真野・西三川。中村・長尾；佐渡。秋庭；佐和田町－石田妙照寺。
- 1538 ホシナシゴウソ ※
Carex maximowiczii var. *levisaccus* Ohwi
分布：北，本，四，九，琉
産地：中村・長尾；佐渡
- 1539 チャボゴウソ
Carex maximowiczii var. *minor* Akiyama
産地：北見；相川町－金北山南片辺道，両津市－梅津。野田；金北山片辺道。
- 1540 ヤマアゼスゲ
Carex heterolepis Bunge
分布：北，本，九
産地：北見；佐和田町－山田。
- 1541 タニガワスゲ ※
Carex forficula Franch. et Savat.
分布：北（西南部），本，四，九
産地：北見；小木町（真保一輔）。野田；小木町。中村・長尾；羽茂町－大橋。
- 1542 アゼスゲ ※
Carex thunbergii Steud.
分布：北，本
産地：北見；ドンデン。野田；相川町－金北山片辺道・入川，赤泊村，佐和田町－二宮。秋庭；金井町－平清水。
- 1543 オオアゼスゲ（エゾアゼスゲ）
Carex thunbergii
var. *appendiculata* (Trautv.) Ohwi
分布：北，本
産地：野田；佐和田町－乙和池浮島。
- 1544 カワラスゲ（タニスゲ） ※
Carex incisa Boott
分布：北，本
産地：北見；佐和田町－真光寺。野田；金北山，新穂村。中村・長尾；佐渡。秋庭；相川町－二見曼荼羅寺。
- 1545 アズマナルコ（ミヤマナルコ） ※
Carex shimidzensis Franch.
分布：北，本，九
産地：中村・長尾；金北山，赤泊村－下川茂
- 1546 サドスゲ ※
Carex sadoensis Franch.
分布：北，本（中北部，伯耆大山）
産地：北見；両津市－梅津。野田；金北山，両津市－梅津，真野町－西三川，小木町。亘理；相川町－大倉。中村・長尾；佐渡。秋庭；佐和田町－真光寺山。池上・石澤；分布図(1)no. 47－両津市－梅津，相川町－下相川町・関・大塚山，金井町－妙見山・新保川，畑野町－経塚山。
- 1547 イッポンスゲ（シロハリスゲ）
Carex tenuiflora Wahlenb.
分布：北，本（日光戦場ヶ原）
産地：北見；両津市－梅津。
- 1548 ヤチカワズスゲ ※
Carex omiana Franch. et Savat.
分布：北，本，四，九
産地：北見；ドンデン。中村・長尾；妙見山。
- 1549 カワズスゲ
Carex omiana var. *monticola* Ohwi
分布：北，本（中部以北）
産地：北見；妙見山，相川町－青野峠。秋庭；妙見山腹。
- 1550 タカネマスクサ ※
Carex planata Franch. et Savat.
分布：北（石狩），本，四，九
産地：北見；相川町－石花，両津市－鷲崎。野田；相川町－戸中・石花。中村・長尾；羽茂町－大谷・西方。秋庭；相川町－石花。
- 1551 マスクサ ※
Carex gibba Wahlenb.
分布：本，四，九
産地：北見；相川町－大ザレ。中村・長尾；小木町。池上・石澤；分布図(3)no. 245－相川町－下相川，小木町－強清水・深浦・宿根木・小比叡。
- 1552 コウボウムギ（フデクサ） ※
Carex kobomugi Ohwi
分布：北（西海岸），本，四，九，琉
産地：北見；両津市－願，羽茂町－素浜，真野町－新町。野田；真野町－西三川。中村・長尾；佐渡。秋庭；佐和田町－河原田海岸。
- 1553 ミノボロスゲ ※
Carex albata Boott
分布：北（西南部），本（中北部）

- 産地：野田；国府川
- 1554 クロカワズスゲ ※
Carex arenicola Fr. Schm.
分布：北, 本, 四, 九
産地：中村・長尾；妙見山, 相川町-二見, 赤泊村。
- 1555 ウスイロスゲ (エゾカワズスゲ)
Carex pallida C. A. Mey.
分布：北, 本(北部)
産地：北見；佐渡
- 1556 ヒトモトススキ (シシキリガヤ) ※
Cladium chinense Nees
分布：本(関東地方, 能登半島以西), 四
産地：池上・石澤；分布図(2)no. 405-両津市-北鶴島。
- 1557 オオイヌノハナヒゲ ※
Rhynchospora fauriei Franch.
分布：北, 本, 九
産地：池上・石澤；分布図(1)no. 48-両津市-北小浦。
- 1558 ミカヅキグサ ※
Rhynchospora alba (L.) Vahl.
分布：北, 本, 九
産地：北見；佐和田町-乙和池浮島。野田；真野町-西三川, 佐和田町-乙和池浮島。池上・石澤；分布図(3)no. 248-北小浦。
- 1559 クログワイ ※
Eleocharis kuroguwai Ohwi
分布：本(関東, 北陸地方以西), 四, 九
産地：北見；羽茂町-小泊, 新穂村-行谷
- 1560 マツバイ ※
Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult.
var. *longiseta* Svenson
分布：北, 本, 四, 九, 琉
産地：北見；小木町-澤。野田；佐和田町-二宮, 相川町-大倉。
- 1561 シカクイ ※
Eleocharis wichurae Bocklr.
分布：北, 本, 四, 九, 琉
産地：北見；金北山。野田；金北山, 両津市-河崎。秋庭；佐和田町-真光寺山。
- 1562 ハライ (オオハライ) ※
Eleocharis congesta D. Don
分布：北, 本, 四, 九, 琉
産地：北見；羽茂町-小泊。野田；金井町, 相川町-金北山小川口。
- 1563 エゾハライ ※
Eleocharis congesta
var. *thermalis* (Hulten) T. Koyama
分布：北, 本, 四, 九
産地：野田；畑野町-加茂林, 真野町。
- 1564 ヒメハライ ※
Eleocharis kamschatica (C. A. Mey.) Komar.
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；佐渡。野田；相川町-二見・入川。
- 1565 クロハライ
Eleocharis kamschatica forma *reducta* Ohwi
産地：北見；相川町-入川。野田；相川町-入川。秋庭；相川町-河内海岸。
- 1566 ハタガヤ ※
Bulbostylis barbata (Rottb.) Kunth
分布：本, 四, 九, 琉
産地：北見；佐和田町-河原田。野田；佐和田町-河原田。
- 1567 イトハナビテンツキ
Bulbostylis densa (wall.) Hand. -Mazz.
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；真野町-四日町。
- 1568 イトテンツキ (クロハタガヤ)
Bulbostylis densa var. *capitata* (Miq.) Ohwi
分布：本(東海地方以西), 四, 九, 琉
産地：北見；真野町-四日町。
- 1569 ヒデリコ ※
Fimbristylis miliacea (L.) Vahl
分布：本, 四, 九, 琉
産地：北見；羽茂町-小泊。野田；両津市-水津・内海府, 金井町, 佐和田町-二宮, 相川町-小田。
- 1570 ヒメヒラテンツキ (クサツツキ, ヒメツツキ) ※
Fimbristylis autumnalis (L.) Roem. et Schult.
分布：北, 本, 四, 九, 琉
産地：北見；相川町-小田。
- 1571 ノテンツキ (ヒラテンツキ)
Fimbristylis comptanata (Retz.) Link
分布：本, 四, 九, 琉
産地：野田；相川町-二見。
- 1572 ヤマイ ※
Fimbristylis subbispicsta Nees et Mey.
分布：北, 本, 四, 九, 琉
産地：北見；ドンデン, 佐和田町-乙和池, 金井町-中興。野田；赤泊村, 金井町, 両津市-馬首・内海府, 相川町-入川。
- 1573 テンツキ
Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl
分布：北, 本, 四, 九, 琉
産地：野田；金井町-中興, 相川町-入川。
- 1574 ケテンツキ
Fimbristylis dichotoma forma *tomentosa* Ohwi
産地：北見；相川町-入川
- 1575 クロテンツキ
Fimbristylis diphyloides Makino
分布：本(関東, 佐渡以西), 四, 九, 琉
産地：北見；金井町-中興中之入堤。
- 1576 アゼテンツキ ※
Fimbristylis squarrosa Vahl
分布：北, 本,

- 産地：北見；羽茂町－亀脇。野田；金井町，佐和田町－二宮，相川町－入川。
- 1577 メアゼテンツキ ※
Fimbristylis squarrosa var. *esquarrosa* Makin
分布：本，四，九
産地：北見；両津市－馬首。野田；両津市－馬首。
- 1578 サギスゲ ※
Eriophorum gracile Koch
分布：北，本
産地：北見；羽茂町－大崎。
- 1579 アブラガヤ (アイバソウ， エゾアブラガヤ) ※
Scirpus wichurae Bocklfr.
分布：北，本，四，九
産地：北見；佐和田町－山田。野田；畑野町， 佐和田町－二宮。
- 1580 マツカサススキ
Scirpus mitsukurianus Makino
分布：本，四，九
産地：野田；相川町－春日崎。
- 1581 エゾウキヤガラ (コウキヤガラ) ※
Scirpus planiculmis Fr. Schm.
分布：北，本，四，九，琉
分布：北見；相川町－入川。野田；相川町－入川。巨理；相川町。
- 1582 ホタルイ ※
Scirpus juncoides Roxb.
分布：北，本，四，九，琉
産地：北見；相川町－入川。野田；畑野町－松ヶ崎， 佐和田町－山田。
- 1583 フトイ ※
Scirpus tabernaemontani Gmel.
分布：北，本，四，九，琉
産地：北見；両津市－長江。野田；相川町－二見。
- 1584 カンガレイ ※
Scirpus triangulatus Roxb.
分布：北，本，四，九，琉
産地：北見；真野町－田切須， 両津市－吾湯。野田；相川町－小田。
- 1585 サンカクイ ※
Scirpus triqueter L.
分布：北，本，四，九，琉
産地：北見；羽茂町－小泊。
- 1586 ヒンジカヤツリ ※
Lipocarpa microcephala (R. Br.) Kunth
分布：本，四，九，琉
産地：北見；真野町－四日町， 佐和田町－八幡。野田；両津市－加茂。
- 1587 ヒメクグ ※
Cyperus brevifolius (Rottb.) Hassk.
var. *leiolepis* (Franch. et Savat.) T. Koyama
分布：北，本，四，九，琉
- 産地：北見；ドンデン。野田；金北山相川口。
- 1588 アイダクグ (タイワンヒメクグ)
Cyperus brevifolius var. *brevifolius*
分布：本，四，九，琉 暖地生
産地：野田；金井町－中興， 両津市－鷺崎・内海府， 相川町－金北山小川口。
- 1589 ミズガヤツリ ※
Cyperus serotinus Rottb.
分布：北，本，四，九，琉
産地：北見；両津市－梅津・吾湯。
- 1590 カワラスガナ ※
Cyperus sanguinolentus Vahl
分布：北，本，四，九，琉
産地：北見；ドンデン。野田；両津市－外海府・弾崎。
- 1591 イガカヤツリ
Cyperus polystachyos Rottb.
分布：本 (関東以西)，四，九，琉
産地：野田；畑野町－松ヶ崎
- 1592 カンエンガヤツリ
Cyperus exaltatus Retz.
var. *iwasakii* (Makino) T. Koyama
分布：本
産地：野田；金井町－朝鮮より移植， 水田で栽培， 細工物， 敷物， 敷物の原料。
- 1593 ウシクグ ※
Cyperus orthostachyus Franch. et Savat.
分布：北，本，四，九
産地：北見；金井町－中興。野田；金井町， 畑野町－松ヶ崎， 両津市－外海府。
- 1594 コゴメガヤツリ ※
Cyperus iria L.
分布：本，四，九，琉
産地：北見；羽茂町－小泊。野田；金井町， 両津市－馬首。
- 1595 カヤツリグサ (キガヤツリ) ※
Cyperus microiria Steud.
分布：本，四，九
産地：北見；羽茂町－小泊， 両津市－梅津。野田；相川町－春日崎， 両津市－鷺崎。
- 1596 タマガヤツリ ※
Cyperus difformis L.
分布：北，本，四，九，琉
産地：北見；羽茂町－小泊， 両津市－梅津。野田；金井町。
- 1597 コアゼガヤツリ ※
Cyperus haspan L.
分布：本，四，九，琉
産地：北見；相川町－入川。野田；相川町－入川。
- 1598 ヒナガヤツリ ※
Cyperus flaccidus R. Br.
分布：本，四，九

産地：北見；真野町-四日町。野田；相川町-入川。

1599 ニイガタガヤツリ

Cyperus niigatensis Ohwi

分布：本（新潟県）

産地：野田；金井町

1600 シロガヤツリ

Cyperus pacificus (Ohwi) Ohwi

分布：北、本

産地：北見；金井町-中興，両津市-鷺崎。野田；金井町。

ばしょう科

1601 バショウ

Musa basjoo Sieb.

分布：本（関東以西），四，九 原産地不明（中国あるいは
沖縄原産か？）

産地：金井町-中興。植栽

しょうが科

1602 ミョウガ ※

Zingiber mioga (Thunb.) Roscoe

分布：本，四，九 中国より渡来？

産地：北見；相川町-入川。佐渡全域で栽培

らん科

1603 コアツモリソウ ※

Cypripedium debile Reichb. fil.

分布：北（西南部），本（中北部），四（高知県），九（熊本
県）

産地：北見；金井町-大和田，真野町-経塚山。野田；
金井町-大和田。植田；金井町-大和田。

1604 クマガイソウ ※

Cypripedium japonicum Thunb.

分布：北（西南部），本，四，九

産地：北見；相川町-入川・矢柄・長坂，両津市-梅津・
和木。野田；両津市-河崎，畑野町-多田，新穂
村-国見山，相川町-入川。植田；金井町-貝塚，
相川町-岩谷口，畑野町-栗野江。秋庭；佐和田
町-乙和池。

1605 ミズトンボ ※

Habenaria sagittifera Reichb. fil.

分布：北（西南部），本，四，九

産地：北見；金井町-千種。池上・石澤；分布図(2) no.
148-金井町-新保川上流・中興。植田；経塚山。

1606 トンボソウ ※

Tulotis ussuriensis (Regel) Hara

分布：北，本，四，九

産地：北見；佐和田町-真光寺。植田；両津市-横山，
畑野町-小倉，経塚山。秋庭；佐和田町-真光寺
山。

1607 アオチドリ

Coeloglossum viride (L.) Hartm.

var. *bracteatum* (Willd.) Richter

分布：北，本，四

産地：植田；金北山

1608 ツレサギソウ

Platanthera japonica (Thunb.) Lindl.

分布：北（西南部），本，四，九，琉

産地：北見；相川町-入川。植田；畑野町-小倉，相川
町-戸地。

1609 ミズチドリ

Platanthera hologlottis Maxim.

分布：北，本，四，九

産地：北見；相川町-入川。野田；金北山，金井町。

1610 ジンバイソウ ※

Platanthera florenti Franch. et Savat.

分布：北，本，四，九

産地：北見；金北山，畑野町-飯出山。野田；金北山，金
井町，両津市-岩首ツボネ山。植田；畑野町-小
倉，金北山。

1611 オオヤマサギソウ ※

Platanthera sachalinensis Fr. Schm.

分布：北，本，四，九

産地：北見；金北山（真保一輔）。野田；金北山。植田；
金北山，ドンデン。

1612 ヤマサギソウ

Platanthera mandarinorum Reichb. fil.

var. *brachycentron* (Franch. et Savat.) Koidz.

分布：北，本，四，九

産地：北見；両津市-梅津。植田；金井町-中興。

1613 キソチドリ ※

Platanthera ophrydioides Fr. Schm.

var. *monophylla* Honda

分布：本（関東，東海の太平洋側）

産地：北見；金北山（真保一輔）。野田；金北山，大塚山。
植田；金北山，ドンデン。秋庭；妙見山腹。

1614 ウチョウラン

Orchis graminifolia (Reichb. fil.) Tang et Wang

分布：本（関東以西），四，九

産地：北見；相川町-入川・北片辺。野田；金北山~妙
見山，アオネバ越え，相川町-入川。植田；両津
市-梅津，相川町-北狄。

1615 ヒナチドリ

Orchis chidori (Makino) Schltr.

分布：本，四 日本特産

産地：植田；畑野町-小倉。長尾長治；経塚山頂。

1616 コアニチドリ

Amitostigma kinoshitae (Makino) Schltr.

分布：北，本（中部以北）

産地：野田；金北山。植田；（渡部貞吉）

- 1617 ノビネチドリ ※
Gymnadenia camtschatica (Cham.) Miyabe et Kudo
 分布：北, 本 (中北部), 四, 九
 産地：北見；相川町-入川・矢柄, 両津市-梅津, 畑野町-大地山。野田；畑野町-経塚山, 新穂村-国見山, 赤泊村-下川茂。植田；金北山, ドンデン, 相川町-戸地。秋庭；相川町-入川上流。
- 1618 オニノヤガラ ※
Gastrodia elata Blume
 分布：北, 本, 四, 九
 産地：北見；ドンデン, 相川町-真峰・船山, 羽茂町-小泊, 両津市-梅津・馬首。野田；妙見山。植田；金北山。
- 1619 トキソウ ※
Pogonia japonica Reichb. fil.
 分布：北, 本, (四), (九)
 産地：野田；金北山, 畑野町-松ヶ崎。植田；両津市-北小浦。
- 1620 ヤマトキソウ ※
Pogonia minor (Makino) Makino
 分布：北, 本, 四, 九
 産地：北見；相川町-入川。植田；金北山。秋庭；佐和田町-真光寺山。
- 1621 ホクリクムヨウラン ※
Lecanorchis hokurikuensis Masamune
 分布：本 (北陸地方, 東北地方南部)
 産地：池上・石澤；分布図 (1) no. 50。-金北山 (近藤福雄)。
- 1622 ムヨウラン
Lecanorchis japonica Blume
 分布：本 (東北地方南部以南), 四, 九
 産地：北見；金北山 (真保一輔)。野田；金北山。
- 1623 ツチアケビ ※
Galeola septentrionalis Reichb. fil.
 分布：北 (札幌以南), 本, 四, 九
 産地：北見；相川町-入川・北立島・船山。野田；相川町-入川。植田；相川町-戸地。
- 1624 キンラン ※
Cephalanthera falcata (Thunb.) Blume
 分布：本, 四, 九
 産地：北見；羽茂町-大草, 相川町-入川, 両津市-豊岡。野田；新穂村-国見山。植田；畑野町-小倉, 相川町-岩谷口。
- 1625 ササバギンラン ※
Cephalanthera longibracteata Blume
 分布：北, 本, 四, 九
 産地：北見；佐和田町-乙和池, 相川町-北立島, 両津市-梅津。野田；真野町。植田；金井町-中興・貝塚・新保。秋庭；佐和田町-真光寺山。
- 1626 ギンラン ※
Cephalanthera erecta (Thunb.) Blume
 分布：本, 四, 九
 産地：北見；羽茂町-大草, 相川町-入川・青野峠。野田；金北山, 経塚山。植田；経塚山, 金井町-貝塚・中興。
- 1627 ユウシュンラン
Cephalanthera erecta var. *subaphylla* Ohwi
 分布：北, 本, 四, 九 稀
 産地：植田；畑野町-経塚山。
- 1628 カキラン ※
Epipactis thunbergii A. Gray
 分布：北, 本, 四, 九
 産地：北見；小木町-宿根木, 相川町-入川, 羽茂町-小泊。野田；小木町-蓮華峯, 金井町, 畑野町-松ヶ崎。植田；金井町-中興, 畑野町-小倉, 両津市-河崎。池上・石澤；分布図 (3) no. 249 - 両津市-北小浦・真更川, 畑野町-松ヶ崎。秋庭；佐和田町-真光寺山。
- 1629 アオフトバラン
Listera makinoana Ohwi
 分布：本, 四, 九
 産地：植田；ドンデン
- 1630 コフトバラン
Listera cordata (L.) R. Br. var. *japonica* Hara
 分布：北, 本 (中北部), 四
 産地：北見；相川町-船山, 金井町-貝塚。
- 1631 ベニシュスラン ※
Goodyera macrantha Maxim.
 分布：本 (関東以西), 四, 九
 産地：植田；相川町-戸地, 両津市-黒姫・北小浦。
- 1632 アケボノシュスラン ※
Goodyera foliosa (Lindl.) Benth.
 var. *maximowicziana* (Makino) F. Maek.
 分布：北, 本, 四, 九, 奄美大島
 産地：北見；ドンデン, 畑野町-大地山。植田；畑野町-女神山, 両津市-金剛山, ドンデン。
- 1633 ミヤマウズラ ※
Goodyera schlechtendaliana Reichb. fil.
 分布：北 (中部), 本, 四, 九, 奄美大島
 産地：北見；ドンデン, 相川町-北狄, 羽茂町-村山。植田；佐和田町-西山田, 畑野町-栗野江, 金井町-中興。
- 1634 フナシミヤマウズラ (アオミヤマウズラ)
Goodyera schlechtendaliana forma *similis* Makino
 産地：野田；両津市-両尾。
- 1635 シュスラン (ビロードラン)
Goodyera velutina Maxim.
 分布：本 (関東南部以西), 四, 九
 産地：野田；赤泊村
- 1636 ネジバナ (モジズリ) ※
Spiranthes sinensis (Pers.) Ames
 var. *amoena* (M. Biebersson) Hara

- 分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；相川町-入川, 羽茂町-小泊。野田；両津市-岩首, 新穂村, 金井町, 相川町。植田；金井町-千種・中興, 佐和田町-真光寺。
- 1637 シロモジズリ
Spiranthes sinensis
var. *amoena* forma *albescens* Honda
産地：北見；相川町-入川, 両津市-梅津。植田；金井町-千種。
- 1638 ヒトツボクロ ※
Tipularia japonica Matsum.
分布：本, 四, 九
産地：北見；羽茂町-飯岡。植田；金井町-中興・千種, 畑野町-経塚山。
- 1639 シラン
Bletilla striata (Thunb.) Reichb. fil.
分布：本(中南部), 四, 九, 琉
産地：庭園に植栽
- 1640 ジガバチソウ ※
Liparis krameri Franch. et Savat.
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；相川町-北片辺・入川。野田；金北山。
- 1641 クモキリソウ ※
Liparis kumokiri F. Maek.
分布：北, 本, 四, 九, 琉
産地：北見；相川町-石花・寒戸。野田；金北山, 相川町-石花。植田；金井町-中興・妙見山。池上・石澤；分布図(3)no. 250-両津市-岩首・真更川・杉池・長江・金北山祇い川・野城, 相川町-大塚山・戸地・大倉。秋庭；相川町-入川上流。
- 1642 ギボウシラン
Liparis auriculata Blume
分布：北, 本, 四, 九, 屋久島
産地：北見；妙見山, 相川町-北片辺。
ノート：syn. キンボクラン 牧野富太郎博士命名
- 1643 セイタカズズムシソウ ※
Liparis japonica (Miq.) Maxim.
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；相川町-入川。植田；ドンデン。秋庭；佐和田町-妙見山腹。
- 1644 スズムシソウ
Liparis makinoana Schltr.
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；相川町-北片辺・入川, 両津市-和木, 新穂村-大野, 畑野町-大地山。野田；相川町-高千。植田；ドンデン, 畑野町-小倉。
- 1645 コイチョウラン ※
Ephippianthus schmidtii Reichb. fil.
分布：北, 本(中北部), 四(剣山, 白髪山)
産地：野田；金北山。植田；金北山。
- 1646 キエビネ
Calanthe sieboldii Decne.
分布：本(和歌山県, 山口県), 四, 九
産地：北見；相川町-入川。野田；相川町-入川。
- 1647 エビネ ※
Calanthe discolor Lindl.
分布：北(西南部), 本, 四, 九, 琉
産地：北見；相川町-。野田；両津市-水津。植田；佐和田町-西山田, 相川町-入川, 畑野町-経塚山, 両津市-河崎。
- 1648 ナツエビネ ※
Calanthe reflexa Maxim.
分布：本, 四, 九
産地：北見；両津市-水津, 新穂村-大野, 畑野町-長谷。野田；畑野町-多田。植田；畑野町-経塚山・女神山, 金井町-貝塚。
- 1649 サルメンエビネ ※
Calanthe tricarinata Lindl.
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；相川町-南片辺。野田；新穂村-国見山。植田；畑野町-女神山, 両津市-河崎。
- 1650 サイハイラン ※
Cremastra appendiculata (D. Don) Makino
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；金北山, 金井町-千種。植田；畑野町-小倉・女神山, 金井町-千種・中興。池上・石澤；分布図(1)no. 49-両津市-梅津・鷲崎・藻浦・久知河内・水津・杉池, 畑野町-経塚山, 赤泊村-杉の浦, 真野町-西三川・金山, 新穂村-生え椿, 金井町-新保川, 小木町-強清水・鶴ヶ峰, 相川町-相川・石花・寒戸。
- 1651 トケンラン ※
Cremastra unguiculata (Finet) Finet
分布：北, 本, 四
産地：北見；佐和田町-乙和池。植田；両津市-ドンデン, 畑野町-経塚山, 金井町-千種。秋庭；佐和田町-乙和池付近。
- 1652 コケイラン ※
Oreorchis patens (Lindl.) Lindl.
分布：北, 本, 四, 九
産地：北見；金井町-新保, 野田；金北山, 真野町-真野, 新穂村-国見山, 赤泊村-下川茂。植田；相川町-関, 畑野町-女神山, 金井町-中興・千種。秋庭；佐和田町-真光寺祇い川上流。池上・石澤；分布図(2)no. 149-佐渡全域。
- 1653 イチヨウラン
Dactylostaix ringens Reichb. fil.
分布：北, 本, 四, 九
産地：植田；金北山

1654 シュンラン ※

Cymbidium goeringii (Reichb. fil.) Reichb. fil.

分布：北（奥尻島），本，四，九

産地：北見；羽茂町－村山。野田；畑野町－経塚山・多田，小木町－宿根木。植田；金井町－中興・千種，畑野町－経塚山。両津市－河崎。

おわりに

佐渡島は本土を離れること凡そ32kmの日本海上にあり、大佐渡と小佐渡が国中平野を挟んで南西から北東方向にほぼ平行にならんでいる、そして植物分布上よく問題にされる北緯38°線が島の中央を東西に走り、対馬暖流の影響で温暖な気候である。しかし海上に孤立する島嶼のため大佐渡の北西岸と大佐渡山脈の脊梁沿いは冬季の厳しい季節風の影響を受けている。島の植生は、日本海型気候の影響を受け、いくらかの日本海要素を包含する。島の沿岸部にはタブ、スタジイ、アカガシ、ウラジロガシやヤブツバキなどの常緑林が発達する。また海拔1173mの金北山を主峰とする大佐渡山脈は海拔凡そ400mからミズナラ林が、また500m～900mにブナの純林が現れる。そして金北山付近では海拔1000m以上にミヤマナラ群落が出現する。大佐渡山脈の尾根すじは海拔高の低いにもかかわらず高山性の植物が見られる。大佐渡には北方系の又小佐渡には南方系の植物が見られ、それぞれ南限や北限となるものもある。

1655 セッコク

Dendrobium moniliforme (L.) Sw.

分布：本，四，九，琉

産地：北見；相川町－北狄・石花・五十浦，両津市－和木。植田；相川町－北狄。

佐渡島は誕生してからの年代が浅くその故か特産種はなく僅かに海岸生のサドシオデ、サドアザミやシラゲエチゴトラノオなどの変種を見るのみである。特に興味のあることはヤマトグサやオオアカバナの隔離分布の見られるところである。

近年山岳の観光道路や林道の開発により山の奥地へ容易に入れるようになって、しかも山野草ブームの影響による盗掘で絶滅に瀕している稀少植物もある。

この目録は前記の各著者の記述をまとめたものであるが、著者間で目録の内容を互いに借用した物もあるようで、各著者の記述する産地の重複している所が多々見られる。その点ご容赦願いたい。本目録が諸賢のご参考になれば筆者のこの上ない喜びである。(2001年3月3日)

「佐渡島の植物」の目録追加

本間建一郎氏のまとめた目録に、編集のさいに追加部分があり、和名の後に※印を付した。印ある種は、新津植物資料室（積雪地域植物研究所）に蒐集保存している標本や資料を示している。※印の付していない種の中には確認や検討を要するものが含まれている。例えば、ラショウモンカズラは、北見秀夫氏の目録と新潟県植物分布図集第1集の掲載標本に記録があり、分布の再確認のために、佐渡島に訪れる都度注目してきた。分布図の第1集の標本は茎葉のみで花のついた個体でなく、オドリコソウの幼体のようであり、開花している個体の確認に努めてきた。特に、ラショウモンカズラの開花期に分布が記録されている地名付近の調査をしてきたが、まだ、確認できない現状である。従って本編の目録ではラショウモンカズラの和名の後に※印を付していない。

※印のない分類群には種内変異もあり、検討を要するものもある。また、※印のない種の中にはごく普通にあるのに、証拠となる標本や資料のないものもある。そのような種については、今後の調査による資料の追加が必要である。

種名索引

アの部					
アイアシ	75	アギナシ	68	アメリカヤマボウシ	45
アイアスカイノデ	5	アキニレ	14	アヤメ	74
アイカワザサ	83	アキノウナギツカミ	16	あやめ科	74
アイグロマツ	9	アキノエノコログサ	77	アラカシ	13
アイズスゲ	85	アキノキリンソウ	65	アラゲガマズミ	61
アイダクグ	89	アキノギンリョウソウ	48	アラゲサドザサ	82
アイヌソモソモ	78	アキノタムラソウ	56	アラゲヒョウタンボク	61
アイバソウ	89	アキノノゲシ	67	アリタソウ	19
アウチ	37	アキノハハコグサ	66	アリノトウグサ	44
あおい科	41	アキノミチヤナギ	16	ありのとうぐさ科	44
アオイスミレ	42	アキメヒシバ	77	アレチギシギシ	16
アオウキクサ	84	アクシバ	49	アレチマツヨイグサ	44
アオカシワ	13	アケビ	23	アワガエリ	81
アオカモジグサ	79	あけび科	23	アワゴケ	55
アオキ	44	アケボノシュスラン	91	あわごけ科	55
アオギリ	41	アケボノスギ	10	アワバナ	61
あおぎり科	41	アケボノソウ	51	アワブキ	38
アオコウガイゼキショウ	74	アサクラザンショウ	36	あわぶき科	38
アオゴウソ	87	アサツキ	71	アワボスゲ	84
アオジクマユミ	39	アサマツゲ	40	イの部	
アオスゲ	86	アシウスギ	10	イ	74
アオダモ	50	アシボソ	76	イガカヤツリ	89
アオチドリ	90	アスカイノデ	5	イガホオズキ	57
アオツズラフジ	23	アズキナシ	32	イグサ	74
アオナリヒラ	81	アスナロ	10	いぐさ科	74
アオナワシロイチゴ	31	アスヒカズラ	1	イケマ	52
アオネザサ	82	アズマイチゲ	21	イシカグマ	3
アオバスゲ	85	アズマギク	64	イソノキ	40
アオハダ	39	アズマザサ	82	イタドリ	17
アオビユ	19	アズマシャクナゲ	48	イタビカズラ	14
アオフタバラン	91	アズマナルコ	87	イタヤカエデ	38
アオホラゴケ	3	アズマネザサ	82	イタヤメイゲツ	38
アオミズ	15	アズマハンショウヅル	21	イチイ	11
アオミヤマウスラ	91	アゼオトギリ	25	いちい科	11
アオヤギソウ	70	アゼスゲ	87	イチイモドキ	10
アカイタヤ	38	アゼテンツキ	88	イチジク	14
アカガシ	13	アゼトウガラシ	58	イチビ	41
アカザ	19	アゼナ	58	イチヤクソウ	48
あかざ科	19	アセビ	49	いちやくそう科	47
アカシデ	13	アゼムシロ	62	イチョウ	9
アカソ	15	アッシ	14	いちょう科	9
アカツメクサ	33	アブノメ	58	イチヨウラン	92
アカネ	53	アブラガヤ	89	イチリンソウ	21
あかね科	52	アブラギリ	35	イッポンスゲ	87
アカバグミ	42	アブラススキ	76	イトアオスゲ	86
アカバナ	43	あぶらな科	26	イトイヌノヒゲ	75
あかばな科	43	アマチャ	28	イトテンツキ	88
アカマツ	9	アマチャヅル	43	イトハナビテンツキ	88
アカミノイヌツゲ	38	アマドコロ	72	イトマキイタヤ	38
アカメガシワ	36	アマナ	71	イヌイ	74
アカメヤナギ	11	アマニューウ	47	イヌウメモドキ	39
アキカラマツ	22	アマモ	69	イヌエンジュ	33
アキギリ	56	あまも科	69	イヌカミツレ	63
アキグミ	42	アミガサソウ	36	イヌガヤ	11
		アミガサユリ	71	いぬがや科	10
		アメリカセンダングサ	63	イヌガラシ	27
				イヌガンソク	7
				イヌグス	20
				イヌコウジュ	56
				イヌゴマ	57
				イヌコリヤナギ	12
				イヌザクラ	29
				イヌザンショウ	36
				イヌシダ	3
				イヌシデ	13
				イヌシロネ	56
				イヌスギナ	2
				イヌセンブリ	51
				イヌタデ	17
				イヌツゲ	38
				イヌドウナ	64
				イヌトウバナ	56
				イヌドクサ	2
				イヌナズナ	26
				イヌノヒゲ	75
				イヌハギ	35
				イヌビエ	76
				イヌビユ	19
				イヌブナ	13
				イヌホオズキ	58
				イヌムギ	79
				イヌムラサキ	54
				イヌヨモギ	64
				イヌワラビ	8
				いね科	75
				イノコズチ	19
				イノデ	5
				イノデモドキ	5
				イノモトソウ	4
				いのもとそう科	4
				いばらも科	69
				イブキジャコウソウ	56
				イブキスミレ	43
				イブキゼリモドキ	46
				イブキヌカボ	79
				イブキボウフウ	46
				イボクサ	75
				イモノキ	45
				イラクサ	15
				いらくさ科	15
				イワアカバナ	43
				イワイヌワラビ	8
				いわうめ科	47
				イワウメヅル	39
				イワオトギリ	25
				イワオモダカ	9
				イワカガミ	47
				イワガネゼンマイ	4
				イワガネソウ	4
				イワガラミ	28
				イワキンバイ	31
				イワシモツケ	29

イワゼキショウ	70	ウラゲサドザサ	82	エゾノサヤヌカグサ	78	オオカメノキ	61
イワテトウキ	47	ウラゲチシマザサ	82	エゾノヒルムシロ	69	オオカモメヅル	52
イワテナシ	32	ウラシマソウ	83	エゾノヨツバムグラ	53	オオキジノオ	3
イワテハタザオ	27	ウラジロ	3	エゾノレンリソウ	34	オオキツネノカミソリ	73
イワデンダ	7	ウラジロイチゴ	31	エゾハリイ	88	オオキツネヤナギ	12
いわでんだ科	7	うらじろ科	3	エゾヒナノウスツボ	58	オオキヌタソウ	52
イワナシ	48	ウラジロガシ	13	エゾヒメクラマゴケ	2	オオクジャクシダ	6
イワニガナ	68	ウラジロハコヤナギ	10	エゾフユノハナワラビ	2	オオクルマムグラ	53
イワノガリヤス	80	ウラジロハナヒリノキ	49	エゾホソイ	74	オオケタデ	16
イワハタザオ	27	ウラジロヨウラク	48	エゾミソハギ	43	オオケタネツケバナ	26
イワハリガネワラビ	7	うらぼし科	9	エゾユズリハ	36	オオゴマギ	60
イワヒバ	2	うり科	43	エゾヨモギ	63	オオコマユミ	39
いわひば科	1	ウリカワ	68	エゾリンドウ	51	オオコメツツジ	48
イワヒメワラビ	3	ウリノキ	44	エダウチチゴユリ	73	オオサクラソウ	50
イワフジ	33	うりのき科	44	エチゴキジムシロ	31	オオサトメシダ	8
イワヘゴ	6	ウリハダカエデ	38	エチゴトラノオ	59	オオサワハコベ	18
イワユリ	71	ウルシ	37	エッサシノ	82	オオジシバリ	68
ウ の 部		うるし科	37	エナシヒゴクサ	85	オオシュロソウ	70
ウキクサ	84	ウワバミソウ	15	エノキ	14	オオシラヒゲソウ	28
うきくさ科	84	ウワミズザクラ	29	エノキグサ	36	オオシロヤナギ	11
ウコギ	45	ウンモンチク	81	エノコログサ	77	オオダイコンソウ	32
うこぎ科	45	ウンラン	58	エノシマヨメナ	65	オオタチツボスミレ	42
ウゴツクバネウツギ	61	ウンリュウヤナギ	12	エビガライチゴ	31	オオタマツリスゲ	85
ウシクダ	89	エ の 部		エビヅル	41	オオチドメ	45
ウシタキソウ	44	エゴノキ	50	エビネ	92	オオツクバネウツギ	61
ウシノケグサ	78	えごのき科	50	エビモ	69	オオツルイタドリ	17
ウシノシッペイ	75	エゴマ	56	エンコウソウ	20	オオツルウメモドキ	40
ウシハコベ	18	エゾアジサイ	28	エンバク	80	オオデマリ	61
ウスアカカタバミ	35	エゾアゼスゲ	87	エンレイソウ	72	オオナルコユリ	72
ウスイロスゲ	88	エゾアブラガヤ	89	オ の 部		オオナンバンギセル	60
ウスイロツユクサ	75	エゾイタヤ	38	オウバイ	51	オオニガナ	68
ウスゲヤマザクラ	30	エゾイヌワラビ	8	オウレン	22	オオニワトコ	60
ウスノキ	49	エゾイボタ	51	オオアカウキクサ	9	オオネバリタデ	17
ウスバサイシン	24	エゾイラクサ	15	オオアカネ	53	オオバイボタ	51
ウスヒメワラビ	7	エゾウキヤガラ	89	オオアカバナ	43	オオバギボウシ	70
ウチダシミヤマシキミ	37	エゾウコギ	45	オオアキノキリンソウ	65	オオバグミ	42
ウチョウラン	90	エゾウラジロハナヒリノキ		オオアゼスゲ	87	オオバクロモジ	20
ウチワゴケ	3		49	オオアブラススキ	76	オオバコ	60
ウチワドコロ	73	エゾエノキ	14	オオアマドコロ	72	おおぼこ科	60
ウツギ	28	エゾエンゴサク	25	オオアレチノギク	64	オオバコナラ	13
ウツボグサ	57	エゾオオバコ	60	オオアワガエリ	81	オオバザサ	83
ウド	45	エゾカモジグサ	79	オオイカリソウ	23	オオバショリマ	7
ウドタラシ	47	エゾカワズスゲ	88	オオイタドリ	17	オオバスノキ	49
ウナギツカミ	16	エゾコゴメグサ	59	オオイチゴツナギ	78	オオバセンキュウ	47
ウバメガシ	13	エゾゴマナ	65	オオイトスゲ	86	オオバタネツケバナ	26
ウマゴヤシ	33	エゾシロネ	56	オオイヌタデ	17	オオバツルグミ	42
ウマノアシガタ	22	エゾタンポポ	68	オオイヌノハナヒゲ	88	オオハナウド	47
ウマノスズクサ	24	エゾツリバナ	39	オオイヌノフグリ	59	オオハナワラビ	2
うまのすずくさ科	24	エゾツルキンバイ	31	オオイワカガミ	47	オオバノアmaksサシダ	4
ウマノミツバ	46	エゾニュウ	47	オオウシノケグサ	78	オオバノイノモトソウ	4
ウミミドリ	50	エゾヌカボ	80	オオウバユリ	71	オオバノハチジョウシダ	4
ウメガサソウ	48	エゾノウワミズザクラ	29	オオエノコログサ	77	オオバノヨツバムグラ	53
ウメバチソウ	28	エゾノオドリコソウ	57	オオカサモチ	46	オオバヒョウタンボク	61
ウメモドキ	39	エゾノギシギシ	16	オオカニコウモリ	64	オオバマユミ	39
ウラギンツルグミ	42	エゾノクロウメモドキ	40	オオカニツリ	80	オオバヤエムグラ	53
ウラゲオオトネリコ	50	エゾノコギリソウ	62	オオカマツカ	32	オオハリイ	88

オオハンゴンソウ	63	オニシモツケ	31	カツラ	20	カンボク	60
オオヒナノウスツボ	58	オニスゲ	82	かつら科	20	キの部	
オオヒメワラビ	8	オニタビラコ	67	カナダアキノキリンソウ	65	キエビネ	92
オオヒメワラビモドキ	8	オニツルウメモドキ	40	カナビキソウ	15	キカシグサ	43
オオヒロハノイヌワラビ	8	オニドコロ	73	カナムグラ	14	キガヤツリ	89
オオベニシダ	6	オニノゲシ	67	カニツリグサ	80	キカラスウリ	43
オオベニタデ	16	オニノヤガラ	91	かばのき科	11	キキョウ	62
オオホウチャクソウ	73	オニヒカゲワラビ	8	ガマ	84	ききょう科	62
オオマツヨイグサ	44	オニヒョウタンボク	61	がま科	84	きく科	62
オオムラサキシキブ	54	オニヤブソテツ	4	ガマズミ	61	キクザキイチゲ	21
オオモミジ	37	オニヤブマオ	15	カマツカ	32	キクバオウレン	22
オオヤエクチナシ	52	オニユリ	72	カミエビ	23	キクバドコロ	73
オオヤハズエンドウ	34	オノエヤナギ	12	カムロザサ	82	キクムグラ	53
オオヤマオダマキ	22	オヒシバ	77	カモガヤ	79	キクモ	58
オオヤマカタバミ	35	オヒョウ	14	カモジグサ	79	キケマン	26
オオヤマサギソウ	90	オミナエシ	61	カモノハシ	75	キササゲ	59
オオヤマザクラ	30	おみなえし科	61	カヤ	11	キジカクシ	72
オオヨモギ	63	オミナメシ	61	カヤツリグサ	89	ギシギシ	16
オオルリソウ	54	オモダカ	68	かやつりぐさ科	84	キジノオシダ	3
オカウコギ	45	おもだか科	68	カラクサイヌワラビ	8	きじのおしだ科	2
オカトラノオ	49	オモト	72	カラクサイノデ	5	キジムシロ	31
オカヒジキ	19	オヤブジラミ	46	カラクサシダ	4	キショウブ	74
オカメザサ	81	オヤマボクチ	67	カラコギカエデ	37	キスゲ	70
オガラバナ	38	オヤマムグラ	53	カラスウリ	43	キセワタ	57
オギ	76	オランダガラシ	26	カラスサンショウ	36	キソケイ	51
オキナグサ	21	オランダミミナグサ	18	カラスシキミ	41	キソチドリ	90
オキナダケ	82	オロシマチク	82	カラスノエンドウ	33	キタコブシ	19
オオククルマムグラ	53	カの部		カラスノゴマ	41	キタゴヨウ	10
オクコガネギク	65	かえで科	37	カラスノチャヒキ	79	キチジョウソウ	72
オクツバキ	24	ガガイモ	52	カラスビシャク	83	キッコウチク	81
オクトリカブト	21	ががいも科	52	カラスムギ	80	キッコウハグマ	66
オクノオオバオウセイ	72	カキツバタ	74	カラタチ	37	キツタ	45
オクノカンスゲ	85	カキドオシ	57	カラタチバナ	49	キツネガヤ	79
オクマワラビ	6	カキノキ	50	カラハナソウ	14	キツネノカミソリ	73
オグルマ	65	かきのき科	50	カラマツ	9	キツネノボタン	22
オケラ	67	カキラン	91	カラマツソウ	22	キツネヤナギ	12
オサシダ	4	ガクアジサイ	28	カラムシ	15	キツリフネ	38
オサバグサ	26	ガクウラジロヨウラク	48	カリガネソウ	55	キヌヤナギ	12
オンダ	6	カクミノスノキ	49	カワズスゲ	87	キハダ	36
おしだ科	4	カザグルマ	21	カワタデ	17	キバナイカリソウ	23
オシャグジデンダ	9	カサスゲ	84	カワミドリ	57	キバナカワラマツバ	53
オダマキ	22	カジイチゴ	30	カワヤナギ	12	キバナノアマナ	71
オトギリソウ	25	カジノキ	14	カワラケツメイ	33	キブシ	43
おとぎりそう科	25	カシワ	13	カワラサイコ	31	きぶし科	43
オトコエシ	61	カシワナラ	13	カワラスガナ	89	キブネギク	21
オトコヨモギ	63	カシワモドキ	13	カワラスゲ	87	ギボウシラン	92
オドリコソウ	57	カズザキヨモギ	63	カワラナデシコ	18	キュウリグサ	54
オナモミ	62	カズノコグサ	80	カワラハハコ	66	キョウガノコ	31
オニウコギ	45	カスマグサ	34	カワラボウフウ	47	ギョウキシバ	77
オニウシノケグサ	79	カスミザクラ	30	カワラマツバ	53	ギョウジャニンニク	71
オニカサモチ	46	カゼクサ	77	カワラヤナギ	11	ギョウジャノミズ	40
オニカナワラビ	6	カセンソウ	65	カワラヨモギ	63	キョウチクトウ	52
オニカンゾウ	70	カタクリ	71	カンエンガヤツリ	89	きょうちくとう科	52
オニグルミ	11	カタシログサ	23	カンガレイ	89	キヨズミシダ	5
オニシバ	77	カタバミ	35	カンザンチク	81	キヨタキシダ	8
オニシバリ	41	かたばみ科	35	カンチク	81	ギョリュウ	43

ぎよりゅう科	43	クモキリソウ	92	ゲンノシヨウコ	35	コタヌキモ	60
キランソウ	55	クラマゴケ	2	ケンボナシ	40	コチク	82
キリ	58	クララ	33	コ の 部		コチヂミザサ	76
キリンソウ	27	クリ	14	コアカソ	15	コチャルメウソウ	29
キレバイヌガラシ	27	クリハラン	9	コアゼガヤツリ	89	コツゲ	40
キンエノコロ	77	クルマバアカネ	53	コアツモリソウ	90	コツブキンエノコロ	77
キンギョモ	23	クルマバザクロソウ	18	コアニチドリ	90	コップモエギスゲ	86
キンギョモ	44	クルマバソウ	53	コイケマ	52	コデマリ	29
キンギンボク	61	クルマバツクバナソウ	72	コイチョウラン	92	ゴトウヅル	28
ギンドロ	11	クルマバナ	56	コイヌノヒゲ	75	コナギ	73
キンボウゲ	22	クルマムグラ	53	コウガイゼキシヨウ	74	コナスビ	49
きんぼうげ科	20	クルマユリ	72	コウキクサ	84	コナラ	13
キンボクラン	92	くるみ科	11	コウキヤガラ	89	コニシキソウ	36
キンミズヒキ	32	グレーンスゲ	85	コウゾ	14	コヌカグサ	80
キンメイチク	81	クロウメモドキ	40	ゴウソ	87	コノテガシワ	10
キンモクセイ	51	くろうめもどき科	40	コウゾリナ	67	コバイケイソウ	70
ギンモクセイ	51	クローバー	33	合弁花類	47	コハウチワカエデ	38
キンラン	91	クロカワズスゲ	88	コウボウシバ	84	コバギボウシ	71
ギンラン	91	クログワイ	88	コウボウムギ	87	コハコベ	18
ギンリョウソウ	48	クロチク	81	コウホネ	23	コバシジノキ	50
ギンリョウソウモドキ	48	クロツバラ	40	コウモリカズラ	23	コバノイシカグマ	3
ギンレイカ	49	クロテンツキ	88	コウモリソウ	64	こばのいしかぐま科	3
ク の 部		クロハタガヤ	88	コウモリドコロ	73	コバノイチャクソウ	47
クガイソウ	58	クロバナヒキオコシ	55	コウヤコケシノブ	3	コバノカモメヅル	52
クコ	57	クロハリイ	88	コウヤマキ	10	コバノタツナミ	55
クサイ	74	クロベ	10	こうやまき科	10	コバノトネリコ	50
クサギ	55	クロマツ	9	コウヤワラビ	7	コバノヒルムシロ	69
クサスギカズラ	72	クロミノニシゴリ	50	コウヨウザン	10	コバノフユイチゴ	30
クサスゲ	86	クロモジ	20	コウライテンナンシヨウ	83	コハマナス	30
クサツテツ	7	くわ科	14	コウライヤワラシダ	7	コバンソウ	79
クサテンツキ	88	クワクサ	14	コオニタビラコ	68	コヒルガオ	54
クサドウ	79	グンバイナズナ	26	コガネアオダモ	50	コヒロハハナヤスリ	2
クサニワトコ	60	グンバイヒルガオ	54	コガマ	84	コブシ	19
クサネム	34	ケ の 部		コカモメヅル	52	コフタバラン	91
クサノオウ	25	ケイタドリ	17	ゴキヅル	43	コブナグサ	76
クサフジ	34	ケカマツカ	32	コクサギ	36	コブニレ	14
クサボタン	21	ケカモノハシ	75	コケイラン	92	ゴマギ	60
クサヨシ	79	ケキツネノボタン	22	コケオトギリ	25	コマツナギ	33
クサレダマ	49	ケクサフジ	34	コケシノブ	3	ゴマナ	65
クジャクシダ	4	けし科	25	こけしのぶ科	3	ごまのはぐさ科	58
クズ	35	ゲジゲジシダ	7	コゴメガヤツリ	89	コマユミ	39
クスノキ	20	ケチヂミザサ	76	コゴメヤナギ	12	コマンネングサ	27
くすのき科	20	ゲッケイジュ	20	コシアブラ	45	コムラサキ	54
クチナシ	52	ケツユクサ	75	コシオガマ	59	コメガヤ	78
クヌギ	13	ケテンツキ	88	コシカギク	63	コメススキ	80
クマイザサ	83	ケナシイワハタザオ	27	コシキブ	54	コメツブツメクサ	33
クマイチゴ	30	ケナシカンボク	60	コシジシモツケソウ	31	コメナモミ	63
クマガイソウ	90	ケナシスミレ	42	コシジタバヒラコ	54	コメヒシバ	76
クマギク	64	ケナシヤブデマリ	60	コシノカンアオイ	24	コモチコウガイゼキシヨウ	
クマザサ	83	ケネザサ	82	コシノハナヒリノキ	49		74
クマツヅラ	55	ケフシグロ	19	コシノホンモンジスゲ	86	コモチマンネングサ	27
くまつづら科	54	ケヤキ	14	コジュズスゲ	85	コヤブタバコ	65
クマノミズキ	44	ケヤマウコギ	45	コシロネ	56	ゴヨウアケビ	23
クマヤナギ	40	ケヤマウツボ	59	コスギラン	1	ゴヨウマツ	10
クマワラビ	6	ケヤマハンノキ	12	ゴゼンタチバナ	45	コリヤナギ	12
ぐみ科	42	ゲンゲ	33	コタニワタリ	4	コリンゴ	32

ゴンゲンスゲ	86	サワシバ	13	シバ	77	シロネ	56
ゴンズイ	40	サワゼリ	46	シハイスミレ	42	シロバナアキノタムラソウ	
コンロンソウ	26	サワダツ	39	シバスゲ	86		56
サ の 部		サワトウガラシ	58	シホウチク	81	シロバナアザミ	66
ザートウイッケン	34	サワハコベ	18	シマガヤ	79	シロバナアズマシャクナゲ	
サイカチ	32	サワヒヨドリ	66	シマタケ	82		48
サイシン	24	サワフタギ	50	シモクレン	19	シロバナオオイワカガミ	47
サイトウガヤ	80	サワラ	10	シモツケ	29	シロバナカタクリ	71
サイハイラン	92	サンカクイ	39	シモツケソウ	31	シロバナカワラナデシコ	18
サカキ	25	サンカクヅル	40	シャガ	74	シロバナサクラタデ	16
サカゲイノデ	5	サンカヨウ	23	シャク	46	シロバナシナガワハギ	33
サギゴケ	58	サンゴジュ	61	シャクジョウソウ	48	シロバナショウジョウバカマ	
サギスゲ	89	サンショウ	36	シャクナゲ	48		70
さくらそう科	49	サンショウモ	9	ジャケツイバラ	32	シロバナタニウツギ	61
サクラタデ	16	さんしょうも科	9	ジャコウソウ	57	シロバナタンポポ	68
ザクロソウ	17	シ の 部		シャコタンチク	82	シロバナナルボ	72
ざくろそう科	17	ジイソブ	62	シャコハンチク	83	シロバナナツノタムラソウ	
サケバヒヨドリ	66	シイヤザサ	82	ジャニンジン	26		56
ササガヤ	76	シウリザクラ	29	ジャノヒゲ	69	シロバナニガナ	68
ササクサ	78	シオガマギク	59	ジャヤナギ	11	シロバナハンショウヅル	21
ササバギンラン	91	シオクグ	84	シャリンバイ	32	シロバナフジ	33
サザンカ	24	シオデ	73	ジュウニヒトエ	55	シロバナヘビイチゴ	31
サジオモダカ	68	シオマツバ	50	シュウメイギク	21	シロバナホツツジ	48
サジガンクビソウ	65	シオリザクラ	29	ジュウモンジシダ	5	シロバナマンジュシャゲ	73
ザゼンソウ	83	シカクイ	88	種子植物	9	シロバナマンテマ	19
サドアザミ	67	シカクダケ	81	ジュズスゲ	85	シロバナミゾカクシ	62
さといも科	83	ジガバチソウ	92	ジュズダマ	75	シロバナミヤマママコナ	59
サドオケラ	67	シキミ	20	シュスラン	91	シロバナムシヨケギク	63
サドカンスゲ	86	しきみ科	20	シュロ	83	シロハリスゲ	87
サドクルマユリ	72	シキンカラマツ	22	シュロソウ	70	シロモジズリ	92
サドコゴメグサ	59	シケシダ	8	ジュンサイ	23	シロヤナギ	12
サドザサ	82	シケチシダ	8	シュンラン	93	シロヤマシダ	8
サドシオデ	73	ジゴクノカマノフタ	55	しょうが科	90	シロヨメナ	65
サドシナノキ	41	シコタンザサ	83	ショウジョウスゲ	86	シンジュ	37
サドシュロソウ	70	シシウド	47	ショウジョウバカマ	70	ジンショウゲ	41
サドスゲ	87	シシガシラ	4	ショウブ	84	じんちょうげ科	41
サドテンナンショウ	83	ししがしら科	4	シライトソウ	70	ジンバイソウ	90
サドトラノオ	59	シシキリガヤ	88	シラガブドウ	40	ジンヨウイチヤクソウ	48
サドネザサ	82	ジシバリ	68	シラキ	35	ス の 部	
サドブシ	21	しそ科	55	シラゲエチゴトラノオ	59	スイカズラ	61
サトメシダ	8	シソバタツナミ	55	シラゲガヤ	80	すいかずら科	60
サナエタデ	17	羊歯植物	1	シラゲシャジン	62	スイセン	73
サネカズラ	20	シダレヤナギ	12	シラコスゲ	85	スイバ	16
サビバナナカマド	32	シトギ	63	シラネアオイ	24	すいれん科	23
サヤヌカグサ	78	シナガワハギ	33	しらねあおい科	24	スカシタゴボウ	27
サラサドウダン	49	シナダレスズメガヤ	77	シラネセンキュウ	47	スカシユリ	71
サラシナショウマ	20	シナノガキ	50	シラネワラビ	6	スガモ	69
サルイワツバキ	24	シナノキ	41	シラヒゲソウ	28	スギ	10
サルスベリ	43	しなのき科	41	シラヤマギク	65	すぎ科	10
サルトリイバラ	73	シナノザサ	83	シラン	92	スギナ	2
サルナシ	24	シナレンギョウ	50	シロイヌノヒゲ	75	スゲアマモ	69
サルメンエビネ	92	シノブ	3	シロガヤツリ	90	スズカケノキ	27
サワオグルマ	64	シノブイノデ	5	シロキキョウ	62	すずかけのき科	27
サワオトギリ	25	しのぶ科	3	シロザ	19	スズカゼリ	47
サワギク	64	シノブカグマ	5	シロダモ	20	ススキ	76
サワグルミ	11	シノブヒバ	10	シロツメクサ	33	スズサイコ	52

スズムシソウ	92	ソバカズラ	17	タブノキ	20	ツクバネソウ	72
スズメウリ	43	ソバナ	62	タマガヤツリ	89	ツゲ	40
スズメガヤ	78	ソヨゴ	39	タマズサ	43	つげ科	40
スズメノエンドウ	34	タの部		タマツバキ	51	ツシマナナカマド	32
スズメノカタビラ	78	ダイオウマツ	9	タマツリスゲ	85	ツタ	41
スズメノチャヒキ	79	ダイコンソウ	32	タマバシロヨメナ	65	ツタウルシ	37
スズメノテッポウ	81	タイトゴメ	27	タマブキ	64	ツチアケビ	91
スズメノヒエ	75	ダイフクチク	81	タマミクリ	84	つつじ科	48
スズメノヒエ	76	タイミンチク	81	タマミゾイチゴツナギ	78	つづらふじ科	23
スズメノヤリ	75	ダイモンジソウ	29	タムシバ	20	ツナギガヤ	11
スズメハコベ	58	タイワンヒメクダ	89	タムラソウ	67	ツノハシバミ	12
スダジイ	14	タウコギ	63	タラノキ	45	つばき科	24
ズダヤクシュ	28	タカサゴユリ	72	タラヨウ	39	ツバメオモト	72
スナビキソウ	54	タカサブロウ	63	タンキリマメ	35	ツブラジイ	14
スハマソウ	21	タカネアオヤギソウ	70	単子葉植物	68	ツボクサ	46
スベリヒユ	18	タカネザクラ	30	ダンチク	78	ツボスミレ	42
すべりひゆ科	18	タカネショウジョウスゲ	86	ダンドボロギク	64	ツメクサ	18
ズミ	32	タガネソウ	85	タンナサワフタギ	50	ツメレンゲ	28
スミレ	42	タカネマスクサ	87	チの部		ツヤナシイノデ	5
すみれ科	42	タカネマツムシソウ	62	チガヤ	76	ツユクサ	75
スミレサイシン	42	タカノツメ	45	チカラシバ	77	つゆくさ科	75
セの部		タガラシ	22	チクセツニンジン	45	ツリガネニンジン	62
セイタカアワダチソウ	65	たけ亜科	81	チゴザサ	76	ツリバナ	39
セイタカウコギ	63	タケシマラン	72	チゴザサ	82	ツリフネソウ	38
セイタカスズムシソウ	92	タケニグサ	25	チゴユリ	73	つりふねそう科	38
セイタカトウヒレン	67	タコノアシ	28	チシマザサ	82	ツルアジサイ	28
セイヨウタンポポ	68	タチイヌノフグリ	59	チシマネコノメソウ	28	ツルアリドオシ	52
セイヨウミヤコグサ	33	タチカモジグサ	79	チシャノキ	50	ツルウメモドキ	40
セキショウ	84	タチクサボタン	21	チチコグサ	66	ツルカコソウ	55
セコイヤ	10	タチクラマゴケ	2	チチブフジウツギ	58	ツルカノコソウ	61
セッコク	93	タチコウガイゼキショウ	74	チヂミザサ	76	ツルキジムシロ	31
セトガヤ	81	タチコメグサ	59	チドメグサ	45	ツルキンバイ	31
ゼニアオイ	41	タチシオデ	73	チマキザサ	83	ツルグミ	42
セリ	46	タチシノブ	4	チメクサ	61	ツルシキミ	37
せり科	45	タチスゲ	84	チャシバスゲ	86	ツルセンノウ	18
セリモドキ	46	タチタネツケバナ	26	チャセンシダ	4	ツルドクダミ	17
センダイハギ	33	タチツボスミレ	42	ちゃせんした科	4	ツルナ	18
センダン	37	タチヌカボ	81	チャノキ	24	つるな科	18
せんだん科	37	タチフウロ	35	チャボガヤ	11	ツルナシカラスノエンドウ	34
センダングサ	63	タチヤナギ	11	チャボゴウソ	87	ツルニガクサ	55
ゼンテイカ	70	タツナミソウ	55	チャボゼキショウ	70	ツルニチニチソウ	52
セントウソウ	46	タツノヒゲ	78	チャボリョウブ	47	ツルニンジン	62
センナリホオズキ	57	たで科	15	チャルメルソウ	29	ツルネコノメソウ	28
センニンソウ	22	タニウツギ	61	チャンバギク	25	ツルハコベ	18
センノキ	45	タニガワスゲ	87	チョウジカズラ	52	ツルボ	72
センブリ	51	タニギキョウ	62	チョウジギク	64	ツルマサキ	39
センボンヤリ	66	タニスゲ	87	チョウジソウ	52	ツルミヤマシキミ	37
ゼンマイ	2	タニセリモドキ	46	チョウジタデ	44	ツルメドハギ	35
ぜんまい科	2	タニソバ	16	チョウセンガリヤス	77	ツルヨシ	78
センリョウ	24	タヌキモ	60	チョウセンゴヨウ	9	ツルリンドウ	51
せんりょう科	24	たぬきも科	60	チョウセンヤマブドウ	41	ツレサギソウ	90
ソの部		タヌキラン	87	チョロギガヤ	80	ツワブキ	64
双子葉植物	11	タネツケバナ	26	ツの部		テの部	
双子葉植物	42	タネヒリグサ	63	ツガザクラ	48	テイカカズラ	52
ソクシンラン	71	タビラコ	54	ツクシトネリコ	50	テバコモミジガサ	63
ソクズ	60	タビラコ	68	ツクバネ	15	テマリバナ	61

テリハオオバコ	60	トリアシシヨウマ	29	ニガクサ	55	ネムノキ	32
テリハコナラ	13	トリガタハンシヨウツル	21	ニガナ	68	ノ の 部	
テリハタチツボスミレ	42	トリゲモ	69	ニシキギ	39	ノアザミ	66
テリハノイバラ	30	ドロイ	74	にしきぎ科	39	ノイバラ	30
デワノタツナミソウ	55	ドロヤナギ	11	ニシキゴロモ	55	ノウゼンカズラ	59
テンキグサ	79	トンボソウ	90	ニシキソウ	36	のうぜんかずら科	59
テンツキ	88	ナ の 部		ニシキマンサク	27	ノガリヤス	80
テンモンドウ	72	ナガエミクリ	84	ニシキミヤコグサ	33	ノカンゾウ	70
ト の 部		ナガハグサ	78	ニシノホンモンジスゲ	86	ノキシノブ	9
トウオオバコ	60	ナガハシスミレ	42	ニセアカシア	33	ノギラン	70
トウキ	47	ナガバジャノヒゲ	70	ニッコウキスゲ	70	ノゲアオスゲ	86
トウギボウシ	70	ナガバノスミレサイシン	42	ニッコウシダ	7	ノゲシ	67
トウゲシバ	1	ナガバモミジイチゴ	30	ニッポンイヌノヒゲ	75	ノコンギク	65
トウゴクシダ	6	ナガバヤブマオ	15	ニョイスミレ	42	ノササゲ	35
トウササクサ	78	ナガホノナツノハナワラビ	2	ニラ	71	ノジシャ	61
トウシャジン	62	ナガミノサルトリイバラ	73	ニリンソウ	21	ノシュンギク	64
トウシンソウ	74	ナギナタガヤ	79	にれ科	14	ノダイオウ	16
トウダイグサ	36	ナギナタコウジュ	56	ニワウメ	30	ノダケ	46
とうだいぐさ科	35	ナキリスゲ	85	ニワウルシ	37	ノダフジ	33
トウバナ	56	なす科	57	ニワゼキショウ	74	ノチドメ	45
トウヒ	10	ナズナ	26	ニワトコ	60	ノテンツキ	88
トガクシゴメグサ	59	ナツエビネ	92	ニワフジ	33	ノハナショウブ	74
トガヒゴタイ	67	ナツグミ	42	ニワホコリ	77	ノハラアザミ	66
トキソウ	91	ナツズイセン	73	ニワヤナギ	16	ノビエ	76
トキワイカリソウ	23	ナツツタ	41	ニンドウ	61	ノビネチドリ	91
トキワハゼ	58	ナツトウダイ	36	ヌ の 部		ノビル	71
トキンソウ	63	ナツノタムラソウ	56	ヌカキビ	77	ノブキ	64
ドクウツギ	37	ナツハゼ	49	ヌカススキ	79	ノブドウ	41
どくうつぎ科	37	ナツメ	40	ヌカボ	80	ノボロギク	64
トクサ	2	ナツユキソウ	31	ヌカボシソウ	74	ノミノツヅリ	18
とくさ科	2	なでしこ科	18	ヌカボタデ	17	ノミノフスマ	18
ドクダミ	23	ナナカマド	32	ヌスビトハギ	34	ノラニンジン	46
どくだみ科	23	ナニワズ	41	ヌマスギ	10	ノリウツギ	28
ドクムギ	79	ナベナ	62	ヌマゼリ	46	ハ の 部	
トゲソバ	16	ナミキソウ	55	ヌマトラノオ	49	ハイイヌガヤ	11
トゲハマナス	30	ナメライノデ	5	ヌメリグサ	77	ハイイヌツゲ	38
トゲミミズヒキモ	69	ナライシダ	5	ヌリワラビ	9	バイケイソウ	70
トケンラン	92	ナラカシワ	13	ヌルデ	37	ハイチゴザサ	76
トサミズキ	27	ナルコスゲ	86	ネ の 部		ハイネズ	10
トショウ	10	ナルコビエ	76	ネコノシタ	63	はいのき科	50
ドジョウツナギ	78	ナルコユリ	72	ネコノメソウ	28	ハイハマボッサ	50
トダシバ	77	ナワシロイチゴ	31	ネコハギ	34	ハイホラゴケ	3
とちかがみ科	69	ナンカイイタチシダ	6	ネコヤナギ	12	バイモ	71
トチナ	61	ナンキンハゼ	35	ネザサ	82	ハウチワカエデ	38
トチノキ	38	ナンタイシダ	6	ネジバナ	91	ハエドクソウ	60
とちのき科	38	ナンテン	23	ネジリカワツルモ	69	はえどくそう科	60
トチバニンジン	45	ナンテンハギ	34	ネズコ	10	ハカタシダ	6
トネアザミ	66	ナンバンギセル	60	ネズミガヤ	77	ハカリノメ	32
トネリコ	50	ナンバンハコベ	18	ネズミサシ	10	ハクサンシャクナゲ	48
トビシマカンゾウ	70	ナンブアザミ	66	ネズミノオ	77	ハクサンタイゲキ	36
トベラ	29	ニ の 部		ネズミムギ	79	ハクチョウゲ	52
とべら科	29	ニイガタガヤツリ	90	ネズミモチ	51	ハクモウイノデ	8
トボシガラ	78	ニオイイバラ	30	ネナシカズラ	53	ハコネカモメツル	52
トモエソウ	25	ニオイタチツボスミレ	42	ネバリタデ	17	ハコネシケチシダ	8
トヨオカザサ	82	ニガキ	37	ネバリノギラン	71	ハコベ	18
トラノオシダ	4	にがき科	37	ネマガリダケ	82	ハシカグサ	52

ハシゴシダ	7	ばら科	29	ヒムロ	10	ヒメヨツバムグラ	53
ハシドイ	51	ハリイ	88	ヒメアオキ	44	ヒメレンゲ	27
ハシバミ	12	ハリエンジュ	33	ヒメアカバナ	44	ヒメワラビ	7
バショウ	90	ハリガネワラビ	7	ヒメアザミ	66	ヒモカズラ	1
ばしょう科	90	ハリギリ	45	ヒメイチゲ	21	びゃくだん科	15
ハス	23	ハリスゲ	85	ヒメウコギ	45	ヒュウガミズキ	27
はす科	23	ハルガヤ	79	ヒメウズ	22	ひゆ科	19
ハダカホオズキ	57	ハルジオン	64	ヒメオトギリ	25	ヒョウタンボク	61
ハタガヤ	88	ハルニレ	14	ヒメオドリコソウ	57	ヒヨクヒバ	10
ハチク	81	ハルノノゲン	67	ヒメカナワラビ	4	ヒヨクソウ	59
ハチジョウススキ	76	ハルリンドウ	51	ヒメカンスゲ	86	ヒヨドリジョウゴ	58
ハチジョウナ	67	ハンゲ	83	ヒメキンミズヒキ	32	ヒヨドリバナ	66
ハッカ	56	ハンゲショウ	23	ヒメクグ	89	ヒライ	74
バッコヤナギ	12	ハンゴンソウ	64	ヒメグルミ	11	ヒラテンツキ	88
ハトムギ	75	ハンショウツル	21	ヒメグンバイナズナ	26	ヒルガオ	54
ハナイカダ	44	ハンノキ	12	ヒメゴウソ	87	ひるがお科	53
ハナイバナ	54	ヒの部		ヒメコヌカグサ	80	ヒルムシロ	69
ハナウド	47	ヒイラギ	51	ヒメコバンソウ	79	ひるむしろ科	69
ハナカタバミ	35	ヒエ	76	ヒメコマツ	10	ビロードクサフジ	34
ハナズオウ	32	ヒエガエリ	80	ヒメザゼンソウ	84	ビロードシダ	9
ハナゼキショウ	70	ヒオウギ	74	ヒメシオン	65	ビロードモウズイカ	58
ハナタデ	17	ヒオウギアヤメ	74	ヒメジソ	56	ビロードラン	91
ハナニガナ	68	ヒカゲイノコズチ	19	ヒメシダ	7	ヒロハアオダモ	50
ハナヒリグサ	63	ヒカゲスゲ	85	ひめした科	6	ヒロハイヌノヒゲ	75
ハナヒリノキ	49	ヒカゲスミレ	42	ヒメシャガ	74	ヒロハイヌワラビ	8
ハナミズキ	45	ヒカゲノカズラ	1	ヒメジョオン	65	ヒロハギシギシ	16
はなやすり科	2	ひかげのかずら科	1	ヒメシラスゲ	85	ヒロハクサレダマ	49
ハハコグサ	66	ヒカゲハリスゲ	85	ヒメシロネ	56	ヒロバスゲ	85
ハマアオスゲ	86	ヒカゲミゾソバ	16	ヒメスイバ	15	ヒロハツリバナ	39
ハマアカザ	19	ヒガンバナ	73	ヒメスギラン	1	ヒロハテンナンショウ	83
ハマイブキボウフウ	46	ひがんばん科	73	ヒメスゲ	85	ヒロハノアマナ	71
ハマウツボ	60	ヒキオコシ	55	ヒメテンツキ	88	ヒロハノイブキボウフウ	46
はまうつほ科	60	ヒキヨモギ	59	ヒメドコロ	73	ヒロハノウシノケグサ	78
ハマエノコロ	77	ヒゲノガリヤス	80	ヒメトラノオ	59	ヒロハノカワラサイコ	31
ハマエンドウ	34	ヒゴクサ	85	ヒメニラ	71	ヒロハノトウゲシバ	1
ハマオトコヨモギ	63	ヒサカキ	25	ヒメノガリヤス	80	ヒロハハナヒリノキ	49
ハマグルマ	63	ヒシ	43	ヒメハイホラゴケ	3	ヒロハハナヤスリ	2
ハマゴウ	55	ひし科	43	ヒメハギ	37	ヒロハベニシダ	6
ハマコンギク	65	被子植物	11	ひめはぎ科	37	ヒロハヘビノネゴザ	8
ハマシャジン	62	ヒツジグサ	23	ヒメハリイ	88	ヒロハヘビノボラス	22
ハマゼリ	46	ヒデリコ	88	ヒメヒゴタイ	67	ヒロハモミジ	37
ハマダイコン	26	ヒトツバヨモギ	63	ヒメビシ	43	ヒロハヤブソテツ	5
ハマツメクサ	18	ヒトツボクロ	92	ヒメヒラテンツキ	88	ビワ	32
ハマナシ	30	ヒトモトススキ	88	ヒメヒルムシロ	69	ヒンジカヤツリ	89
ハマナス	30	ヒトリシズカ	24	ヒメヘビイチゴ	31	フの部	
ハマニガナ	68	ヒノウチワカエデ	38	ヒメボッス	50	ふうろそう科	35
ハマニンニク	79	ヒナガヤツリ	89	ヒメミカンソウ	36	フキ	64
ハマネナシカズラ	54	ヒナタイノコズチ	19	ヒメミクリ	84	フクオウソウ	68
ハマハコベ	18	ヒナチドリ	90	ヒメミズニラ	2	フクジュソウ	22
ハマハタザオ	27	ヒナノウスツボ	58	ヒメミソハギ	43	フクロモエギスゲ	86
ハマヒルガオ	54	ビナンカズラ	20	ヒメムカシヨモギ	65	フサフジウツギ	58
ハマフウロ	35	ヒノキ	10	ヒメモエギスゲ	86	フサモ	44
ハマベンケイソウ	54	ヒノキアスナロ	11	ヒメモチ	39	フジ	33
ハマボウフウ	46	ひのき科	10	ヒメヤシャブシ	12	ふじうつぎ科	58
ハマボッス	49	ヒマラヤシーダー	9	ヒメヤブラン	69	フジカンゾウ	34
ハマミチヤナギ	16	ヒマラヤスギ	9	ヒメヤマアザミ	66	フシグロ	19

フシゲクマイザサ	83	ホソバオケラ	67	マツモ	23	ミズニラ	2
フシダカフウロ	35	ホソバオモダカ	68	まつも科	23	みずなら科	2
フシノキ	37	ホソバガンクビソウ	65	マツヨイグサ	44	ミズバショウ	83
フジハナヤスリ	4	ホソバカンスゲ	86	マテバジイ	14	ミズヒキ	16
ブタクサ	62	ホソバシケシダ	8	マネキグサ	57	ミズヒキモ	69
ブタナ	67	ホソバジャニンジン	26	ママコノシリヌグイ	16	ミスミソウ	21
フタリシズカ	24	ホソバトウゲシバ	1	マムシグサ	83	ミズユキノシタ	44
フッキソウ	40	ホソバナライシダ	5	まめ科	32	ミゾイチゴツナギ	78
ブツメンチク	81	ホソバノアマナ	71	マメグミ	42	ミゾカクシ	62
フデクサ	87	ホソバノコウガイゼキショウ	74	マメゲンバイナズナ	26	ミゾシダ	6
フデリンドウ	51		66	マメダオシ	54	ミゾシダモドキ	7
フトイ	89	ホソバノヤマハハコ	53	マメツタ	9	ミゾソバ	16
ぶどう科	40	ホソバノヨツバムグラ	19	マユミ	39	ミソハギ	43
ブナ	13	ホソバハマアカザ	39	マルバアオダモ	50	みそはぎ科	43
ぶな科	13	ホソバマユミ	69	マルバアカザ	19	ミゾハコベ	43
フナシミヤマウズラ	91	ホソバミズヒキモ	41	マルバイワシモツケ	29	みぞはこべ科	43
フナバラソウ	52	ボダイジュ	89	マルバウマノスズクサ	24	ミゾホオズキ	58
フモトシダ	3	ホタルイ	54	マルバキンレイカ	61	ミチノクサイシン	24
フユイチゴ	30	ホタルカズラ	46	マルバゴマギ	60	ミチノクナシ	32
フユノハナワラビ	2	ホタルサイコ	62	マルバシャリンバイ	32	ミチノクヨロイグサ	47
フヨウアカバナ	43	ホタルブクロ	24	マルバネコノメソウ	28	ミチヤナギ	16
ふろうそう科	35	ほとん科	21	マルバノイチヤクソウ	48	ミツガシワ	51
への部		ボタンヅル	47	マルバノニンジン	62	みつがしわ科	51
ヘクソカズラ	52	ボタンボウフウ	80	マルバノフユイチゴ	30	ミツデウラボシ	9
ベニカンゾウ	70	ホッスガヤ	69	マルバハギ	34	ミツバ	46
ベニシダ	6	ホッスモ	48	マルバマンサク	27	ミツバアケビ	23
ベニシュスラン	91	ホツツジ	9	マルバミツバアケビ	23	ミツバウツギ	40
ベニニガナ	64	ホテイシダ	81	マルバヤナギ	11	みつばうつぎ科	40
ベニバナイチヤクソウ	48	ホテイチク	35	マルバヤハズソウ	34	ミツバツチグリ	31
ベニバナギンリョウソウ	48	ホドイモ	57	マルミノヤマゴボウ	17	ミツバヒヨドリ	66
ベニバナマンサク	27	ホトケノザ	19	まんさく科	27	ミツバフウロ	35
ヘビイチゴ	31	ホナガイヌビユ	64	マンセンカラマツ	19	ミツマタ	41
ヘビノネゴザ	7	ボロギク	17	マンテマ	86	ミネカエデ	38
ヘラオオバコ	60	ボントクタデ	86	マンネンスギ	1	ミネザクラ	30
ヘラオモダカ	68	マの部		ミの部		ミノゴメ	80
べんけいそう科	27	マイヅルソウ	72	ミカツキグサ	88	ミノボロスゲ	87
ホの部		マイヅルテンナンショウ	83	みかん科	36	ミミコウモリ	64
ハウオウチク	81	マカラスムギ	80	ミクリ	84	ミミナグサ	18
ハウチャクソウ	73	マキノスミレ	42	みくり科	84	ミヤコオトギリ	25
ほうらいしだ科	3	マコモ	78	ミクリスゲ	84	ミヤコグサ	33
ハウライチク	81	マサキ	39	ミズ	84	ミヤコザサ	83
ホオズキ	57	マスクサ	87	みずあおい科	15	ミヤマアキノノゲン	67
ホオノキ	19	マダイオウ	16	ミズイ	73	ミヤマアブラススキ	76
ホクリクネコノメソウ	28	マダケ	81	ミズオオバコ	74	ミヤマアワガエリ	81
ホクリクムヨウラン	91	マタケ	24	ミズオトギリ	69	ミヤマイトチシダ	6
ホクロクトウヒレン	67	またたび科	24	ミズガヤツリ	25	ミヤマイボタ	51
ホザキカエデ	38	マタデ	17	ミズキ	89	ミヤマイラクサ	15
ホザキシモツケ	29	まつ科	9	みずき科	45	ミヤマウグイスカグラ	61
ホザキフサモ	44	マツカサススキ	89	ミズギク	44	ミヤマウズラ	91
ホシクサ	75	マツバイ	88	ミズギボウシ	65	ミヤマウマノアシガタ	22
ほしくさ科	75	マツバスゲ	85	ミズタビラコ	71	ミヤマウメモドキ	39
ホシダ	7	マツプサ	20	ミズタマソウ	54	ミヤマウラジロイチゴ	30
ホシナシゴウソ	87	まつぶさ科	20	ミズチドリ	44	ミヤマウルシ	36
ホソシラコスゲ	85	マツムシソウ	62	ミズトンボ	90	ミヤマオダマキ	22
ホソバアキノノゲシ	67	まつむしそう科	62	ミズナラ	90	ミヤマカタバミ	35
ホソバエチゴトラノオ	59		62		13	ミヤマガマズミ	61

ミヤマカラマツ	22	ムラサキタンポポ	66	ヤチカワズスゲ	87	ヤマシャクヤク	24
ミヤマカンスゲ	86	ムラサキツメクサ	33	ヤチダモ	50	ヤマズズメノヒエ	75
ミヤマキケマン	26	ムラサキツユクサ	75	ヤツデ	45	ヤマゼリ	47
ミヤマキンバイ	31	ムラサキニガナ	67	ヤドリギ	15	ヤマソテツ	3
ミヤマキンボウゲ	22	ムラサキマムシグサ	83	やどりぎ科	15	ヤマチドメ	45
ミヤマクマヤナギ	40	ムラサキヤシオツツジ	48	ヤナギイノコズチ	19	ヤマテキリスゲ	87
ミヤマクマワラビ	6	メの部		やなぎ科	11	ヤマトアオダモ	50
ミヤマクマバナ	56	メアオスゲ	86	ヤナギスブタ	69	ヤマトウバナ	57
ミヤマコゴメグサ	59	メアゼテンツキ	89	ヤナギタデ	17	ヤマトキソウ	91
ミヤマササガヤ	76	メイゲツカエデ	38	ヤナギタンポポ	68	ヤマトグサ	44
ミヤマシキミ	37	めぎ科	22	ヤナギモ	69	やまとぐさ科	44
ミヤマシケシダ	8	メゲヤキ	14	ヤノネグサ	16	ヤマトリカブト	21
ミヤマシシウド	47	メタセコイヤ	10	ヤハズエンドウ	33	ヤマドリゼンマイ	2
ミヤマシシガシラ	4	メドハギ	34	ヤハズソウ	34	ヤマナラシ	11
ミヤマジュズスゲ	85	メナモミ	63	ヤブイバラ	30	ヤマニガナ	67
ミヤマシラスゲ	84	メノマンネングサ	27	ヤブガラシ	41	ヤマネコノメソウ	28
ミヤマタゴボウ	49	メハジキ	57	ヤブカンゾウ	70	ヤマネコヤナギ	12
ミヤマタニタデ	44	メヒシバ	76	ヤブコウジ	49	ヤマノイモ	73
ミヤマトウキ	47	メマツヨイグサ	44	やぶこうじ科	49	やまのいも科	73
ミヤマトウバナ	56	メメガキ	50	ヤブジラミ	46	ヤマハギ	34
ミヤマナラ	13	メヤブマオ	15	ヤブソテツ	4	ヤマハコベ	18
ミヤマナルコ	87	メンマ	6	ヤブタバコ	65	ヤマハゼ	37
ミヤマナルコユリ	72	メンヤダケ	82	ヤブタバコ	68	ヤマハタザオ	26
ミヤマニガイチゴ	30	モの部		ヤブツバキ	24	ヤマハッカ	55
ミヤマヌカボ	80	モウセンゴケ	25	ヤブデマリ	61	ヤマハナワラビ	2
ミヤマヌカボシソウ	75	もうせんごけ科	25	ヤブニッケイ	20	ヤマハハコ	66
ミヤマネズ	10	モウソウチク	81	ヤブニンジン	46	ヤマハンノキ	12
ミヤマハコベ	18	モクゲンジ	38	ヤブハギ	34	ヤマブキ	30
ミヤマハタザオ	26	もくせい科	50	ヤブヘビイチゴ	31	ヤマブキシヨウマ	29
ミヤマハンノキ	12	モクレン	19	ヤブマオ	15	ヤマフジ	33
ミヤマビャクシン	10	もくれん科	19	ヤブマメ	35	ヤマブドウ	40
ミヤマベニシダ	6	モジズリ	91	ヤブミョウガ	75	ヤマボウシ	45
ミヤマヘビノネゴザ	8	モチノキ	39	ヤブラン	69	ヤマホタルブクロ	62
ミヤマホツツジ	48	もちのき科	38	ヤマアイ	36	ヤマホトトギス	70
ミヤマママコナ	59	モッコク	24	ヤマアジサイ	28	ヤマホロシ	58
ミヤママンネングサ	27	モトゲイタヤ	38	ヤマアゼスゲ	87	ヤマミズ	15
ミヤマムグラ	53	モミ	10	ヤマアワ	80	ヤマミゾソバ	16
ミヤマヨメナ	64	モミジアオイ	41	ヤマイ	88	ヤマムグラ	53
ミヤマワラビ	7	モミジイチゴ	30	ヤマイトチシダ	6	ヤマモミジ	37
ミョウガ	90	モミジガサ	63	ヤマイトワラビ	8	ヤマヤブソテツ	5
ムの部		モミジソウ	63	ヤマウコギ	45	ヤマユリ	71
ムカゴイラクサ	15	モミジドコロ	73	ヤマウルシ	37	ヤマヨモギ	63
ムカゴニンジン	46	モミジハグマ	66	ヤマエンゴサク	25	ヤマラッキョウ	71
ムクゲ	41	モミジバスズカケノキ	27	ヤマオダマキ	22	ヤワラシダ	7
ムクノキ	14	モリアザミ	66	ヤマカモジグサ	79	ヤワラスゲ	84
ムクロジ	38	モンゴリナラ	13	ヤマガラシ	26	ユの部	
むくろじ科	38	ヤの部		ヤマキセウタ	57	ユウガギク	64
ムシカリ	61	ヤイトバナ	52	ヤマキツネノボタン	22	ユウシュンラン	91
ムシトリナデシコ	19	ヤエムグラ	53	ヤマクマバナ	56	ユウスゲ	70
ムベ	23	ヤエヤマブキ	30	ヤマグワ	14	ユウゼンギク	65
ムヨウラン	91	ヤクシソウ	67	ヤマゴボウ	17	ユキクラヌカボ	80
ムラサキエノコロ	77	ヤグラネギ	71	やまごぼう科	17	ユキザサ	73
むらさき科	54	ヤグルマソウ	29	ヤマサギソウ	90	ユキツバキ	24
ムラサキケマン	25	やし科	83	ヤマザクラ	30	ユキノシタ	29
ムラサキシキブ	54	ヤシャブシ	12	ヤマザトタンポポ	68	ゆきのした科	28
ムラサキススキ	76	ヤダケ	82	ヤマジソ	56	ユキバタツバキ	24

ユキヤナギ	29	ラ の 部	リュウキュウマメガキ	50	レ の 部		
ユスラウメ	30	ラクウショウ	10	リュウキンカ	18	レンギョウ	50
ユズリハ	36	裸子植物	9	リュウノヒゲ	69	レンゲソウ	33
ゆずりは科	36	ラショウモンカズラ	57	リュウツザサ	83	レンゲツツジ	48
ゆり科	69	ラセンイ	74	リュウブ	47	ロ の 部	
ユリワサビ	26	ラッキョウダケ	81	りょうぶ科	47	ロクロギ	50
ヨ の 部		ラッキョウダケ	82	リュウメンシダ	5	ワ の 部	
ヨウシュヤマゴボウ	17	ラッキョウヤダケ	82	リンドウ	52	ワサビ	26
ヨシ	78	らん科	90	りんどう科	51	ワスレナグサ	54
ヨツバヒヨドリ	66	リ の 部		ル の 部		ワタゲカマツカ	32
ヨツバムグラ	53	リシリビャクシン	9	ルイヨウショウマ	21	ワラビ	3
ヨブスマソウ	64	離弁花類	11	ルイヨウボタン	23		
ヨモギ	63	リボンガヤ	80				

編集後記

「新潟県植物分布調査記録5」には、本間建一郎氏のまとめた佐渡島の植物相を掲載した。同氏は、自身の資料と文献に基づき、佐渡島の総目録を整理された。これまでに記録された分類群を大部分網羅し、佐渡島の植物相を知るための基礎資料として極めて重要である。

新津市に「新津植物資料室(積雪地域植物研究所)」を開設し、佐渡の植物に関する資料の蒐集にも力を入れている。それは、佐渡が離島で、積雪地域であるからである。島内でも地域により積雪量に差異があり、積雪地域の植物の研究には佐渡における植物の分布の実態把握が極めて重要である。つまり、積雪と植物の分布との相関を究明するために、佐渡島は重要な位置にあることと関連するからである。以上のような観点から、研究の基礎資料として本間建一郎氏のまとめた佐渡島の植物相を出版することにした。出版にあたり、新津高等学校教諭の笹川通博氏には、新津資料室の標本を検討し、これまで佐渡に分布する種を整理して頂いた。コーエイ印刷の横木正幸社長には、全体の体裁に助言を頂いた。両氏に対して深く謝意を表す。

新設の新津植物資料室では、上記の意図に基づき、更なる蒐集を続けて資料の充実を図る予定である。本編の記録を参考にして、確認していない種や佐渡における新たな資料についての情報提供をお願いしたい。

佐 渡 島 の 植 物 (羊歯・種子植物)

発 行 2002年1月15日
 編集・発行者 石 沢 進
 新津市東町二丁目5-6
 新津市地域学園内
 新津植物資料室
 (積雪地域植物研究所)
 発 行 所 コーエイ印刷株式会社
 新潟市弁天橋通1丁目31番30号
 TEL 025-286-2011(代)
 振替口座 00660-8-5489